

基础护理考试题库含答案

1、留置气泡技术适用于:

- A、静脉注射
- B、肌肉注射
- C、动脉注射
- D、小儿头皮静脉注射

答案: B

2、患者,男,41岁。肛周肿痛3天,肛门左侧皮肤发红伴疼痛,以坐时及排便时明显。2天前加剧并局部肿胀,无畏寒,发热。查体:胸膝位肛门11点处局部肿胀约2cm×2cm。有脓头,周围皮肤发红,波动感(+)。目前对该患者生活影响最大的护理问题是()

- A、体温过高
- B、疼痛
- C、便秘
- D、皮肤完整性受损
- E、个人应对无效

答案: B

3、患者男,40岁,脊髓损伤,双下肢截瘫。住院近2周,责任护士护理患者时,错误的做法是()

- A、帮助患者掌握正确的应对技巧
- B、帮助患者建立有效的社会支持系统
- C、让患者及家属参与制定护理计划
- D、根据Orem自理理论,给予患者完全补偿护理
- E、多听患者诉说

答案: D

4、患者,男,67岁,因冠心病入院。在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳粉红色泡沫痰。该患者发生了()

- A、急性肺水肿
- B、发热反应
- C、静脉炎
- D、空气栓塞
- E、过敏反应

答案: A

5、患者李阿姨，63岁，因支气管扩张合并肺部感染、左侧心力衰竭入院治疗，入院时 T39℃，呼吸急促，端坐呼吸。李阿姨在服用地高辛几天后，出现恶心、呕吐、视物模糊，护士应立即（ ）

- A、 报告护士长
- B、 给予止吐药
- C、 做心电图检查
- D、 停止服药并告知医生
- E、 做好患者心理护理

答案：D

6、患者男性，52岁。因车祸外伤入院，诊断为“重型颅脑损伤，左肱骨、股骨，下颌骨骨折”。该患者意识障碍，不能进食，可采用供给营养物质的方法是（ ）

- A、 静脉输液
- B、 鼻饲法
- C、 鼻饲或完全胃肠外营养
- D、 TPN
- E、 留置空肠管营养

答案：C

7、乙醇擦浴禁擦胸腹部是防止

- A、 发生寒战
- B、 体温骤降
- C、 反射性心率减慢及腹泻
- D、 呼吸不畅
- E、 血压下降

答案：C

8、皮下注射错误的是：

- A、 药液量少于1ml，须用1ml注射器抽吸
- B、 注射部位要常规消毒
- C、 持针时，右手食指固定针栓
- D、 针头与皮肤呈20°角刺入

答案：D

9、颈外静脉穿刺的正确部位是

- A、 下颌角与锁骨上缘中点连线的上1/3处
- B、 下颌角与锁骨上缘中点连线的上1/2处
- C、 下颌角与锁骨上缘中点连线的下1/3处

D、下颌角与锁骨下缘中点连线的上 1/3 处

E、下颌角与锁骨下缘中点连线的上 1/2 处

答案：A

10、选用 0.1%醋酸溶液进行漱口适用于下列哪种细菌感染

A、霉菌

B、革兰阴性菌

C、肺炎双球菌

D、铜绿假单胞菌

答案：D

11、骶尾部溃疡病变,可见骨面、创面有臭味,病人有发热为

A、瘀血红润期压疮

B、炎症浸润期压疮

C、浅层溃疡期压疮

D、坏死溃疡期压疮

答案：D

12、[单选题]患者,女,32岁。局部用冷缓解牙疼,其机制是()

A、降低神经末梢的敏感性

B、降低痛觉神经的兴奋性

C、减轻局部肿胀

D、降低细胞的新陈代谢

E、使炎症局限

答案：A

13、青霉素过敏性休克,使用肾上腺素的目的下列哪项不妥:

A、松弛支气管平滑肌

B、收缩血管、减小外周阻力

C、兴奋心肌、增加心输出量

D、升高血压

答案：B

14、活动性假牙的护理,以下哪项是错误的

A、取下假牙用冷水刷洗

B、暂时不用,浸入清水中保存

C、每日换清水一次

D、定期煮沸消毒一次

答案：D

15、静脉留置针,下腔静脉插管时,直径应与大隐静脉相适合,约多少 cm,成人插管长度一般为多少 cm:

- A、1-2cm 10-15cm
- B、1-2cm 15-18cm
- C、2-3cm 10-15cm
- D、2-3mm 15-18cm

答案: D

16、患者女性,78岁,截瘫引起尿失禁。此尿失禁属于()

- A、真性尿失禁
- B、假性尿失禁
- C、充溢性尿失禁
- D、压力性尿失禁
- E、膀胱括约肌无力性尿失禁

答案: A

17、患者,男性,56岁,因支气管扩张合并肺部感染,左心衰竭入院治疗,入院时 T39℃,呼吸急促,端坐呼吸。患者经抗炎、利尿、强心治疗后,体温降至正常,可平卧,现改用地高辛口服,护士给药时特别注意()

- A、应饭后服药
- B、应空腹服药
- C、应准时服药
- D、用药前测脉率
- E、服药后少饮水

答案: D

18、患者,男,35岁,车祸后昏迷5天。需鼻饲饮食以维持其营养需要。鼻饲时的注意事项中下列哪项不妥()

- A、间隔时间应大于4小时
- B、每次鼻饲量不超过200ml
- C、药片应研碎溶解后再注入
- D、新鲜果汁与奶液应分别注入

答案: A

19、超声吸入时,水槽中应加入什么多少 ml:

- A、冷水、300ml
- B、酒精 300ml
- C、药液 250ml
- D、冷蒸馏水 250ml

答案：D

20、动脉采血不需准备的物品：

- A、5ml 无菌干燥注射器、8 号针头
- B、无菌手套
- C、肝素
- D、止血带

答案：D

21、张某，男，36 岁，因车祸内脏破裂大出血而欲行急诊手术治疗。去手术室之前，护士遵医嘱迅速为患者建立了一个静脉通道并行输血治疗。因时间紧迫，护士从血库取回血后，为了尽早将血输给患者，便将血袋放在热水中提温，5 分钟后便给患者输入。当输入 10 分钟后，患者感到头部胀痛，并出现恶心呕吐，腰背部剧痛。此反应产生的最可能原因是（ ）

- A、输入了对患者致敏的物质
- B、输入了异型血液
- C、输入了库存血
- D、输入前将血液加温，破坏了红细胞
- E、枸橼酸浓度过高

答案：D

22、哪项除外，属于过敏性休克的临床表现：

- A、面色苍白、出冷汗、血压下降
- B、胸闷、气急、濒死感
- C、全身淋巴结肿大
- D、皮肤瘙痒、荨麻疹

答案：C

23、患者结肠癌根治术后行全胃肠道外营养治疗两周，今晨输液时护士发现其穿刺部位沿静脉走向出现条索状红线，局部组织发红、肿胀，灼热、疼痛。该患者可能发生了（ ）

- A、静脉炎
- B、过敏反应
- C、淋巴管炎
- D、静脉血栓形成
- E、淋巴水肿

答案：A

24、下列哪项不是濒死期病员的护理内容

- A、移病员至抢救室或用屏风遮挡

- B、给病员同情与安慰
- C、观察病情并配合抢救
- D、进行尸体料理准备工作

答案：D

25、小儿头皮动脉的特征哪项错误：

- A、血管有搏动
- B、血流方向离心
- C、血液呈暗红色
- D、注射时呈树枝状突起

答案：C

26、患者，男性，25岁，因破伤风入院，神志清楚，全身肌肉阵发性痉挛、抽搐。下列病室环境中，不符合病情要求的是()

- A、保持病室光线充足
- B、相对湿度 50%-60%
- C、室温 18-22℃
- D、开门关门动作轻
- E、门、椅脚钉橡皮垫

答案：A

27、患者，刘某，男，28岁，体重 80Kg，因车祸骨折、脾破裂收入院，急诊给予输液、吸氧，并用平车护送患者进入病区。护送途中，护士应注意()

- A、拔管暂停输液、吸氧
- B、可用车头撞开病区门以加快运送速度
- C、平车上垫木板
- D、暂停输液，吸氧继续
- E、暂停吸氧，继续输液

答案：C

28、静脉炎时，用超短波理疗，每日一次，每次多少 min：

- A、10-15min
- B、15-20min
- C、20-25min
- D、25-30min

答案：B

29、阿米巴痢疾病员留取便标本的容器应：

- A、硬低盒
- B、小玻璃瓶

- C、蜡纸盒
- D、加温后的容器

答案：D

30、患者男性，48岁，乙型肝炎患者，患者使用的碗筷需定时进行煮沸消毒。下列关于煮沸消毒法，正确的是（）

- A、煮沸10分钟即可杀灭多数细菌芽胞
- B、在水中加入亚硝酸钠即可提高杀菌效果
- C、橡胶类物品在冷水中或温水中放入
- D、中途加入其他物品，需等再次水沸后计时
- E、物品需全部浸入水中，相同的容器应重叠放在一起

答案：D

31、哪项除外是成分血：

- A、血浆
- B、红细胞
- C、自体血
- D、白细胞浓缩悬液

答案：C

32、病员死亡后的善后工作哪项错误：

- A、在体温单40-42℃之间用红笔竖写死亡时间
- B、按出院手续办理结帐 B、 停止一切治疗、药物及饮食
- C、无
- D、把床上用物撤走,重新铺上备用床

答案：D

33、超声吸入器关闭时应如何？

- A、先电源后主机
- B、先机器后电源
- C、无分先后
- D、仅关机器即可

答案：B

34、患者男性，急性上呼吸道感染，T39℃，遵医嘱应用退热药降温。患者用药后，护理人员应注意观察（）

- A、呼吸的变化
- B、脉搏的变化
- C、血压的变化
- D、体温的变化，有无虚脱或休克的发生

E、 以上都不是

答案： D

35、 擦去尸体上的胶布痕迹时常用：

A、 70%酒精

B、 石蜡油

C、 2%碘酒

D、 松节油

答案： D

36、 在大量输入库存血时, 应警惕什么和什么：

A、 酸中毒

B、 低钾血症

C、 高钾血症

D、 A+C

答案： D

37、 小儿头皮静脉注射时, 常用的静脉哪项不是：

A、 额上静脉

B、 头静脉

C、 眶上静脉

D、 颞浅静脉

答案： B

38、 灭头虱的方法中, 下列哪项没有必要

A、 用纱布蘸百部酊、按顺序擦遍头发

B、 反复揉搓头发 10min

C、 24h 后用篦子篦去死虱, 洗头

D、 梳子和篦子去清洗后消毒

答案： D

39、 药物的保管原则不正确的一项是：

A、 药柜宜放在阳光充足的地方

B、 内服药、外用药、注射药应分类放置

C、 由专人负责、定期检查

D、 剧毒药、麻醉药要加锁保管

答案： A

40、 颈外静脉穿刺时进针的角度：

A、 25° 角

B、 30° 角

C、40° 角

D、45° 角

答案：D

41、下列哪种患者禁忌局部用冷疗

A、高热

B、鼻出血

C、局部血液循环不良

D、牙痛

E、化脓感染

答案：C

42、为口腔铜绿假单胞菌感染的患者进行口腔护理时,可选用的漱口液是()

A、1%~3%过氧化氢溶液

B、0.02%呋喃西林溶液

C、2%~3%硼酸溶液

D、1%~4%碳酸氢钠溶液

E、0.1%醋酸溶液

答案：E

43、锁骨下静脉插管输液法,刺入静脉长度,左侧多少 cm,右侧多少 cm:

A、10-15 15-18

B、12-15 16-19

C、10-15 15-19

D、12-15 15-18

答案：B

44、护士对75岁的老年患者进行皮肤状况评估,下列信息中,表明的皮肤存在潜在的问题是()

A、皮肤弹性减弱

B、皮肤色素沉着增多

C、皮肤存在硬结

D、皮肤表面干燥粗糙

E、皮肤皱纹增多

答案：C

45、对链霉素过敏的病人应选用以下哪种药物拮抗治疗

A、乳酸钙

B、溴化钙

C、碳酸钙

D、葡萄糖酸钙

E、硫酸钙

答案：D

46、患者女性，67岁。结肠癌入院2个月，现患者出现大量腹水，全身水肿，呼吸急促，端坐呼吸，近1周出现癌性发热，体温波动的范围极不规则，持续时间也不一定，体温曲线毫无规律。该患者由于全身水肿、高热、长期端坐呼吸，应注意做好的护理是（）

A、眼睛

B、皮肤

C、饮食

D、生命体征

E、口腔

答案：B

47、在溶血反应中，当凝集的红细胞溶解，大量的血红蛋白进入血浆中时所出现的典型症状是

A、胸闷、呼吸急促

B、寒战、高热

C、腰背部剧痛、四肢麻木

D、黄疸、血红蛋白尿

E、少尿或无尿

答案：D

48、护士在给慢性充血性心力衰竭病人服用地高辛时，应重点观察

A、胃肠道反应

B、是否成瘾

C、心率、心律

D、体温

E、血压

答案：C

49、指导病员服药的方法错误的是：

A、服酸类药物，可用饮水管吸入服后漱口

B、发汗药服后多饮水

C、助消化药饭前服

D、服铁剂，忌饮茶

答案：C

50、哪项不是生物学死亡期的特征：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/175004211141011103>