

预览—收藏—关注

考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

试卷代号: 2403

国家开放大学2020年秋季学期期末统一考试
外科护理学 试题

2021年1月

一、单项选择题(每道题2分,共100分)

- 关于现代外科护理学概念的叙述,正确的是()。
 - 研究外科领域对人的整体护理
 - 研究围手术期病人的护理方法
 - 研究外科护理的知识和技术
 - 研究外科护士的职责与任务
 - 研究外科病人恢复健康的护理方法
- 通过中心静脉途径进行肠外营养支持的病人,估计其接受营养支持的时间至少应为()。
 - 1周
 - 2周
 - 3周
 - 4周
 - 5周
- 经鼻胃管灌注要素膳时病人最好取()。
 - 半卧位
 - 左侧卧位
 - 右侧卧位
 - 垫枕平卧位
 - 去枕平卧位
- 抗休克最重要的治疗措施是()。
 - 积极处理原发疾病
 - 及时纠正酸碱平衡失调
 - 早期应用血管活性药物
 - 及时、快速、足量补充血容量
 - 应用强心药
- 提示休克病人组织灌流恢复的最低尿量标准是()。
 - 50mL/h
 - 40mL/h
 - 30mL/h
 - 20mL/h
 - 10mL/h
- 预防腰麻术后头痛的主要措施是()。
 - 注意保暖
 - 心理护理
 - 减少术中输液量
 - 垫枕平卧4-6小时
 - 去枕平卧6-8小时
- 女性,24岁,术后24小时突然出现面色苍白、心慌、气短、血压下降,护士观察到伤口引流管流出大量鲜红色血性液体,应考虑病人可能出现()。
 - 内出血
 - 切口感染
 - 切口血肿
 - 血栓性静脉炎
 - 切口裂开
- 全脊椎麻醉的主要危险是()。
 - 恶心、呕吐
 - 剧烈头痛
 - 呼吸、心跳骤停
 - 麻醉作用持久
 - 导致截瘫
- 下列关于外科感染特点的说法不正确的是()。
 - 局部症状明显
 - 常为单一细菌感染

- C. 关节部位感染愈合后可能影响功能
D. 感染组织愈合后形成瘢痕
E. 多引起局部坏死和脓肿
10. 可用于计算基础代谢率的公式是()。
A. 收缩压+舒张压-111
B. 脉率+收缩压-111
C. 脉率+舒张压-111
D. (脉率+脉压)-111
E. 脉率-111
11. 甲状腺大部切除术后病人出现声音嘶哑的原因是()。
A. 喉头水肿
B. 甲状腺切除过多
C. 喉返神经损伤
D. 喉上神经损伤
E. 喉痉挛
12. 乳腺癌病人常见的早期临床表现是()。
A. 橘皮征改变
B. 乳头向一侧偏斜
C. 乳房无痛性肿块
D. 乳头有血性溢液
E. 酒窝征
13. 乳腺癌病人乳房局部皮肤出现橘皮样改变是因癌肿侵及()。
A. 肌肉
B. 淋巴管
C. 表皮
D. 乳房悬韧带
E. 神经
14. 避免或减轻乳腺癌病人患侧上肢水肿的做法不包括()。
A. 预防性抬高患侧上肢
B. 不在患肢进行测血压
C. 不在患肢静脉穿刺
D. 术后3天患侧上肢制动, 避免外展上臂
E. 引流管护理
15. 为了缓解腹部损伤病人的疼痛, 可采取的措施不包括()。
A. 绝对卧床休息
B. 不随意搬动患者
C. 疑有空腔脏器穿孔者, 应禁食、胃肠减压
D. 禁止灌肠
E. 立即使用吗啡类镇痛药
16. 男性, 30岁, 餐后1小时, 被车撞伤中上腹部, 感上腹部剧烈疼痛呈持续性刀割样, 短时间内腹痛逐渐扩至全腹, 左上腹明显压痛、反跳痛、肌紧张, X线检查示膈下有游离气体。该病人可能出现的问题是()。
A. 胃肠破裂
B. 脾破裂
C. 肝破裂
D. 胰破裂
E. 肾破裂
17. 男性, 因急性阑尾炎行阑尾切除术, 术后4天出现下腹坠胀、尿频、垦急后重, 可能的诊断是()。
A. 膈下脓肿
B. 切口感染
C. 肠间隙脓肿
D. 盆腔脓肿
E. 肠梗阻
18. 胃癌病人术前护理措施, 不正确的是()。

- A. 心理护理
B. 改善营养状况
C. 对有幽门梗阻的病人,术前3日起每天用温生理盐水洗胃
D. 要求吸烟的病人尽量减少吸烟的数量
E. 指导病人进行有效咳嗽和深呼吸的训练
19. 胃大部切除术后5天,病人突然发生上腹部剧烈疼痛,并伴有强烈的腹膜刺激征,首先考虑为()。
A. 输出段空肠梗阻
B. 胃肠吻合口瘘
C. 胃出血
D. 倾倒综合征
E. 胃潴留
20. 肠梗阻病人共同的临床表现不包括()。
A. 腹痛
B. 休克
C. 呕吐
D. 腹胀
E. 停止排气排便
21. 护士对于肠梗阻病人的观察判断,正确的是()。
A. 呕吐早、频繁且含有胆汁应疑为高位肠梗阻
B. 呕吐呈喷射状说明是麻痹性肠梗阻
C. 腹痛有减轻且肠鸣音不再亢进说明梗阻有所缓解
D. 腹痛转为持续性胀痛说明出现绞窄性肠梗阻
E. 病人有一次排便说明是不完全性肠梗阻
22. 直肠癌的早期症状不包括()。
A. 便血
B. 排便不尽感
C. 排便次数增多
D. 便秘
E. 下腹痛
23. 关于结肠造口的护理,不正确的是()。
A. 乙状结肠造口病人必须使用造口袋
B. 造口袋开口必须大小合适、附着严密
C. 造口袋内容物1/3满时应倾倒或更换造口袋
D. 更换造口袋时要观察周围皮肤情况
E. 帮助病人接纳并主动参与造口护理
24. 肝癌病人常见的首发症状是()。
A. 消瘦
B. 恶心、呕吐
C. 肝区疼痛
D. 黄疸
E. 贫血
25. 男性,72岁,诊断为原发性肝癌,行肝叶切除术后第3天,出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等,应考虑肝性脑病。以下处理措施不正确的是()。
A. 吸氧
B. 增加蛋白质的摄入
C. 禁用肥皂水灌肠
D. 口服新霉素或卡那霉素
E. 给予富含支链氨基酸的制剂或溶液
26. 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的梗阻因素是()。
A. 胆道肿瘤
B. 胆管结石
C. 胆道蛔虫
D. 胆管扭转

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176111242050010051>