

护理员、医疗救护员职业技能鉴定理论考试题库-中（判断、 填空题）

判断题

1. 呋塞米可与氨基糖苷类药物(如链霉素等)合用,以防听力损伤。

A、正确

B、错误

答案：B

2. 卫生员应了解和掌握官兵常见病和训练伤情况,并及时做出处理。()

A、正确

B、错误

答案：B

3. 吸氧是当氧气通过流量表,即将浮标吹起,看浮标尖端所指刻度,即为每分钟氧气的流出量。()

A、正确

B、错误

答案：B

4. 肾脏性水肿早期发生于身体下垂部位。

A、正确

B、错误

答案：B

5. 每个传染源所能达到的范围可单独构成一个疫源地, 即一个疫源地内只存在一个传染源。

A、正确

B、错误

答案: B

6. 脑组织损伤伤员疼痛难忍时, 可用吗啡类药物止痛。

A、正确

B、错误

答案: B

7. 1%龙胆紫溶液用于皮肤和黏膜的表浅创伤、溃疡、糜烂等, 可用于阴道霉菌感染; 涂于表浅新鲜创面时, 可形成一层薄膜, 有收敛保护作用。

A、正确

B、错误

答案: A

8. 具有解热镇痛作用, 又可以防治冠心病复发的药物是去痛片()

A、正确

B、错误

答案: B

9. 穿隔离衣前, 应先穿好工作衣、裤、鞋, 戴好帽子、口罩, 手表。

A、正确

B、错误

答案: B

10. 风帽式包扎可适用于伤肢残端包扎。

A、正确

B、错误

答案：A

11. 测量呼吸时应设法使患者的注意力集中,以正确计数。()

A、正确

B、错误

答案：B

12. 吸氧时当氧气通过流量表,即将浮标吹起,看浮标下平面所指刻度,即为每分钟氧气的流出量。()

A、正确

B、错误

答案：B

13. 已倒出的溶液如没有使用应再倒回瓶内。

A、正确

B、错误

答案：B

14. 氧气压力表数值越大,说明筒内储存氧量越多。()

A、正确

B、错误

答案：A

15. 在摄入蛋白质总量中蛋白质应占到 30%-50%。

A、正确

B、错误

答案：A

16. 乙胺嘧啶具有用量小及药效持续时间长(每次服药作用可维持1周)等优点。

A、正确

B、错误

答案：A

17. 破伤风病员用过的敷料应予焚毁处理。()

A、正确

B、错误

答案：A

18. 出院病历排列顺序:住院病历首页、出院记录、病史及体格检查、病程记录、各种检验及检查报告、护理病历、医嘱单、体温单。()

A、正确

B、错误

答案：A

19. 感染阶段是指寄生虫在宿主体内发育或繁殖的阶段。()

A、正确

B、错误

答案：B

20. 使用呼吸机为伤员实施吸引时, 要先将伤员的头偏向一侧。

A、正确

B、错误

答案：A

21. 微波是波长在 1mm~1m, 频率 300MHz~300GHz 的高频电磁波。

A、正确

B、错误

答案：A

22. 生理反射可分为浅反射和深反射两类。

A、正确

B、错误

答案：A

23. 沙丁胺醇兴奋心脏作用和异丙肾上腺素一样。

A、正确

B、错误

答案：B

24. 平车上下坡时, 病人头部应在高处一端; 如平车一端为小轮, 一端为大轮, 病人头部应卧于大轮端。

A、正确

B、错误

答案：A

25. 检查阿米巴原虫时, 收集标本前, 先用热水将便盆加温, 便后连同便器立即送检或将标本置于已加温的容器中送检。

A、正确

B、错误

答案：A

26. 脱隔离衣时, 如挂在污染区内, 则污染面在外。

A、正确

B、错误

答案：A

27. 使用一次性管类用品应注意灭菌日期, 超过灭菌有效期的应重新灭菌后方可使用。()

A、正确

B、错误

答案：A

28. 脱水药由于有渗透性利尿作用, 又称渗透性利尿药。

A、正确

B、错误

答案：A

29. 战救药材和战时常备药材是储存在一起的。

A、正确

B、错误

答案：B

30. 门诊护理员安排候诊时应按先后次序叫号就诊, 但对于出血、休克等病人可立即安排提前就诊或送急诊室处理。()

A、正确

B、错误

答案：A

31. 施放化学武器后,从染毒地面、物体蒸发形成的染毒空气称为再生云。

A、正确

B、错误

答案：A

32. 整体护理对护理人员的素质提出了更高的要求,但因较多的护理员共同参与,使护理员的责任感不强。()

A、正确

B、错误

答案：B

33. 肱动脉压迫止血法适用于同侧整个上肢出血。

A、正确

B、错误

答案：B

34. QRS 波群反映左右心室肌激动的过程。

A、正确

B、错误

答案：B

35. 护理员在基础护理中切不可草率从事,酿成差错事故。()

A、正确

B、错误

答案：A

36. 平衡膳食是指能全面达到营养要求的合理膳食。

A、正确

B、错误

答案：A

37. 华法林过量引起的自发性出血宜选用的解救药物是维生素K()

A、正确

B、错误

答案：A

38. 复合伤休克是指两种或两种以上的致伤因素同时作用于机体而导致的休克。

A、正确

B、错误

答案：A

39. 污染区就是生物战剂所波及的范围。

A、正确

B、错误

答案：A

40. 咽鼓管通气时将使鼓室内气压降低。()

A、正确

B、错误

答案：B

41. 检查寄生虫虫卵时,应取同一部位的标本 5~10g 送验,若病员服驱虫药后或作血吸虫孵化检查,应留取全部粪便,及时送检。()

A、正确

B、错误

答案: B

42. 医院的饮食可分为基本饮食、治疗饮食、试验与诊断饮食三大类。

A、正确

B、错误

答案: A

43. 血型是以红细胞膜上存在的凝集原的不同而划分的。()

A、正确

B、错误

答案: A

44. 每 30ml 尿液加 40%甲醛液 1 滴,防止细菌生长和保持尿中化学成分不变。()

A、正确

B、错误

答案: B

45. 推车时,操作者应站在病人头侧,便于观察病情。搬运及推车时都应注意病人面色,呼吸及脉搏的变化。()

A、正确

B、错误

答案: A

46. 救治机构各组(室)在完成了规定的救治处理后应取下分类牌,并及时收回。

A、正确

B、错误

答案: A

47. 病房护理员接到住院处通知后,应立即根据病情需要选择床单位,将备用床改为暂空床。()

A、正确

B、错误

答案: A

48. 盲肠位于右髂窝,其内下方连有阑尾。()

A、正确

B、错误

答案: A

49. 肝炎病人的呕吐物、分泌物、排泄物及各种引流液等可直接排放。

A、正确

B、错误

答案: B

50. 水果和蔬菜均含有丰富的维生素和无机盐,故可用水果代替蔬菜。

A、正确

B、错误

答案: B

51. 十二指肠管用后浸泡在 0.2%过氧乙酸溶液内 5min, 再将粗细适宜的钢丝插入管腔内, 用手搓揉, 然后用自来水充分冲洗干净并保证通畅, 放入 0.2%过氧乙酸溶液中浸泡 30min。()

A、正确

B、错误

答案: A

52. 在任何时候坚持群众性自救互救都是战(现)场急救必须遵循的一个重要原则。

A、正确

B、错误

答案: A

53. 对保护性隔离的病人, 探视者应采取相应的隔离措施。

A、正确

B、错误

答案: A

54. 战时开展群众性自救互救是我军的光荣传统, 也是使伤员得到及时救治的重要保证。

A、正确

B、错误

答案: A

55. 心理咨询是通过人际关系, 运用心理学的理论与方法, 在心理上给咨询对象以帮助、劝告和指导的过程, 目的在于解决其心理疾病。

A、正确

B、错误

答案：B

56. 采用直接输血前, 要用无菌注射器抽取一定量的抗凝剂, 通常为每 50ml 血液内加 3. 8%枸橼酸钠生理盐水 5ml

A、正确

B、错误

答案：B

57. 全身性毒剂中毒时, 伤员肺部虽然能够吸入氧气, 但是组织细胞不能利用氧。

A、正确

B、错误

答案：A

58. 救治分类是以救治为目的, 由各组室人员在各自组室内进行较详细检查, 是收容分类的继续和补充。

A、正确

B、错误

答案：A

59. 隔离的目的是防止病人与病人之间、病人与医护人员之间, 因互相接触而发生交叉感染。

A、正确

B、错误

答案：A

60. 换药前准备工作中主要是病人准备 () 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178005101003007005>