

## 内科护理学测试试题含答案

1、原发性肾小球疾病属于()

- A、自身免疫性疾病
- B、免疫介导炎症性疾病
- C、特异性感染性疾病
- D、非特异性感染性疾病
- E、遗传性疾病

答案：B

2、心肺复苏基础生命支持(BLS)的内容包括( )

- A、开放气道、恢复循环、脑复苏
- B、胸外按压、开放气道、人工呼吸、除颤
- C、开放气道、人工呼吸、药物治疗
- D、胸外按压、开放气道、人工呼吸
- E、开放气道、恢复循环、药物治疗

答案：B

3、李某女2岁。患有系统性红斑狼疮病史2年。近日出现发热关节红肿压痛:面部红斑及泡沫尿收治入院。下列对该病人的处理,正确的是( )

- A、加强肢体锻炼
- B、安排在朝阳的病室
- C、给予高蛋白、高热量饮食
- D、遵医嘱强化激素治疗
- E、使用洗面奶勤洗脸

答案：D

4、章某,女,48岁。1型糖尿病,胰岛素治疗控制血糖。近几天经常于清晨3-4点出现手抖、心慌、饥饿感,晨起空腹血糖均在11.0mmol/L以上,睡前血糖6.5mmol/L左右。目前该病人的最佳处理措施是( )

- A、减少晚餐热量
- B、增加睡前中效胰岛素用量
- C、加用双胍类药物
- D、减少睡前中效胰岛素用量
- E、睡前加餐

答案：D

5、当病人发生气胸后,气体可随呼吸自由进出胸膜腔,气胸侧胸膜腔内压在0cmH<sub>2</sub>O左右,可判断该病人发生的气胸为( )

- A、稳定性气胸

- B、原发性气胸
- C、闭合性气胸
- D、交通性气胸
- E、张力性气胸

答案：D

6、抢救糖尿病酮症酸中毒病人最首要和关键的措施是( )

- A、治疗诱因
- B、使用小剂量胰岛素
- C、补液
- D、纠正电解质紊乱及酸碱平衡失调
- E、纠正脑水肿

答案：C

7、刘某,男,68岁。近日常感上腹隐痛,食欲减退,餐后饱胀,医生建议行胃镜检查。结果示:慢性胃炎。对于该病人的护理措施错误的是()

- A、应少量多餐,忌暴饮暴食
- B、给予富有营养、易消化饮食
- C、注意饮食卫生
- D、忌饮烈性酒、吸烟
- E、枸橼酸铋钾宜餐后服用,以减少胃肠道反应

答案：E

8、李某,男,75岁。慢性肺源性心脏病病人,血气分析结果显示pH7.33, PaO<sub>2</sub>54mmHg, PaCO<sub>2</sub>68mmHg。目前该病人呼吸运动的组维持主要依靠( )

- A、缺氧对外周化学感受器的刺激
- B、H<sup>+</sup>对外周化学感受器的刺激
- C、H<sup>+</sup>对中枢化学感受器的刺激
- D、CO<sub>2</sub>对外周化学感受器的刺激
- E、CO<sub>2</sub>对中枢化学感受器的刺激

答案：A

9、疟疾发热类型属于

- A、稽留热型
- B、弛张热型
- C、间歇热型
- D、波状热型
- E、不规则热型

答案：C

10、林某,男,50岁。上腹痛1年,加重3个月,胃镜提示为慢性浅表性胃炎,B超及其他各项检查均无异常。考虑使用下列药物中的()

- A、奥美拉唑
- B、多潘立酮
- C、铝碳酸镁片
- D、替普瑞酮
- E、阿托品

答案: A

11、环磷酰胺最常见的不良反应是()

- A、出血性膀胱炎
- B、脱发
- C、心肌损害
- D、末梢神经炎
- E、巨幼细胞贫血

答案: A

12、赵某,女,25岁。以霍奇金病收住入院,放疗后局部皮肤出刺痒渗液、水疱。对于该病人皮肤护理所使用的护肤品和方法,不妥的是()

- A、2%甲紫
- B、氧化锌软膏
- C、氢化可的松软膏
- D、3%硼酸溶液湿敷
- E、热敷

答案: E

13、能诱发溶血的抗疟药是

- A、氯喹
- B、伯氨喹
- C、乙胺嘧啶
- D、青蒿素
- E、蒿甲醚

答案: B

14、肺结核最重要的传播途径是()

- A、经性传播
- B、经皮肤途径传播
- C、飞沫传播
- D、血液传播

E、母婴传播

答案：C

15、关于鼠疫预防的叙述, 错误的是( )

A、腺鼠疫不必严格隔离

B、肺鼠疫要单独隔离

C、加强国境检疫与交通检疫

D、进入疫区可给予预防性服药

E、对疫区人群进行鼠疫菌苗预防接种

答案：A

16、胡某, 男, 45 岁。有扩张型心肌病病史。本次因呼吸困难不能平卧入院。

该病人首优的护理问题是( )

A、气体交换障碍

B、体液过多

C、睡眠形态紊乱

D、活动无耐力

E、心力衰竭

答案：A

17、稳定型心绞痛与急性心肌梗死病人在疼痛症状上的最主要区别是( )

A、性质

B、持续时间

C、部位

D、放射部位

E、伴随症状

答案：B

18、三腔二囊管止血治疗仅适用于( )

A、食管癌合并出血

B、急性出血性胃炎

C、幽门附近的消化性溃疡

D、食管曲张静脉破裂

E、应激性溃疡

答案：D

19、血吸虫病的病理变化中, 由虫卵引起的主要病变是( )

A、肺部肉芽肿病变

B、皮下结节

C、脑部肉芽肿病变

D、肝和肠的肉芽肿病变

E、 胆囊息肉样变

答案：D

20、曹某。33 岁,农民面部水肿乏力 1 个月。双耳席可见冻疮样皮损,双手指,足趾掌侧可见充血性红斑。尿蛋白+++颗粒管型(+)ANA( )抗 SSA 抗体(+)最可能的临床诊断是( )

A、干燥综合征

B、慢性肾炎

C、 SLE

D、急进性肾炎

E、 SLE+干燥综合征

答案：C

21、胡某,女,38 岁。突发气胸,准备行胸腔闭式引流。护士对病人进行术前指导的内容中,不正确的是( )

A、告知穿刺时的体位

B、告知穿刺时不要随意活动

C、告知穿刺时不能咳嗽

D、告知穿刺时保持穿刺体位

E、告知穿刺时深呼吸

答案：E

22、 张某,女,17 岁。因倦怠无力伴手抖学习成绩急剧下降就诊。经检查确诊为肝豆状核变性,该病人给子的饮食是( )

A、高铜、高蛋白,低热量、高维生素饮食

B、低铜、高蛋白、高热量、高维生素饮食

C、低铜低蛋白、高热量高维生素饮食保

D、低铜:高蛋白 低热量高维生素饮食

E、高铜、高蛋白,高热量、高维生素饮食

答案：B

23、赵某,男,68 岁。因“反复腹泻 2 个月”收入院,针对该病人的护理措施不恰当的是()

A、常规给予禁食禁饮

B、应给予少渣饮食

C、严重时卧床休息

D、可给予腹部热敷

E、注意肛周皮肤的护理

答案：A

24、文某,男 29 岁,因车祸致脑外伤。检查发现其音治难所 疼庙制散才能外用及由现肤体退缩反应,该病人的 Gige 昏选评分为( )

- A、5 分
- B、6 分
- C、8 分
- D、10 分
- E、12 分

答案：C

25、狂犬病最具有特征性且有诊断意义的病理变化是( )

- A、内基小体
- B、脑实质充血
- C、神经细胞变性
- D、胶质细胞增生
- E、唾液腺肿胀

答案：A

26、向某,男,45 岁。因长期咳嗽、咳脓痰,反复咯血,以支气管扩张症收入院。病人近日咯血量增多,咯血间隔时间变短。入院当晚,护士在巡视时发现病人咯血突然中止,表情紧张、惊恐,大汗淋漓,两手乱动,继而颜面发绀。该病人可能并发了( )

- A、肺不张
- B、吸人性肺炎
- C、失血性休克
- D、窒息
- E、肺梗死

答案：D

27、慢性溶血性贫血的主要表现是()

- A、贫血+黄疸
- B、贫血+黄疸+脾大
- C、贫血+酱油样尿
- D、贫血+寒战高热+酱油样尿
- E、贫血+黄疸+酱油样尿

答案：B

28、韩某,女,25岁。系统性红斑狼疮病史5年,半月前再度出现面部红斑,全身关节酸痛,并伴有低热,疑SLE活动而入院。经治疗后病情控制,准许出院。护士对病人作如下出院指导,正确的是( )

- A、不想生育,可口服常用避孕药避孕
- B、若不适可自行增加激素用量症状缓解后可自行减药
- C、一旦怀孕即停药激素并以免疫抑制药替代
- D、长期用药,定期随访,不可擅自改变药物剂量或突然停药
- E、怀孕后停药糖皮质激素以外的切药物,并每天晒太阳30分钟以上

: D

29、下列导致ARDS的危险因素中,属于肺内因素的是( )

- A、休克
- B、败血症
- C、严重非胸部创伤
- D、麻醉药中毒
- E、误吸胃内容物

: E

30、脑出血病人最常见的死亡原因是( )

- A、颅内水肿
- B、脑疝
- C、上消化道出血
- D、窒息
- E、意识障碍

: B

31、江某,女,25岁。面部有蝶形红斑,严重关节疼痛,近日在Hb 90g/L。乏力,Sm抗体(+),抗双链DNA抗体(+).该病人目前首要的护理问题是( )

- A、疲乏
- B、皮肤完整性受损
- C、疼痛
- D、有感染的危险
- E、营养失调:低于机体需要量

: C

32、李某,男,64岁。8年前胃肠钡剂造影检查发现胃小弯溃疡,上腹部节律性疼痛时好时坏。近来中上腹有饱胀感,粪便隐血试验多次阳性,有贫血体征。护士在家庭随访时首先应指导病人( )

- A、继续用药

- B、注意饮食卫生
- C、劳逸结合
- D、戒除烟酒
- E、立即就医

答案：E

33、齐某,男,55岁。因“肝炎后肝硬化,食管曲张静脉破裂出血”入院。给予加压素止血治疗。为了减轻静脉滴注加压素时可能出现的血压升高等不良反应,可使用()

- A、硝普钠
- B、硝苯吡啶
- C、硝酸甘油
- D、普萘洛尔
- E、卡托普利

答案：C

34、治疗恙虫病的特效药物为()

- A、氯霉素
- B、罗红霉素
- C、诺氟沙星
- D、四环素
- E、青霉素

答案：A

35、肾综合征出血热最基本的病理变化是()

- A、血小板减少
- B、低血容量性休克
- C、全身小血管充血
- D、全身小血管和毛细血管广泛受损
- E、弥散性血管内凝血

答案：D

36、林某,男,56岁。多饮、多尿2周,嗜睡2天,有脱水表现:实验室检查:血尿素氮42.9mol/L,血钠150mmol/L,尿酮(-)。对该病人的最佳治疗措施是()

- A、大剂量胰岛素+生理盐水
- B、小剂量胰岛素+生理盐水
- C、大剂量胰岛素+5%葡萄糖水
- D、小剂量胰岛素+5%葡萄糖水
- E、小剂量胰岛素+10%葡萄糖水



答案：B

37、汤某,女,17岁。因“腹胀腹痛半月余,黑便1天”收入院。病人的出血量至少达到()

- A、5ml
- B、10ml
- C、15ml
- D、30ml
- E、50ml

答案：E

38、感染性心内膜炎最常见的首发症状是()

- A、贫血
- B、发热
- C、栓塞
- D、乏力
- E、疼痛

答案：B

39、肾病综合征并发血栓形成和栓塞,最多见于()

- A、下肢深静脉
- B、上肢深静脉
- C、肺血管
- D、肾静脉
- E、脑血管

答案：D

40、黄某,男,51岁。自诉近来走路不稳,特别是夜晚黑暗时加重,无眩晕。身体评估:行走时双目注视地面,举足高、触地粗重。据此应考虑为()

- A、小脑性共济失调
- B、前庭性共济失调
- C、感觉性共济失调
- D、下肢痉挛性轻瘫
- E、鸭步

答案：C

41、以下心律失常病人中,听诊时心律绝对规则的是()

- A、阵发性室上性心动过速
- B、心房颤动
- C、心房扑动

- D、期前收缩
- E、二度 I 型房室传导阻滞

答案：A

42、贫血治疗的首要原则是()

- A、及时补充造血物质
- B、积极寻找和去除病因
- C、反复多次输血
- D、休息与吸氧
- E、合理使用刺激骨髓再生的药物

答案：B

43、不属于布鲁菌病病人发热特点的是()

- A、不规则热
- B、波状热
- C、高热时可无明显不适
- D、体温下降后自觉症状反而加重
- E、发热期平均 1 周

答案：E

44、腰穿后最常见的并发症为()

- A、低颅压头痛
- B、脑脊液漏
- C、脑出血
- D、脑炎
- E、穿刺点感染

答案：A

45、丁某,男,56岁。诊断为糖尿病肾病,慢性肾衰竭(CKD4期)。病人此时的尿液检查最有可能出现的是()

- A、尿比重固定在 1.010 左右
- B、尿中红细胞明显增多
- C、尿中白细胞明显增多
- D、尿中细胞管型明显增多
- E、尿蛋白++++

答案：C

46、乐某,男,21岁,夜间饱餐后睡眠中突然感觉口渴、出汗、面色潮红,肢体酸胀疼痛、麻木,随即出现下肢无力,继之上肢无力。对该病人的护理措施错误的是()

- A、为病人营造安全、舒适的休息环境
- B、指导病人进食低钾低钠饮食,少食多餐
- C、指导病人勿受凉和剧烈运动,避免感染和创伤
- D、指导病人正确服药
- E、观察有无呼吸肌麻痹和心律失常的表现

答案: B

47、下面关于应用枸橼酸铋钾(CBS)错误的叙述是()

- A、可用吸管直接吸人
- B、最好在餐后半小时服用
- C、可出现便秘和粪便呈黑色
- D、极少数病人可出现急性肾损伤
- E、病人可有恶心、一时性血清转氨酶升高

答案: B

48、蔡某,男,45岁。诊断为钩端螺旋体病,用青霉素80万U肌内注射,4小时后突然出现提寒、寒战体温骤升。应首先考虑()

- A、过敏性休克
- B、赫氏反应
- C、心肌炎
- D、合并败血症
- E、颅内压增高

答案: B

49、鼠疫在世界范围内难以彻底消灭的最主要原因为()

- A、鼠疫自然疫源地的存在
- B、非洲、亚洲第三世界国家对传染病监管力度不够
- C、家畜也可能成为传染源
- D、某些国家仍保存鼠疫杆菌
- E、狩猎者的存在

答案: A

50、关于鼠疫的发病机制及病理改变的叙述,错误的是()

- A、鼠疫耶尔森菌通过带菌鼠蚤叮咬血侵入人体,其传播方式为啮齿动物-蚤-人
- B、肺鼠疫为病人痰中的鼠疫耶尔森菌借飞沫构成人与人之间的传播
- C、鼠疫耶尔森菌具有侵袭力,可进入血液循环形成败血症
- D、鼠疫耶尔森菌外毒素是造成严重中毒症状的原因

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185014040144011104>