

皮肤与性病学(医学高级): 皮肤与性病学考试试题五

1、单选 Kogoj 海绵状微脓肿常见于 ()。

- A. 寻常型银屑病
- B. 关节病型银屑病
- C. 脓疱型银屑病
- D. 红皮病型银屑病
- E. 红皮病

正确答案: C

2、单选 细胞膜结(江南博哥)构的主要成分是 ()。

- A. 脂肪
- B. 蛋白
- C. 脂肪酸
- D. 类脂质
- E. 皮脂

正确答案: D

3、单选 关于点滴状副银屑病下列正确的是 ()。

- A. 自觉剧烈瘙痒
- B. 常于幼儿发病
- C. 起病急、发展快
- D. 皮疹为淡红色斑疹、斑丘疹、表面薄鳞屑
- E. 影响健康

正确答案: D

参考解析: 点滴状副银屑病皮疹为淡红色斑疹、斑丘疹、表面薄鳞屑, 一般不影响健康。

4、单选 特应性皮炎临床分为 ()。

- A. 婴儿期、儿童期和青年成人期
- B. 婴儿期和儿童期
- C. 儿童期和青年成人期
- D. 新生儿期、儿童期和青年成人期
- E. 新生儿期、青年成人期

正确答案: A

5、单选 光毒反应和光变态反应的共同点是 ()

- A. 潜伏期一致
- B. 皮损形态
- C. 光生物学试验
- D. 均可由 UVB 引起

正确答案: D

6、多选 功能凉血止血, 解毒的药物是

- A. 大蓟
- B. 小蓟
- C. 地榆
- D. 大黄
- E. 黄芩

正确答案：A, B, C, D, E

7、单选 以结节为主要损害的皮肤病除了（）。

- A. 结节痒疹
- B. 黄瘤
- C. 寻常狼疮
- D. 结节病
- E. 传染性软疣

正确答案：E

参考解析：传染性软疣典型损害为受感染局部表皮细胞增生形成的丘疹，直径2~8mm，单发或多发，圆形或半球形，有蜡样光泽，中心脐凹状，并含有干酪样栓塞物，丘疹呈肉色或粉红色。初期质地坚硬，成熟变软，可挤压出干酪样物。

8、单选 正虚邪恋(慢性淋病)宜用：

- A. 知柏地黄汤加味
- B. 龙胆泻肝汤加味
- C. 清营汤加味
- D. 八正散加味
- E. 犀角地黄汤加味

正确答案：A

9、单选 以下属于第一代H1受体拮抗剂的是（）。

- A. 阿司咪唑
- B. 非索非那定
- C. 咪唑斯汀
- D. 氯苯那敏
- E. 西替利嗪

正确答案：D

10、单选 维A酸类药物治疗痤疮的机制不包括（）。

- A. 调节毛囊的角化
- B. 杀灭痤疮丙酸杆菌
- C. 抗炎作用
- D. 抑制角质形成细胞的增殖
- E. 调节上皮细胞的生长和分化

正确答案：B

参考解析：维 A 酸药物用于治疗痤疮的机制为调节毛囊的角化和上皮细胞的生长、分化，抗炎，抑制角质形成细胞的增殖，没有抑菌或杀菌作用。

11、单选 银屑病表皮更替时间大约是（）。

- A. 14~18 天
- B. 3~4 天
- C. 36~42 天
- D. 8~12 天
- E. 37.5 小时

正确答案： B

12、单选 H1 受体拮抗剂的作用机制（）。

- A. 降低机体对组胺的反应
- B. 阻止和减少组胺的释放
- C. 促进组胺在体内分解、排泄
- D. 与组胺竞争结合受体
- E. 以上说法均不对

正确答案： D

13、单选 下列不属于梅毒实验室诊断方法的是（）。

- A. 血清不加热的反应素试验
- B. VCRL 试验
- C. 胶体金试验
- D. 快速血浆反应素环状卡片试验
- E. 墨汁试验

正确答案： E

参考解析：血清不加热的反应素试验，VCRL 试验，快速血浆反应素环状卡片试验都是梅毒血清试验，胶体金试验为诊断神经梅毒脑脊液检查所用的方法。

14、单选 下列哪项不是隐翅虫皮炎的典型皮损特点（）。

- A. 条状、片状或点簇状水肿性红斑
- B. 红斑上可见密集丘疹、水疱及脓疱
- C. 损害中心脓疱可融合成片
- D. 好发于皮肤薄嫩处
- E. 有瘙痒、灼热、灼痛感

正确答案： D

15、多选 姜汁灸能增强止呕作用的药物是（）

- A. 黄连
- B. 白前
- C. 竹茹
- D. 半夏
- E. 皂荚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186100025121010142>