

静脉治疗知识竞赛题库附答案（精选 60 题）

一、单选题

1 双腔及多腔导管如何封管（ ）。

- A. 连续封管
- B. 单手同时封管（正确答案）
- C. 双手同时封管
- D. 双手交替封管

2. 药物外溢到下列哪种地方，不属于药物外溢（ ）。

- A 皮肤表面
- B. 操作台面
- C. 血管周围组织（正确答案）
- D. 地面

3 . 血栓性导管失功的主要处理方式时（ ）。

B. 更换管路

C. 注射盐水

D. 注射药物

4 . 静脉输血时，输血后监测时间 0

A. 15 分钟

B. 60 分钟（正确答案）

C. 30 分钟

D. 45 分钟

5 . 针刺伤发生高危人群 0

A. 工龄 W5 年的低年资护理人员

8 . 实习护士（正确答案）

C. 进修护士

9 . 工龄工 5 年的高年资护理人员

6 . 导管拔除后，为什么使用闭合性敷料覆盖穿刺部位？（B）

B. 避免空气栓塞

C. 避免出血

D. 促进伤口愈合

7 . 纱布辅料多长时间更换一次 0

A. 至少 2 天（正确答案）

8 . 至少 7 天

9 . 至少 3 天

10 至少 4 天

8. 为保证血液质量和避免浪费，一次发放红细胞不宜超过（）单位

A. 1

B. 2（正确答案）

C. 4

D. 3

9. 胸壁输液港植入的首选静脉 0

A. 贵要静脉

B. 颈外静脉

C. 腋静脉胸壁段

D. 锁骨下静脉（正确答案）

1（）。紧急状态下置管，若不能保证有效的无菌原则，应当在多长时间
间内尽早拔除导管？0

A. 6 小时

B. 12 小时

C. 24 小时

D. 48 小时（正确答案）

二、判断题

1 . 1 个单位的全血或成分血在 4h 内输完。

对（正确答案）

错

2 . 针刺伤是指由注射针头、缝合针、各种穿刺针等医疗锐器导致的
皮肤损伤。

3 .导管拔除后，闭合性辅料覆盖 48 小时。

对

错（正确答案）

4 .PORT 封管建议使用肝素溶液的浓度为 10U / ml

对

错（正确答案）

5 .外周静脉留置针穿刺处的皮肤消毒范围直径应工 6 厘米，应待消毒液自然干燥后在进行穿刺。

对

错（正确答案）

6 .无菌技术是指在执行医疗、护理操作过程中，防止一切微生物侵入机体，保持无菌物品及无菌区域不被污染的技术。

对（正确答案）

错

7 .导管相关性血流感染是指带有血管内导管或者拔除血管内导

管 72 小时内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴有发热（体温 >38.0 、寒颤或低血压等感染表现，除血管导管外没有其他明确的感染源。

对

错（正确答案）

8 .溶栓药物只能在导管中使用。

对（正确答案）

错

9 .配制抗肿瘤药时操作者应戴双层手套，内层为橡胶手套，外层为乳胶手套。

对

错（正确答案）

三、多选题

10 在输入下列哪些药物时，药物进入静脉管腔以外的周围组织，属于药物渗出（）。

A. 头孢类抗生素（正确答案）

C·化疗药

D. 保护胃黏膜药物（正确答案）

E. 大环内酯类抗生素（正确答案）

11 静脉输液常用工具包括哪些（）。

A. 外周静脉留置针（正确答案）

B. 中心静脉导管（正确答案）

C. 注射器（正确答案）

D. 输液（血）器（正确答案）

E. 一次性静脉输液钢针（正确答案）

4. 静脉炎的风险因素包括哪些（）。

A. 化学因素（正确答案）

B. 机械性因素（正确答案）

C. 细菌性因素（正确答案）

D. 基础疾病（正确答案）

5. 中心静脉导管拔除后正确的处置是 0.

B. 应用无菌敷料密闭穿刺点至少 24 小时，24 小时后评估穿刺点愈合情况（正确答案）

C. 应评估拔除导管的完整性，必要时与置管记录的导管长度比较（正确答案）

D. 患者拔管后保持平卧 30 分钟（正确答案）

E. 交给家属保留

A. 直接扔掉

6. 发生医用粘胶相关皮肤损伤(MARS1)感染风险较高的病人包括()。

A. 新生儿（正确答案）

B. 有开放性伤口（正确答案）

C. 有手术伤口（正确答案）

D. 有中心静脉通路（正确答案）

E. 免疫功能低下的病人（正确答案）

7 . 患者输血前应进行输血相容性检测，输血相容性检测包括

A. ABO 和 RH 血型正反定型

8 . 抗体筛查（正确答案）

C. 交叉配血（正确答案）

D. RH 血型正反定型

E. RH 血型检测（正确答案）

8. 输液附加装置有哪些？（）

A. 三通（正确答案）

B. 无针输液接头（正确答案）

C. 输液器

D. 延长管（正确答案）

E. 过滤器（正确答案）

9. 发生针刺伤最常见环节是？

A. 回套针帽（正确答案）

B. 拔除注射器（正确答案）

D, 采血（正确答案）

E. 整理锐器盒

10. 针刺伤的预防工具与使用要求包括？

A. 宜选择带自动激活装置的安全型针具（正确答案）

B. 宜使用无针输液接头（正确答案）

C. 建议使用带有保护套的针头、安全型采血针（正确答案）

D. 宜建立静脉无针系统，如静脉留置导管宜使用无针连接（正确答案）

E. 条件允许情况下，手术中宜使用钝针（正确答案）

11. 利用体表测量中等长度导管的长度有几种方法，具体如何测量（）。

A. 从预穿刺点沿静脉走向至腋窝水平（正确答案）

B. 从预穿刺点沿静脉走向至同侧锁骨中线（正确答案）

C. 从预穿刺点沿静脉走向至同侧胸锁骨关节减 2cm（正确答案）

D. 从预穿刺点沿静脉走向至肩膀水平

E. 从预穿刺点沿静脉走向至同侧胸锁骨关节减 3cm

12. 新生儿 PICC 置管适应症有哪些？ 0

A. 超早产儿（正确答案）

B. 输注营养液三 7d

C. 输注高渗性 ($>600\text{mOsm/l}$) 液体（正确答案）

D. 输注 $\text{PH}<5$ 或者 $\text{PH}>9$ 的液体或药物（正确答案）

E 患儿体重 $<2500\text{g}$

13. 儿童导管相关性血栓的重要危险因素有 0

A. 患儿诊断急性白血病、脓毒血症，动脉导管未闭

B. 使用肠外营养（正确答案）

C. 在股静脉置管，导管存在功能障碍（正确答案）

D. 导管留置时间长（正确答案）

E. 使用糖皮质激素（正确答案）

14 . 外周静脉留置针置管时选择穿刺部位的评估 0

A. 粗直、弹性好（正确答案）

C. 可以在关节部位穿刺

D. 静脉分支处

E. 瘢痕增生处

15 . 无菌非接触技术（ANTT）的涵义 0.

A. 一种具体而全面定义的无菌技术，具有独特的理论实践框架（正确答案）

B. 以独创的关键部位保护概念为基础（正确答案）

C. 通过将手卫生和个人防护用品等标准预防措与适当的无菌区管理、非接（正确答案）

D. 为所有侵入性临床操作和侵入性医疗器械的管理而设计的（正确答案）

E. 在输液治疗的背景下，包括血管通路装置（NAD）的置入和管理以及输注给药（正确答案）

16 . 静脉输血目的 0

A. 补充血容量，增加有效循环血量，改善心肌功能（正确答案）

B. 纠正贫血，增加血红蛋白含量，促进携氧功能，促进组织修复

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188033106024006033>