

## 主治医师（耳鼻咽喉科学）- 鼻的应用解剖学及生理学 (A1 型题 1)

1、以下哪个鼻甲是筛骨的一部分

- A. 中鼻甲
- B. 下鼻甲
- C. 上鼻甲
- D. 中鼻道
- E. 以上都是

2、鼻中隔动脉的分布中没有以下哪项

- A. 筛前动脉
- B. 筛后动脉
- C. 内眦动脉
- D. 鼻腭动脉
- E. 颈内动脉的分支

3、有关鼻窦的粘膜以下哪项是对的

- A. 是鼻腔粘膜的延续
- B. 具有嗅觉功能
- C. 具有呼吸功能
- D. 具有保护功能

E. 以上都对

4、关于鼻的静脉回流，正确的是

- A. 鼻的腹侧为面静脉
- B. 鼻的颅端为筛静脉
- C. 鼻的背侧为蝶腭静脉
- D. 颈内静脉的分支
- E. 以上都对

5、以下哪个鼻甲骨是独立的

- A. 上鼻甲骨
- B. 中鼻甲骨
- C. 下鼻甲骨
- D. 上、中鼻甲骨
- E. 上、下鼻甲骨

6、鼻腔外侧壁骨骼中没有

- A. 上颌骨
- B. 泪骨
- C. 下鼻甲骨
- D. 中鼻甲骨
- E. 筛骨内壁

7、正常人嗅不出自己呼出的气味的原因是

- A. 呼出气体被蝶骨体折向前方不经嗅区
- B. 呼出气体的气味嗅神经不敏感
- C. 呼出的气体是没有气味的
- D. 鼻腔顶部较窄
- E. 鼻腔底部较窄

8、鼻腔粘膜海绵体多分布在

- A. 鼻腔顶部粘膜下
- B. 上鼻甲及其对应的粘膜处
- C. 上鼻道和中鼻道
- D. 上、中鼻甲及其对应的鼻中隔粘膜下
- E. 中鼻甲及其对应的粘膜处

9、以下各项中不正确的是

- A. 嗅区覆以假层柱状纤毛上皮
- B. 嗅觉部分位上鼻甲和鼻中隔间的区域
- C. 鼻额管开口于半月裂漏斗蜂房
- D. 上鼻道有后组筛窦及蝶窦的开口
- E. 窦口鼻道复合体一般在中鼻道

10、有关鼻窦的开口组合，以下不正确的是

- A. 上颌窦-中鼻道筛漏斗半部
- B. 额窦-中鼻道额隐窝
- C. 前组筛窦-中鼻道筛泡处
- D. 后组筛窦-中鼻道后端
- E. 蝶窦-上鼻道蝶窦筛隐窝

11、鼻腔在 24 小时内排出水分是多少

- A. 500ml
- B. 800ml
- C. 1000ml
- D. 1500ml
- E. 2000ml

12、妨碍鼻粘膜上皮纤毛运动的因素是

- A. 冷热刺激
- B. 过于干燥
- C. 炎症侵犯
- D. 营养缺失
- E. 以上都对

13、和鼻中隔后缘相接的是

- A. 蝶骨体
- B. 上鼻甲
- C. 蝶骨水平板
- D. 筛骨垂直板和犁骨
- E. 中鼻甲

14、上、中、下三个鼻甲各来源于

- A. 上鼻甲为筛骨，中、下鼻甲为蝶骨
- B. 中鼻甲为上颌骨，上、下鼻甲为筛骨
- C. 上、中鼻甲为筛骨，下鼻甲为独立骨片
- D. 均来源于筛骨
- E. 均来源于鼻骨

15、下鼻甲位于鼻腔的

- A. 内侧壁
- B. 外侧壁
- C. 底壁
- D. 顶壁
- E. 外壁

16、有关鼻窦的正确说法是

- A. 可从鼻腔受到感染

- B. 开口于中和下鼻道
- C. 引流主要靠重力作用
- D. 出生时全部发育
- E. 出生时未发育

17、有关鼻窦的说法正确的是

- A. 两侧对称大小一致
- B. 初生儿所有鼻窦均未发育
- C. 粘膜菲薄脆弱仅在窦口附近较厚
- D. 粘膜内有丰富的血管和腺体
- E. 后组筛窦在中鼻道筛泡处

18、有关鼻腔湿润的主要来源，以下哪项是错的

- A. 毛细血管经上皮细胞渗出液
- B. 嗅膜下嗅腺分泌液
- C. 保留呼出气体中的湿润
- D. 粘膜上皮内杯状细胞的分泌液
- E. 粘膜上皮内肥大细胞的分泌液

19、关于鼻腔温度的变化，以下哪种情况是错的

- A. 体表受凉后鼻腔温度下降
- B. 饮酒或感冒后鼻腔温度升高

- C. 鼻腔有炎症时鼻腔温度下降
- D. 上颌窦有炎症侧鼻腔温度升高
- E. 以上都对

20、中鼻甲是下述哪一骨的一部分

- A. 犁骨
- B. 筛骨
- C. 蝶骨
- D. 齿槽骨
- E. 上颌骨

21、鼻粘膜具有颤动能力，每秒约为

- A. 10 次
- B. 4~5 次
- C. 20 次
- D. 50 次
- E. 60 次

22、对上颌窦自然开口的描述，不正确的是

- A. 位于上颌窦裂孔的后上象限
- B. 常规前鼻镜检查不易看
- C. 位于半月裂孔的后部

D. 直径大小不一，平均为 2.8 毫米

E. 筛泡前端

23、上颌窦诸壁中没有哪个壁

A. 顶壁

B. 前壁

C. 后壁

D. 外侧壁

E. 底壁

24、在体位直立状态下不能引流鼻窦的

A. 额窦

B. 筛窦

C. 蝶窦

D. 上颌窦

E. 前筛窦

25、以下哪项不是鼻通气道

A. 前、后鼻孔

B. 下、中、上鼻道

C. 鼻腔

D. 鼻窦腔

E. 总鼻道

26、上颌窦发育成成人形态的年龄是

- A. 5 岁
- B. 10 岁
- C. 15 岁
- D. 20 岁
- E. 22 岁

27、上颌窦穿刺一般在

- A. 7 岁
- B. 8 岁后
- C. 1 岁
- D. 2 岁
- E. 3 岁

28、有关上颌窦的发育，以下哪项是正确的

- A. 2 岁前，前后径增大
- B. 7 岁左右，生长发展迅速
- C. 10 岁后，生长缓慢
- D. 最易引起病变
- E. 以上都对

29、有关蝶窦的发育进展，以下哪项是对的

- A. 胚胎 4 个月是出现蝶窦始基
- B. 7 岁时发展加速
- C. 蝶窦是重要的鼻窦
- D. 鼻窦检查蝶窦不能看到
- E. 以上都对

30、鼻窦中成熟最早的是

- A. 上颌窦
- B. 额窦
- C. 前组筛窦
- D. 后组筛窦
- E. 蝶窦

31、有关鼻的胚胎发育，以下哪项是对的

- A. 第 3 周：嗅基板开始出现
- B. 第 5 周：初鼻腔开始建立
- C. 第 6 周：初鼻腔通到口腔成为口鼻腔
- D. 鼻是逐步发育成形的
- E. 以上都对

32、以下诸项中哪项是错的

- A. 前鼻孔是由大翼软骨围成的
- B. 胚胎 10 周左右口腔和鼻腔境界已形成
- C. 克氏区位于鼻中隔前下方
- D. 乳幼儿时期鼻窦已发育良好
- E. 以上都是错

33、鼻额突出现在胚胎的第几周

- A. 7 周
- B. 4 周
- C. 5 周
- D. 6 周
- E. 8 周

34、鼻窦描述不正确的是

- A. 是鼻腔周围颅骨内的含气空腔
- B. 出生时均已发育
- C. 均开口于鼻腔
- D. 分为前后两组
- E. 以上都错

35、如图，面部“危险三角区”的解剖结构是

- A. 两口角与鼻根部三点连线内的区域
- B. 面前静脉与面深静脉之间的区域
- C. 两眼外眦与下颏尖三点连线的区域
- D. 除外鼻静脉与眼静脉及海绵窦的关系，没有具体的范围
- E. 两口角与鼻尖部三点连线内的区域

36、描述中鼻甲解剖有误的是

- A. 中鼻甲属筛骨结构
- B. 中鼻甲常见的解剖变异有中鼻甲气化和中鼻甲曲线反常
- C. 下、中、上鼻甲在大小上是依次递减 1/3，位置上依次后退 1/3
- D. 前、后两组筛窦以中鼻甲基板为界
- E. 以上都错

37、外鼻静脉的特点中，以下哪项是错的

- A. 动脉血经毛细血管直接达静脉窦
- B. 静脉腔较大
- C. 静脉无瓣膜
- D. 静脉回流直接注入颈内静脉
- E. 静脉较多

38、翼腭神经孔位于

- A. 蝶窦下壁外侧的翼突根部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188065042075006036>