

# 2024 年公共卫生与预防医学题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
- B. 练习操作,以便从原处倒出
- C. 减少瓶内溶液
- D. 检查液体是否清亮      检查瓶口是否有裂缝

【答案】： A

2、支气管镜采用 2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

- A. 120min
- B. 60min
- C. 30min
- D. 20min      10min

【答案】： D

3、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道      胃肠道

【答案】： D

4、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A.  $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B.  $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.  $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$        $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： D

5、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是【单选题】——

- A. 环氧乙烷
- B. 70%乙醇溶液
- C. 0.2%过氧乙酸溶液
- D. 2%戊二醛溶液 0.5%碘伏

【答案】：D

6、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】：C

7、每块手术巾的一边应折叠【单选题】——

- A. 1/10
- B. 1/5
- C. 1/4
- D. 1/3 1/2

【答案】：C

8、儿科病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

9、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是【单选题】——

- A. 检验人员
- B. 消化内科医师
- C.

消化内科护士

D. 腹部外科医师 口腔科医师

【答案】：B

10、输液反应中属于医院感染的有【单选题】——

A. 由于输注液体中药物引起的发热

B. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热

C. 由于液体被细菌污染引起的发热

D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管导管的感染引起的发热

【答案】：C

11、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：B

12、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

A. 1%氯胺溶液

B. 5%碘伏

C. 0.1%苯扎溴铵溶液

D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

13、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

A. 35 分钟

B. 25 分钟

C. 15 分钟

D. 30 分钟 20 分钟

【答案】：D

14、关于消毒因子对人体的危害,错误的是【单选题】——

- A. 微波对人体无害
- B. 液体消毒剂可以造成人体过敏
- C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜
- D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒,还可以发生爆炸吸入戊二醛气体对人体有害

【答案】：A

15、重症监护病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

16、关于无菌器械保存液和消毒剂的描述,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 200$ cfu/mL,致病性微生物不得检出
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 $\leq 5$ cfu/mL,致病性微生物不得检出
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 10$ cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌
- E. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 100$ cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】：E

17、输液反应中属于医院感染的是【单选题】——

- A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- B. 由于液体被细菌污染引起的发热
- C. 由于输注液体中药物引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管、导管的感染引起的发热

【答案】：B

18、II类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌

【答案】：C

19、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 24h
- B. 6h
- C. 48h
- D. 12h 72h

【答案】：A

20、根据我国卫生标准回答以下问题：监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

21、仅直接或间接地和健康无损的皮肤相接触的物品可选择【单选题】——

- A. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】：C

22、后勤人员在治疗室要安置新的紫外线灯做空气消毒,护理人员指导安装其灯管离地面的距离为【单选题】——

- A. <4m
- B. <2m
- C. <2.5m
- D. <3m <3.5m

【答案】： B

23、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

- A. 血液
- B. 体液
- C. 汗液
- D. 排泄物 分泌物

【答案】： C

24、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】： A

25、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

26、根据我国卫生标准回答以下问题:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】

——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: D

27、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】 ——

- A. 脑胶质瘤切除术
- B. 肛瘘切除术
- C. 胰十二指肠肠切除术
- D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】: A

28、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】 ——

- A. 潴留导尿持续 1 周
- B. 集尿袋位处膀胱水平之上
- C. 抗生素膀胱冲洗
- D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】: E

29、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】 ——

- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
- B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
- C. 建立医院的医院感染发病率基线
- D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】: A

30、不属于高度危险物品的是【单选题】——

A. 腹腔镜

B. 导尿管

C.



体温表

D. 穿刺针 手术器材

【答案】：C

31、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——

A. 30cm×30cm×20cm

B. 30cm×30cm×40cm

C. 30cm×40cm×30cm

D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】：D

32、关于输血科预防医院内感染的措施,下列哪项是错误的【单选题】——

A. 保持环境清洁,每天清洁桌面

B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理

C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平

D. 血浆置换术应在Ⅱ类环境中进行并注意消毒隔离 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】：B

33、对预防传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

A. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩

B. 勤洗手

C. 讲究个人卫生

D. 注射丙种球蛋白 不接触传染性非典型肺炎病人或临床诊断病人

【答案】：D

34、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【单选题】——

A. 0.8

B. 1

C.

0.85

D. 0.95 0.9

【答案】：B

35、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理.化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中.低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

36、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

- A. 动物
- B. 血液制品
- C. 各种病人
- D. 食品 病原携带者

【答案】：C

37、预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

38、下列哪项不属医院感染【单选题】——

- A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎
- B. 入院72小时后发生的肺炎
- C. 无症状导管菌尿症
- D. 烧伤6小时入院的创面感染 产道分娩吸入阴道分泌物

的新生儿肺炎

**【答案】**：A

39、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋
- D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】： A

40、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

- A. 应先消毒,用500mg/L有效氯消毒液浸泡30min,再用水洗干净,然后用500mg/L有效氯消毒液浸泡30min,悬挂晾干备用
- B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- C. 先用1000mg/L有效氯消毒剂适量倒在污染地面30min后,用拖把拖干净
- D. 拖把用500mg/L有效氯消毒液浸泡30min后,再洗干净,晾干备用 拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】： A

41、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和治疗措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】： E

42、用紫外线灯做空气消毒时有效距离为【单选题】——

- A. <3.5m
- B. <4m
- C.

<2m

D. <3m <2.5m

【答案】：C

43、属于高效消毒剂的是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

44、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B. 消化内镜用  $500 \times 10^{-6}$  有效氯的含氯消毒剂消毒
- C. 直肠镜采用高压灭菌
- D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟  
磷  
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】：B

45、碘伏属于【单选题】——

- A. 中效消毒剂
- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

46、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,下述描述中错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

47、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

48、以下概念正确的是【单选题】——

- A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理
- B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】：A

49、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500 张病床的医院,一类切口手术部位感染率应低于 0.5%
  - B. 100~500 张病床的医院,医院感染发病率应低于 8%
  - C. 500 张病床以上的医院,医院感染发病率应低于 10%
  - D. 100 张病床以下的医院,一类切口手术部位感染率应低于 2%
- 100 张病床以下的医院,医院感染发病率应低于 7%

【答案】：D

50、《医院感染管理规范》对抗菌药物合理使用的要求中哪一项错误

【单选题】——

- A. 提高细菌培养的送检率。促进抗菌药物合理使用水平
- B. 医院应安排抗感染专家或有经验医师负责医院抗感染药物使用的指导、咨询工作
- C.

检验科和药剂科分别负责定期公布医院主要病原菌及其药敏试验结果

D. 有条件的医院应开展抗感染药物临床应用的监测 医院抗菌药物使用率力争控制在 60%以下

【答案】： E

51、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间 抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】： E

52、根据我国卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： A

53、下列属于医院感染的是【单选题】——

- A. 皮肤粘膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现
- B. 无明显潜伏期的感染为入院 48h 后发生者属医院感染
- C. 由于物理化学因素刺激而产生的炎症反应
- D. 患者原有的慢性感染在院内急性发作 感染病灶自然扩散

【答案】： B

54、下列概念中不正确的是:【单选题】——

- A. 医院感染散发是指医院感染在某医院或某地区住院患者中历年的

一般发病率水平

B.



医院感染的流行趋势是指医院感染持续流行

C. 医院感染发病率是指一定时间内住院患者中发生医院感染新发病例的频率

D. 医院感染流行是指某医院. 某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平  
医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中, 短时间内、突然发生许多医院感染病例的现象

【答案】： B

55、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

A. 放入黄色塑料袋内, 密闭运送, 无害化处理

B. 放入红色塑料袋内, 密封后丢弃

C. 放入黑色塑料袋内, 按垃圾处理

D. 放入黑色塑料袋内, 密闭运送, 无害化处理  
放入白色塑料袋内, 标记处理

【答案】： A

56、医院内感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

A. 医院内感染高危科室高危人群监测

B. 漏报率监测

C. 医院内感染高危因素监测

D. 医院内感染暴发流行监测  
传染病报告卡监测

【答案】： E

57、根据我国卫生标准回答: 根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求, 对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科  
临床科室医院感染管理小组

【答案】： C

58、超广谱酶(ESBLs)菌株所致感染的最佳选药是【单选题】——

- A. 头孢西丁
- B. 阿莫西林
- C. 哌拉西林
- D. 头孢噻肟 氨曲南

【答案】：A

59、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

60、交叉感染【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

【答案】：C

61、传染病房两病床之间的距离应【单选题】——

- A.  $\geq 2.0\text{m}$
- B.  $\geq 1.5\text{m}$
- C.  $\geq 1.2\text{m}$
- D.  $\geq 1.1\text{m}$        $\geq 1.0\text{m}$

【答案】：D

62、下列哪项不属于灭菌剂【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 戊二醛
- C.

碘伏

D. 环氧乙烷 甲醛

【答案】：C

63、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

A. 协助患者直接卧于平车上

B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上

C. 协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单

D. 患者更换清洁衣裤后,卧于平车上 将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】：B

64、病房的医院内感染管理措施中错误的是【单选题】——

A. 感染病人与非感染病人分开

B. 同类感染病人相对集中

C. 特殊感染病人单独安置

D. 室内应定时通风换气,必要时进行空气消毒 地面应常规使用含氯消毒剂消毒

【答案】：E

65、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

A. 注射相关疫苗

B. 全身使用广谱抗生素预防感染

C. 治疗局部感染病灶

D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

66、带入感染【单选题】——

A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

C.

病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 病人在家中已发生的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：C

67、低效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：C

68、层流洁净室【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：A

69、外科刷手时间每次【单选题】——

A. 3分钟以上

B. 1分钟以上

C. 2分钟以上

D. 5分钟以上 4分钟以上

【答案】：A

70、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

A. 在使用抗菌药物前送标本

- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C.

采集标本后及时送检

D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】： B

71、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

A. 手

B. 饮水

C. 食品

D. 医疗器械 衣物

【答案】： A

72、输血科预防医院感染的措施错误的是：【单选题】——

A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌

B. 保持环境清洁,每天清洁桌面

C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离

D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平  
被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】： E

73、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

A. 10m

B. 2m

C. 1m

D. 5m 15m

【答案】： B

74、属于高度危险性物品的是【单选题】——

A. 手术器械和用品

B. 体温表

C. 呼吸机管道

D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】： A

75、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 讲究个人卫生
- B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者
- C. 在通风不好或人群密集的场合戴口罩
- D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】：E

76、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离
- B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离
- C. 大面积烧伤进行接触隔离
- D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后6周

【答案】：E

77、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数8个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】：B

78、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

79、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

- A. 60uw/cm<sup>2</sup>
- B. 100uw/cm<sup>2</sup>
- C. 80uw/cm<sup>2</sup>
- D. 90uw/cm<sup>2</sup> 110uw/cm<sup>2</sup>

【答案】：D

80、对芽孢无效的化学消毒剂是【单选题】——

- A. 0.5%过氧乙酸溶液
- B. 环氧乙烷
- C. 40%甲醛溶液
- D. 2%戊二醛溶液 70%乙醇溶液

【答案】：E

81、严密隔离的措施不对的是【单选题】——

- A. 隔离病房应经常开窗通风,不同类感染患者可同居一室
- B. 入室人员需戴口罩、穿隔离衣及戴手套。一切物品专用
- C. 接触每个患者及其污染物后,必须洗手
- D. 污染的敷料及用品应装袋贴标签,送消毒处理 接触者尽可能注射疫苗或采取预防措施

【答案】：A

82、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

- A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视
- B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士
- C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视
- D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】：C

83、高效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B.



2%戊二醛

- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：B

84、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检
- B. 收到标本后及时检查
- C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合
- D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

85、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

86、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

87、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

A. 制定本科室医院感染管理规章制度

B.

监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施

C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告

D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验  
监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

88、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

A. 青霉素

B. 氨苄西林

C. 磺胺嘧啶

D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：B

89、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——

A. 医院感染的菌株大多为多重耐药性

B. 易感人群抵抗力低,病死率高

C. 在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染

D. 在医院感染治疗效果好,一般不会出现死亡  
医院感染病原体来源广泛

【答案】：D

90、损伤性废物【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：A

91、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭

菌  
B.

洗手刷应一用一灭菌

- C. 隔离手术间应远离手术室入口处
- D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】：C

92、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

93、发现医院感染流行或暴发流行趋势时,进行流行病学调查的基本步骤的第一步是【单选题】——

- A. 查找感染的
- B. 证实流行或暴发
- C. 查找引起感染的因素
- D. 分析流行或暴发的原因 制定防范措施

【答案】：B

94、用紫外线消毒空气的错误方法是【单选题】——

- A. 时间为 30~60 分钟
- B. 有效距离在 2m 内
- C. 每 10m<sup>2</sup> 安装 30W 紫外线灯管一支
- D. 消毒时间为 20~30 分钟 从灯亮 5~7 分钟后开始计时

【答案】：D

95、B-D 试验只适用于【单选题】——

- A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测
- B. 预真空压力蒸汽灭菌器监测
- C. 流动蒸汽灭菌器的监测
- D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】：B

- 96、根据我国卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品【单选题】——
- A. 必须无菌
  - B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
  - C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
  - D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： C

- 97、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——
- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
  - B. 大肠埃希菌
  - C. 沙门菌
  - D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】： C

- 98、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——
- A. 走廊
  - B. 洗漱室
  - C. 配餐室
  - D. 化验室 浴室

【答案】： C

- 99、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——
- A. 戊二醛
  - B. 聚维酮(络合碘)
  - C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
  - D. 乙醇 碘酊

【答案】： A

100、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

- A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理  
立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】：D

101、关于洗手指征错误的是【单选题】——

- A. 脱手套后不需洗手
- B. 接触血液、体液和被污染的物品前后
- C. 接触患者前后
- D. 戴口罩和穿脱隔离衣前后 进行无菌技术操作前后

【答案】：A

102、属于低效消毒剂的是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

103、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：D

104、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

- A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进

行严格消毒处理

B.



对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访

C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白

D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】： C

105、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】

——

A. 全身预防性抗生素的使用

B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗

C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流

D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管 每天灭菌剂清洁会阴

【答案】： C

106、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】

——

A. 空气传播

B. 接触传播

C. 血液传播

D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】： E

107、腹部手术铺单原则【单选题】

——

A. 先上后下,先远后近

B. 以上都不是

C. 先上后下,先近后远

D. 先下后上,先远后近 先下后上,先近后远

【答案】： D

108、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

A.

医院内感染是指在医院内获得的感染

- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染      婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

109、血液-体液隔离应用的标志是【单选题】——

- A. 红色标志
- B. 棕色标志
- C. 黄色标志
- D. 绿色标志    灰色标志

【答案】：A

110、对特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是【单选题】——

- A. 煮沸消毒灭菌法
- B. 过氧乙酸浸泡法
- C. 燃烧灭菌法
- D. 高压蒸汽灭菌法      日光曝晒法

【答案】：C

111、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

- A. 与上次住院有关的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染
- D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染      出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】：B

112、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久

B. 防止细菌污染

C.

防止出血

D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

113、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

A. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计

B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣

C. 严密隔离患者禁止走出病室

D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】：E

114、使用无菌容器正确操作的是【单选题】——

A. 容器内无菌物取出后,未污染物品可放回

B. 开盖 30 分钟内盖好,以防污染

C. 手指不可触及容器内面及边缘,盖的内面朝上

D. 手抓边缘,以便持物牢靠 盖的内面朝下,以便放置稳妥

【答案】：C

115、关于刷手的注意事项,其中正确的是【单选题】——

A. 手刷 48 小时高压消毒 1 次

B. 刷手的时间为 4 分钟

C. 手刷放在刷手盆中

D. 肥皂液每日更换 1 次 刷洗的范围限于被污染的部位

【答案】：D

116、手术间通常保持的湿度【单选题】——

A. 40~60%

B. 30~50%

C. 30~40%

D. 50~60% 40~50%

【答案】：D

117、一级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq$ 8%
- B. 切口感染率 $\leq$ 0.5%
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：D

118、外科刷手法刷手顺序【单选题】——

- A. 手掌,指尖,甲缘,指间,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- B. 甲缘,指尖,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上
- C. 指间,指尖,甲缘,手掌,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- D. 指尖,甲缘,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上  
腕部,前臂,肘部,肘上,指间,指尖,甲缘,刷手至肘上

【答案】：D

119、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是【单选题】——

- A. 伤口立即涂以碘酊
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测
- D. 乙型肝炎病毒高价免疫血清注射 乙型肝炎病毒疫苗注射

【答案】：D

120、手术台上器械护士需要增加无菌纱布,巡回护士取用的正确方法是【单选题】——

- A. 用消毒的手指拿取纱布
- B. 其他都不对
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
- D. 戴手套拿取纱布 用无菌持物钳夹取纱布

【答案】：E

121、合胞体病毒感染宜采取【单选题】——

- A.

消化道隔离

- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： B

122、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C. 物品完全浸没在水中
- D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】： A

123、医务人员在诊疗埃博拉患者时,须做好那种隔离措施【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 床边隔离
- C. 保护性隔离
- D. 空气隔离 消化道隔离

【答案】： A

124、低效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： D

125、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时

- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次



经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

【答案】: E

126、轮状病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】: A

127、医院感染的传播途径一般不包括【单选题】——

- A. 经土壤传播
- B. 经共同媒介物传播
- C. 经空气传播
- D. 经生物媒介传播                      经接触传播

【答案】: A

128、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染    以上都不是

【答案】: D

129、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行
- B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送
- C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度
- D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗  
对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】: E

130、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】：C

131、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医师填报病例
- C. 专职护士到病室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中  
找查病例

【答案】：C

132、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

133、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磷霉素
- C. 林可霉素
- D. 四环素 头孢菌素

【答案】：D

134、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】

——

- A.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/195020100344011204>