

三、妇产科护理

(一) 单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

1-2 题共用题干

李女士，24 岁，已婚，停经 45 天来院就诊。

1. 为了确诊其是否妊娠，快速且最准确的检查方法是 (D)

- A. 妊娠试验
- B. 黄体酮试验
- C. 基础体温测定
- D. 超声检查
- E. 宫颈粘液检查

2. 经检查，确定为宫内孕，其末次月经为 2007 年 3 月 14 日，该孕妇的预产期是 (B)

- A. 2007 年 11 月 21 日
- B. 2007 年 12 月 21 日
- C. 2007 年 10 月 2 日
- D. 2007 年 11 月 28 日
- E. 2007 年 12 月 28 日

3-4 题共用题干

刘某，初孕妇，孕 36 周，来院产前检查。

3. 四步触诊结果：子宫底部触到圆而硬的胎头，胎背位于母体腹部右前方，耻骨联合上方触及软而不规则的胎臀，其胎方位为 (B)

- A. 骶左前
- B. 骶右前
- C. 枕右后
- D. 枕右前
- E. 枕左前

4. 该孕妇胎心听诊在哪里听最清楚 (B)

- A. 脐上左侧
- B. 脐上右侧
- C. 脐下左侧
- D. 脐下右侧
- E. 脐下正中

5-7 题共用题干

高女士，孕 20 周，产前检查时医生为其进行骨盆外测量。

5. 测骶耻外径，应选择体位是 (D)

- A. 仰卧位，双腿伸直
- B. 右侧卧位，左腿伸直，右腿屈曲
- C. 仰卧位，双手抱膝
- D. 左侧卧位，右腿伸直，左腿屈曲
- E. 左侧卧位，左腿伸直，右腿屈曲

6. 骶耻外径的正常值为 (B)

- A. 16-18cm

B. 18-20cm

C. 20-22cm

D. 22-24cm

E. 24-26cm

7. 测坐骨结节间径，正常值为（ C ）

A. 6-7.5cm

B. 7-8.5cm

C. 8.5-9.5cm

D. 9.5-10cm

E. 10-10.5cm

8-11 题共用题干

某孕妇，末次月经不详，第一次来医院产前检查，发现子宫底位于脐与剑突之间。

8. 该孕妇可能的孕周是（ E ）

A. 24 周末

B. 26 周末

C. 28 周末

D. 30 周末

E. 32 周末

9. 此时胎儿身长为（ D ）

A. 25cm

B. 30cm

C. 35cm

D. 40cm

E. 45cm

10. 该孕妇咨询护士，妊娠足月孕妇的体重平均增加多少，回答正确的是（ C ）

A. 8.5kg

B. 10.5kg

C. 12.5kg

D. 14.5kg

E. 16.5kg

11. 护士给该孕妇进行健康宣教，告知其休息时，何种体位最佳（ B ）

A. 平卧位

B. 左侧卧位

C. 胸膝卧位

D. 头低足高位

E. 半卧位

12-13 题共用题干

某孕妇，25 岁，平时身体健康，目前孕 30 周。昨晚平卧于床上看书时，感觉头晕、心悸、出汗。

12. 该孕妇出现的问题是（ D ）

A. 妊娠合并心脏病

B. 妊娠合并高血压

C. 妊娠期高血压疾病

D. 仰卧位低血压综合征

E. 妊娠合并肾炎
13. 正确的处理是 (A)

- A. 改为左侧卧位
- B. 给予口服升压药
- C. 立即坐起
- D. 改为右侧卧位
- E. 起身进行户外活动

14-15 题共用题干

陆女士，孕 30 周，其小腿下半部及踝部出现水肿，休息后消退，无其他异常。

14. 该孕妇水肿程度为 (B)

- A. (-)
- B. (+)
- C. (++)
- D. (+++)
- E. (++++)

15. 下列措施正确的是 (D)

- A. 严格限制盐的摄入
- B. 严格限制水的摄入
- C. 适当限制水的摄入
- D. 适当限制盐的摄入
- E. 可不做任何限制

16-17 题共用题干

某初孕妇，末次月经不详，今日初感胎动，第一次来医院检查。

16. 其孕周大约为 (C)

- A. 妊娠 13-14 周
- B. 妊娠 15-17 周
- C. 妊娠 18-20 周
- D. 妊娠 21-23 周
- E. 妊娠 24-26 周

17. 护士给该孕妇进行宣教，告知其孕期最简便而又较准确地测定胎儿安危的方法是 (A)

- A. 胎动计数
- B. 缩宫素激惹试验
- C. 羊膜镜检查
- D. 测定孕妇尿雌三醇值
- E. 胎心监测

18-19 题共用题干

某孕妇，孕 37 周，常规产前检查，咨询护士分娩先兆。

18. 护士告知该孕妇分娩最可靠的先兆是 (C)

- A. 宫底下降
- B. 不规则宫缩
- C. 阴道见红
- D. 胎动活跃
- E. 阴道分泌物增多

19. 该先兆距离临产的时间大约为 (E)

- A. 1-2 小时
- B. 5-8 小时
- C. 10-12 小时
- D. 12-20 小时
- E. 24-48 小时

20-23 题共用题干

某产妇，妊娠 38 周，规律宫缩 2 小时入院。

20. 护士给她做分娩知识的宣教，下列叙述错误的是 (C)

- A. 子宫收缩是分娩的主要产力
- B. 宫缩随产程进展逐渐增强
- C. 软产道是由子宫体、子宫颈、阴道及盆底软组织构成
- D. 初产妇第一产程时间平均为 11-12 小时
- E. 自然破膜多发生在宫口近开全时

21. 入院后 9 小时，宫缩好。肛查：宫口开大 8cm，胎头位于坐骨棘下 2cm，诊断为 (A)

- A. 正常活跃期
- B. 潜伏期延长
- C. 活跃期延长
- D. 正常第二产程
- E. 第一程延长

22. 入院 12 小时后，顺利娩出一女婴，此后的处理哪项是错误的 (D)

- A. 新生儿娩出后立即清理呼吸道
- B. 对新生儿进行 Apgar 评分
- C. 处理脐带时注意给新生儿保暖
- D. 胎儿娩出后，立即按摩宫底，娩出胎盘，减少产后出血
- E. 产后 2 小时留在产房继续观察

23. 新生儿出生后，经检查心率每分钟 98 次，呼吸浅慢不规则，全身皮肤青紫，吸痰器清理呼吸道时喉部有轻微反射，四肢肌张力稍有抵抗，该新生儿 Apgar 评分应为 (C)

- A. 0 分
- B. 3 分
- C. 5 分
- D. 6 分
- E. 7 分

24-25 题共用题干

某产妇，会阴侧切，顺产一女婴，母子无异常，母乳喂养。

24. 产后第 1 天，护士向其做产后乳房护理指导，不正确的指导是 (D)

- A. 哺乳前可按摩乳房
- B. 喂奶结束后，挤出乳汁涂抹于乳头上
- C. 可用湿毛巾清洁乳房
- D. 可用酒精清洁乳头
- E. 使用合适大小的乳罩

25. 对该产妇的产褥期护理，下列内容错误的是 (C)

- A. 产后 1 小时进流食或清淡半流食
- B. 休息时避免患侧卧位
- C. 鼓励多饮水，产后 7 小时内及时排尿
- D. 保持外阴清洁，勤换会阴垫
- E. 会阴伤口可用红外线照射，以利愈合

26-28 题共用题干

某高危孕妇，目前孕 35 周，提早住院观察待产。

26. 如要了解胎儿成熟度，可以进行下列哪项检查（ A ）

- A. 卵磷脂 / 鞘磷脂比值测定
- B. 胎儿电子监护
- C. 胎动计数
- D. 盆腔 B 超
- E. 雌三醇测定

27. 如想了解该孕妇的胎盘功能，可以进行下列哪项检查（ E ）

- A. 卵磷脂 / 鞘磷脂比值测定
- B. 肌酐值
- C. 脂肪细胞计数
- D. 胆红素测定
- E. 胎盘生乳素测定

28. 护士指导该孕妇数胎动，告知 12 小时的胎动总数，提示为胎儿窘迫的是（ A ）

- A. 10 次以下
- B. 15 次以下
- C. 20 次以下
- D. 25 次以下
- E. 30 次以下

29-30 题共用题干

初产妇，26 岁，妊娠 40 周，规律宫缩 5 小时，胎头高浮，胎心 140 次/分，宫口开大 2cm。6 小时后破膜，立即听胎心率，减慢至 80 次/分钟。

29. 本例应首先考虑的是（ B ）

- A. 胎头受压，脑血流量一时性减少
- B. 脐带脱垂
- C. 胎盘功能不良
- D. 宫体包裹胎体
- E. 脐带绕胎儿颈部

30. 经吸氧，左侧卧位等处理后，复测胎心为 85 次/分钟，此时正确处置应是（ E ）

- A. 继续吸氧，严密观察产程进展
- B. 补充水和食物，增强产妇体力
- C. 灌肠，督促排尿
- D. 静脉滴注缩宫素，加速产程进展
- E. 立即行剖宫产术

31-33 题共用题干

患者，女性，25 岁。停经 45 天，阴道少量流血 2 天，伴下腹部轻度酸痛，尿妊娠试验（+），妇科检查：宫口闭，子宫 6 周妊娠大小。

31. 该患者考虑哪项诊断（ A ）

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

32. 对确诊最有价值的检查项目应是 (D)

- A. 黄体酮试验
- B. 测量基础体温
- C. 尿妊娠试验
- D. B 型超声检查
- E. 诊断性刮宫

33. 对该患者的护理, 下列哪项是正确的 (D)

- A. 立即做清宫术准备
- B. 做凝血功能检查
- C. 顺其自然, 不做处理
- D. 绝对卧床休息
- E. 常规使用抗生素

34-35 题共用题干

患者, 女性, 23 岁, 停经 45 天, 2 天前有少量阴道出血, 今晨起阴道流血量增多, 多于月经量, 阵发性腹痛加重, 无组织排出。查体: 子宫如孕 40 天大小, 宫口开。

34. 该患者考虑哪项诊断 (B)

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

35. 取以下哪项措施 (B)

- A. 遵医嘱使用保胎药物
- B. 立即行清宫手术
- C. 可不需特殊处理
- D. 需做凝血功能检查
- E. 卧床休息

36-37 题共用题干

患者, 女性, 35 岁, 曾经因宫颈内口松弛, 发生过三次自然流产, 均在孕 4 个月左右。现停经 2 个月, 无阴道流血及腹痛, 妊娠试验阳性。

36. 该患者考虑哪项诊断 (E)

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 复发性流产

37. 对该患者目前哪项护理是正确的 (D)

- A. 有出血情况时再处理

- B. 有宫缩时卧床休息
- C. 立即行宫颈内口缝扎术
- D. 绝对卧床休息
- E. 预防性口服硫酸舒喘灵

38-40 题共用题干

患者，女性，已婚，27岁。停经50日，阴道少量流血1日。今晨5时无原因出现下腹剧痛，伴恶心呕吐及一过性晕厥。查面色苍白，血压70/40mmHg，脉搏120次/分，妇科检查：宫颈举痛明显，后穹隆触痛(+)，盆腔触诊不满意。

38. 该患者初步考虑哪项诊断 (C)

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 异位妊娠
- D. 完全流产
- E. 葡萄胎

39. 为明确病情，此时最有价值的辅助检查方法是 (C)

- A. 宫腔镜检查
- B. 诊断性刮宫
- C. 行阴道后穹隆穿刺
- D. B超
- E. 行腹腔镜检查

40. 此时最适宜的处理是 (C)

- A. 住院观察病情
- B. 给予止痛药物
- C. 做急诊手术的准备
- D. 指导进食以增加热量摄入
- E. 卧床休息

41-44 题共用题干

孕妇，妊娠36周，主诉头晕、头痛、视物模糊、恶心。查血压160/110mmHg，尿蛋白6g/24h，下肢水肿(++).

41. 诊断可能性最大的为 (D)

- A. 妊娠期高血压
- B. 子痫前期轻度
- C. 妊娠水肿
- D. 子痫前期重度
- E. 子痫

42. 为进一步明确诊断，下列哪项检查价值高 (C)

- A. B超
- B. 心电图
- C. 眼底检查
- D. 肝肾功能检查
- E. 血常规

43. 该患者治疗药物首选 (A)

- A. 硫酸镁
- B. 苯妥英钠

- C. 山莨菪碱
- D. 利血平
- E. 胍屈嗪

44. 用药过程中，如发生了中毒现象，除应停药外，还应给予（D）

- A. 5%的葡萄糖静脉滴注
- B. 肌注山莨菪碱
- C. 静注 50%的葡萄糖
- D. 静注 10%的葡萄糖酸钙
- E. 静注低分子右旋糖酐

45-46 题共用题干

初孕妇，37 岁，妊娠 35 周，诊断为妊娠期高血压疾病（子痫前期重度），枕左前位，胎心 140 次/分，骨盆外测量正常。

45. 本例恰当处理应是（B）

- A. 积极治疗，等待产程自然发动
- B. 积极治疗 24-48 小时病情无好转，应终止妊娠
- C. 积极治疗一周后病情无好转，应终止妊娠
- D. 立即引产
- E. 立即行剖宫产术

46. 治疗 3 小时后，患者突然出现抽搐，医生诊断为子痫，对该患者的护理错误的是（B）

- A. 将患者安置在单人暗室
- B. 放音乐使患者情绪稳定
- C. 严密监护，记录出入量
- D. 放置压舌板防止舌咬伤
- E. 及时清理呼吸道分泌物

47-51 题共用题干

孕妇，妊娠 33 周，无诱因阴道出血约 150ml，腹部检查：腹软，无压痛，胎位清楚，胎心 148 次/分，阴道可见少量血液。

47. 最可能的诊断是（C）

- A. 胎盘早剥
- B. 早产
- C. 前置胎盘
- D. 妊娠期高血压疾病
- E. 见红

48. 为进一步明确诊断，宜选择哪项检查（D）

- A. 阴道检查
- B. 肛查
- C. 腹部检查
- D. B 超检查
- E. X 线检查

49. 本例目前的处理应是（A）

- A. 期待疗法
- B. 催产素引产
- C. 人工破膜

D. 行剖宫产术

E. 口服止血药物

50. 对该患者错误的护理措施是 (D)

A. 卧床休息，左侧卧位

B. 监测胎心、胎动，了解胎儿有无缺氧

C. 保持外阴清洁，每日会阴擦洗 2 次

D. 持续吸氧，加强胎儿的供氧

E. 遵医嘱使用宫缩抑制剂、镇静剂等

51. 预防本病发生最有意义的项目是 (A)

A. 避免多次刮宫、多产及产褥感染

B. 避免宫腔内压力骤然降低

C. 加强定期的产前检查

D. 妊娠期间避免长时间仰卧和腹部外伤

E. 积极防治妊娠期高血压疾病

52-53 题共用题干

某孕妇，妊娠 32 周，因子痫前期重度入院治疗，4 小时后出现持续性腹痛，阴道无流血。查体：面色苍白，血压 80/50mmHg，子宫大于妊娠周数，硬如板状，有压痛，胎心、胎动消失。

52. 该孕妇最可能的诊断是 (E)

A. 妊娠合并急性阑尾炎

B. 先兆子宫破裂

C. 前置胎盘

D. 先兆早产

E. 胎盘早剥

53. 下列护理中错误的是 (B)

A. 观察生命体征，及时记录

B. 指导患者绝对卧床休息

C. 注意患者有无凝血功能障碍的表现

D. 建立静脉通路，遵医嘱输血、输液

E. 预防产后出血

54-56 题共用题干

患者，女性，32 岁。妊娠 33 周，出现不规则宫缩，宫口未开，胎膜未破，胎心 140 次/分。

54. 该患者的诊断为 (A)

A. 先兆早产

B. 早产临产

C. 假临产

D. 足月临产

E. 生理性宫缩

55. 目前首要的处理应是 (A)

A. 抑制宫缩

B. 卧床休息，右侧卧位

C. 促进宫缩

D. 顺其自然

E. 吸氧

56. 为预防早产儿特发性呼吸窘迫综合症,可在分娩前对孕妇使用哪种药物(D)

A. 给氧

B. 能量合剂

C. 小三联注射

D. 地塞米松

E. 抗生素

57-59 题共用题干

24 岁初孕妇,平时月经规律,目前妊娠 43 周,自觉胎动减少 2 日。血压 110/70mmHg 枕左前位,无头盆不称征象。

57. 该孕妇目前可以忽略的检查项目是 (B)

A. B 型超声监测

B. 测量宫高和腹围

C. 胎儿监护仪监测胎心变化

D. 宫颈成熟度评分

E. 超声多普勒测胎心数

58. 为能正确处理,目前最重要的检查项目是 (C)

A. 测羊水卵磷脂/鞘磷脂比值

B. 测羊水胆红素类物质值

C. 测孕妇尿中雌激素/肌酐比值

D. 测羊水肌酐值

E. 测羊水脂肪细胞百分率

59. 经上述检查证实胎盘功能减退,此时最恰当的处理应是 (B)

A. 静滴缩宫素促使其经阴道分娩

B. 行剖宫产术结束分娩

C. 左侧卧位,吸氧,等待自然分娩

D. 刺激乳头诱发宫缩

E. 静滴维生素C,吸氧,等待自然分娩

60-61题共用题干

某孕妇,孕30周,腹壁紧张、膨隆,医生诊断为羊水过多,需要腹壁穿刺放羊水。

60. 放水速度宜控制在每小时约 (D)

A. 200m

B. 300ml

C. 400ml

D. 500m

E. 600ml

61. 一次放水量不超过 (D)

A. 500m

B. 800ml

C. 1200ml

D. 1500m

E. 2000ml

62-65题共用题干

患者，女性，23岁，初次怀孕，孕16周出现心慌、气短，经检查发现心功能Ⅱ级。给予严密孕期监测，目前孕37周，自然临产。

62. 该患者妊娠期心脏负担最重的时期是（ D ）

- A. 孕12周内
- B. 孕24-26周
- C. 孕28-30周
- D. 孕32-34周
- E. 孕36-38周

63. 妊娠期护理措施中错误的是（ E ）

- A. 加强产前检查，及早发现心衰表现
- B. 每天保证10个小时以上的睡眠
- C. 取左侧卧位或半卧位
- D. 饮食以高热量、高维生素，低盐低脂为宜
- E. 妊娠4个月起每天食盐量不超过6-7克

64. 该产妇分娩的体位最好取（ D ）

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 随意卧位
- D. 左侧卧位上半身抬高
- E. 仰卧位

65. 分娩比较顺利，产后心功能Ⅲ级，该产妇的产褥期护理正确的是（ A ）

- A. 产后前3天，最容易发生心衰
- B. 产后30分钟可以开奶
- C. 产后第2天可下床活动，防止便秘
- D. 为避免菌群失调，不使用抗生素治疗
- E. 指导做产后体操，尽早恢复盆底肌肉张力

66-67 题共用题干

某孕妇，29岁，妊娠期糖尿病，于孕39周顺产一男婴。

66. 对该孕妇的产褥期护理错误的是（ C ）

- A. 注意有无心悸、出冷汗等低血糖表现
- B. 保持清洁，预防产后感染
- C. 该男婴按正常新生儿护理
- D. 严密监测产妇血糖变化
- E. 指导产妇适度运动，合理饮食

67. 该新生儿出生后30分钟开始需定时喂服下列哪种溶液（ C ）

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 10%葡萄糖溶液
- C. 25%葡萄糖溶液
- D. 生理盐水
- E. 母乳

68-71 题共用题干

孕妇，妊娠27周，在产前检查中发现血红蛋白90g/L，血清铁5.5mmol/L。

68. 最可能的诊断是（ D ）

- A. 妊娠生理性贫血

- B. 再生障碍性贫血
- C. 巨幼细胞性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 溶血性贫血

69. 首选的治疗为 (D)

- A. 口服叶酸
- B. 少量多次输血
- C. 肌肉注射右旋糖酐铁
- D. 口服硫酸亚铁
- E. 肌注山梨醇铁

70. 正确的用药时间是 (B)

- A. 餐前半小时
- B. 餐后 20 分钟
- C. 空腹时
- D. 睡前
- E. 晨起后

71. 在补充铁剂时应同时服 (C)

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 维生素 E

72-75 题共用题干

初产妇，28 岁，规律宫缩 10 小时入院，肛查宫口开 4cm。4 小时后肛查宫口仍为 4cm，宫缩 7-8 分钟一次，持续时间 30 秒，胎膜未破，头盆相称，胎位正常。

72. 从产程图上可以看出，该产妇存在的问题是 (C)

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

73. 目前最恰当的处理是 (C)

- A. 镇静剂
- B. 催产素静滴
- C. 人工破膜
- D. 肌注杜冷丁
- E. 剖宫产

74. 经以上处理后，医嘱静滴缩宫素，护士在 0.9%生理盐水 500ml 中应加入缩宫素 (A)

- A. 2.5U
- B. 3U
- C. 3.5U
- D. 4U
- E. 4.5U

75. 在使用缩宫素的注意事项中，下列哪项是错的（ D ）

- A. 专人观察
- B. 注意胎心
- C. 注意血压
- D. 一般滴速不超过 50 滴/分钟
- E. 以 4-5 滴/分钟开始

76-78 题共用题干

初孕妇，28 岁，妊娠 28 周，腹部检查：子宫呈纵椭圆形，胎先露部较软且不规则，胎心在脐上偏左。

76. 本例应诊断为（ B ）

- A. 肩先露
- B. 臀先露
- C. 额先露
- D. 枕先露
- E. 面先露

77. 如需要胎位矫正，护士应告知其最佳的干预时间是（ E ）

- A. 孕 20 周后
- B. 孕 22 周后
- C. 孕 24 周后
- D. 孕 28 周后
- E. 孕 30 周后

78. 矫正此胎位可采取的体位是（ A ）

- A. 膝胸卧位
- B. 半卧位
- C. 左侧卧位
- D. 膀胱截石位
- E. 俯卧位

79-81 题共用题干

初产妇，孕 33 周，有液体从阴道流出来院，无腹痛。行肛查，触不到羊膜囊，上推胎儿先露部可见到流液量增多，胎心率正常，体温正常。

79. 最可能的诊断为（ D ）

- A. 先兆流产
- B. 先兆早产
- C. 临产
- D. 胎膜早破
- E. 胎盘早剥

80. 护士应指导孕妇的体位是（ D ）

- A. 仰卧位
- B. 右侧卧位
- C. 头高足低位
- D. 左侧卧位，抬高臀部
- E. 半坐卧位

81. 对该患者的处理错误的是（ B ）

- A. 期待疗法

- B. 催产素引产
- C. 保持外阴清洁，会阴擦洗每日 2 次
- D. 监测胎心
- E. 密切观察体温

82-83 题共用题干

某产妇，胎儿娩出后 24 小时出血量达 600ml，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。

82. 造成该产妇产后出血的最可能原因是（ A ）

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎盘残留
- C. 软产道裂伤
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎膜残留

83. 首要的处理原则是（ D ）

- A. 检查凝血功能
- B. 抗感染
- C. 检查软产道
- D. 加强宫缩
- E. 清理宫腔

84-86 题共用题干

患者女性，足月产后 3 天，出现下腹痛，低热，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软。

84. 考虑其最可能的病理是（ A ）

- A. 急性子宫内膜炎、子宫肌炎
- B. 急性宫颈炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 急性盆腔结缔组织炎
- E. 盆腔腹膜炎

85. 该产妇宜采取的体位是（ C ）

- A. 侧卧位
- B. 仰卧位
- C. 半坐卧位
- D. 头低足高位
- E. 俯卧位

86. 该产妇最不可能存在的护理问题是（ A ）

- A. 营养失调
- B. 体温升高
- C. 焦虑
- D. 疼痛
- E. 知识缺乏

87-88 题共用题干

某产妇，10 日前顺产一女婴。今早突感阴道流血增多，查体：低热，血压 80/50mmHg 子宫大而软，宫口松弛，有残留组织堵塞，B 型超声检查提示宫腔内有残留组织。

87. 导致该患者出现目前状况最直接的原因可能是 (C)

- A. 子宫复旧不全
- B. 子宫胎盘附着面感染
- C. 蜕膜残留
- D. 绒癌
- E. 胎盘、胎膜残留

88. 该患者最主要的护理诊断是 (C)

- A. 焦虑
- B. 知识缺乏
- C. 外周组织灌注无效
- D. 急性疼痛
- E. 气体交换障碍

89-91 题共用题干

患者女, 35 岁, 已婚。主诉近日白带增多, 外阴瘙痒伴灼痛 1 周。妇科检查: 阴道内多量灰白泡沫状分泌物, 阴道壁散在红斑点。

89. 该患者初步考虑为 (E)

- A. 细菌性阴道病
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 外阴瘙痒症
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

90. 为明确诊断, 首选的检查是 (A)

- A. 阴道分泌物悬滴检查
- B. 宫颈刮片
- C. 盆腔 B 超
- D. 诊断性刮宫
- E. 阴道镜检查

91. 护士对该患者进行健康指导, 下列说法错误的是 (C)

- A. 口服甲硝唑可有恶心、呕吐等副反应
- B. 甲硝唑用药期间因禁酒
- C. 局部用药时注意用药连贯性, 经期不能停药
- D. 穿纯棉内裤, 经常更换
- E. 外阴不要用肥皂擦洗

92-94 题共用题干

患者, 女性, 38 岁, 因外阴瘙痒, 白带异常就诊, 医生诊断为外阴阴道假丝酵母菌病。

92. 关于该病的认识, 患者认知错误的是 (A)

- A. 假丝酵母菌对热的抵抗力很强
- B. 取分泌物检查前 24-48 小时禁止性交
- C. 局部用药是主要的治疗方法
- D. 局部用药宜在晚上睡前完成
- E. 分泌物取出后应及时送检

93. 对于该病的治疗, 适合阴道冲洗的溶液为 (C)

- A. 1% 乳酸溶液

- B. 2%乳酸溶液
- C. 2-4%碳酸氢钠溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 0.9%氯化钠溶液

94. 局部冲洗后阴道应放置 (C)

- A. 甲硝唑泡腾片
- B. 红霉素
- C. 制霉菌素片
- D. 青霉素
- E. 链霉素

95-96 题共用题干

患者女性，60 岁，患老年性阴道炎，该患者询问护士发病原因，护士告知直接影响阴道自净作用的激素下降。

95. 这个激素是 (B)

- A. 孕激素
- B. 雌激素
- C. 促黄体生成素
- D. 促卵泡素
- E. 促性腺激素释放激素

96. 下列哪个溶液适合对该患者进行阴道灌洗 (A)

- A. 1%乳酸溶液
- B. 2%乳酸溶液
- C. 2-4%碳酸氢钠溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 0.9%氯化钠溶液

97-98 题共用题干

患者女性，29 岁，外阴不适，白带增多。辅助检查：氨试验，有烂鱼样腥臭味。

97. 该患者所患疾病最可能是 (A)

- A. 细菌性阴道病
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 外阴瘙痒症
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

98. 下列哪个溶液适合对该患者进行阴道灌洗 (A)

- A. 1%乳酸溶液
- B. 2%乳酸溶液
- C. 2-4%碳酸氢钠溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 0.9%氯化钠溶液

99-101 题共用题干

患者女性，37 岁，已产，医生诊断为宫颈中度糜烂。

99. 针对该患者，最合适的处理是 (D)

- A. 门诊随访观察
- B. 局部药物治疗

- C. 口服抗生素
- D. 排除早期宫颈癌后进行物理治疗
- E. 宫颈锥切术

100. 患者询问治疗的时间，护士告知最佳时间是（ E ）

- A. 月经来潮前 3-7 天
- B. 排卵期
- C. 无时间限制
- D. 确诊后
- E. 月经干净后 3-7 天

101. 患者询问治疗后禁止性生活和盆浴的时间，护士应回答（ D ）

- A. 1-2 周
- B. 2-3 周
- C. 3-6 周
- D. 4-8 周
- E. 6-12 周

102-104 题共用题干

患者，女，37 岁，G₁P₀。3 天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏Ⅲ级。

102. 患者询问检查结果的意义，正确的解释是（ C ）

- A. 轻度炎症
- B. 重度炎症
- C. 可疑癌症
- D. 高度可疑癌症
- E. 癌症

103. 对于该患者需要进一步做宫颈活检，关于宫颈活检哪项是错误的（ B ）

- A. 是确诊宫颈癌最有效的方法
- B. 钳取宫颈病变区边缘组织为宜
- C. 碘试验着色区域活检诊断价值高
- D. 宜多点取材
- E. 标本固定送病检

104. 经宫颈活检，确诊为宫颈癌，行宫颈癌根治术，术后 2 天，患者询问护士其尿管何时可拔出，护士的回答是（ D ）

- A. 1-3 天
- B. 2-5 天
- C. 3-7 天
- D. 7-14 天
- E. 2-3 周

105-107 题共用题干

患者，女性，28 岁，已婚，平素月经规律无痛经史。妇科普查发现盆腔包块，无特殊不适。查外阴、阴道正常，宫颈光滑，子宫前位，正常大小，其右侧扪及一近 3 个月妊娠大小包块，活动好，无压痛。B 超示子宫大小正常，其右侧有一儿头大小强回声团，边界清。

105. 下列诊断可能性最大的是（ D ）

- A. 卵巢癌

- B. 卵巢巧克力囊肿
- C. 卵巢畸胎瘤
- D. 输卵管卵巢囊肿
- E. 子宫浆膜下肌瘤

106. 患者转身时突然出现右下腹剧痛，伴恶心、呕吐，最可能的是该包块并发了（ A ）

- A. 蒂扭转
- B. 破裂
- C. 内出血
- D. 感染
- E. 急性阑尾炎

107. 患者需急诊手术，术前准备不需做（ B ）

- A. 皮肤准备
- B. 阴道准备
- C. 膀胱准备
- D. 床位准备
- E. 胃肠道准备

108-109 题共用题干

53 岁妇女，绝经 4 年，阴道流脓血样物伴有臭味月余。妇科检查子宫稍大、稍软，有压痛，双附件未触及异常。

108. 该患者应首先考虑（ D ）

- A. 功血
- B. 子宫肌瘤
- C. 生殖道炎症
- D. 生殖道恶性肿瘤
- E. 多囊卵巢综合征

109. 本例最有价值的处置是（ D ）

- A. 检查血、尿常规
- B. 宫颈刮片细胞学检查
- C. 阴道分泌物涂片查病原体
- D. 分段诊刮活组织检查
- E. 静滴广谱抗生素消炎治疗

110-112 题共用题干

27 岁妇女，停经近 3 个月，阴道少量流血 5 日。查子宫如妊娠 4 个月大，软，双附件区各有 $5\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$ 囊性肿物。

110. 本例应考虑是（ C ）

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 葡萄胎
- D. 早孕合并卵巢囊肿
- E. 先兆流产合并卵巢囊肿

111. 为明确诊断，下列哪项检查最有价值（ A ）

- A. B 超
- B. hCG 检查

C. X线胸片

D. CT

E. 雌激素检查

112. 诊断明确后，首选的治疗（ B ）

A. 子宫全切除

B. 清宫术

C. 子宫次切术

D. 化疗

E. 雌激素治疗

113-114 题共用题干

患者，女性，子宫肌瘤，定于周四上午在连续硬膜外麻醉下行全子宫切除术。

113. 周三需做的术前准备不包括（ E ）

A. 皮肤准备

B. 测量生命体征

C. 抽血做血型及交叉配血试验

D. 心理护理

E. 留置尿管

114. 护士为其进行术后指导，告知患者术后阴道残端肠线吸收，可致阴道少量出血，大约在术后（ B ）

A. 1-2 天出现

B. 1-2 周出现

C. 3-4 天出现

D. 3-4 周出现

E. 5-6 天出现

115-117 题共用题干

患者女性，60 岁。自诉腰骶部酸痛，劳累后尤其明显。嘱患者平卧用力向下屏气时，发现宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内。

115. 该患者属于（ C ）

A. 子宫脱垂 I 度轻型

B. 子宫脱垂 I 度重型

C. 子宫脱垂 II 度轻型

D. 子宫脱垂 II 度重型

E. 子宫脱垂 III 度

116. 给该患者予手术治疗，术后患者适宜的卧位为（ C ）

A. 半坐位

B. 截石位

C. 位

D. 侧卧位

E. 俯卧位

117. 护士指导患者盆底肌肉组织锻炼的方法为（ B ）

A. 下肢运动

B. 收缩肛门的运动

C. 仰卧起坐

D. 俯卧撑

E. 上肢运动

118-121 题共用题干

患者，女性，38 岁，已婚，自然流产 1 次，近半年来月经周期正常，30-32 天，经期延长，10-15 天，经量增多。

118. 该患者初步诊断为（ B ）

- A. 子宫内膜单纯型增生
- B. 子宫内膜不规则脱落
- C. 黄体功能不足
- D. 萎缩型子宫内膜
- E. 子宫内膜复杂型增生

119. 医生医嘱行诊刮术，患者询问护士诊刮目的是（ A ）

- A. 确定有无排卵及黄体功能
- B. 改善子宫内环境
- C. 防止感染
- D. 了解子宫大小
- E. 促进子宫收缩

120. 刮宫时间应在（ D ）

- A. 月经来潮前 1 周
- B. 月经来潮 12 小时内
- C. 月经第 3 天
- D. 月经第 5 天
- E. 月经来潮 24 小时内

121. 刮出的内膜呈现什么改变（ C ）

- A. 子宫内膜单纯型增生
- B. 增生晚期内膜
- C. 增生期内膜与分泌期内膜混合存在
- D. 萎缩型子宫内膜
- E. 子宫内膜复杂型增生

122-123 题共用题干

患者，女性，28 岁，痛经 3 年且逐渐加重，2 年前因不孕做过输卵管通液治疗，子宫较正常略大，后位，不活动，右侧触及 4×4×3cm 大的痛性包块，与子宫粘连，双宫骶韧带均触及豆粒大痛性结节。

122. 本病首先考虑为（ D ）

- A. 陈旧性宫外孕
- B. 生殖器结核
- C. 慢性盆腔炎
- D. 子宫内膜异位症
- E. 输卵管卵巢囊肿

123. 为进一步明确诊断，首选的检查方法是（ C ）

- A. 双合诊
- B. 三合诊
- C. 腹腔镜
- D. CA125
- E. 盆腔 B 超

124-127 题共用题干

患者，女性，30 岁，结婚 5 年。婚后第 1 年因工作繁忙于妊娠 40 天行药物流产。近 2 年多来未避孕，欲生育，但一直未孕。月经 5-6 天/28-30 天，妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫中位，大小正常，左侧附件增厚，右侧(一)。

124. 该患者的最主要诊断是 (B)

- A. 原发性不孕症
- B. 继发性不孕症
- C. 宫颈糜烂
- D. 陈旧性宫外孕
- E. 宫外孕

125. 为明确原因，建议患者测基础体温，有关基础体温的描述，错误的一项是 (C)

- A. 无排卵周期呈单相型
- B. 有排卵周期呈双相型
- C. 受雌激素影响基础体温上升 0.3-0.5℃
- D. 需连续测 3 个月以上
- E. 睡眠不足会影响结果

126. 该患者基础体温测定呈双相型，下一步处理宜首选 (C)

- A. 宫腔镜检查
- B. 腹腔镜检查
- C. 输卵管通畅检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 宫颈黏液涂片检查

127. 该患者作此检查选择的时间适宜在 (D)

- A. 月经来潮前 6 小时
- B. 排卵前 24 小时
- C. 排卵后 48 小时
- D. 月经干净后 3-7 天
- E. 月经干净后 10 天

128-129 题共用题干

患者女性，30 岁。已婚，生育史:1-0-1-1，宫内节育器避孕，因“停经 45 天，阴道少量流血 1 日伴下腹隐痛 8 小时”就诊。体检:神智清，心肺(一)，生命体征正常，尿妊娠试验弱阳性。

128. 为确定诊断，除了妇科检查之外，此时最有价值的辅助检查方法是 (D)

- A. 血常规
- B. 腹部 X 线摄片
- C. 阴道后穹隆穿刺
- D. B 型超声
- E. 腹腔镜检查

129. 若确定是宫内妊娠，最合适的处理措施是 (C)

- A. 黄体酮保胎治疗
- B. 药物流产
- C. 取环后行人工流产
- D. 水囊引产术

E. 取环后继续保胎治疗

130-133 题共用题干

24 岁已婚妇女，停经 6 周，尿妊娠试验阳性，因高热一周，曾服多种药物，要求人流。人流时出现恶心呕吐、出汗，面色苍白。查体：血压 80/60mmHg，心率 46 次/分。

130. 本例最可能的诊断应是（ B ）

A. 宫腔粘连综合征

B. 人工流产综合反应

C. 多囊卵巢综合征

D. 希恩综合征

E. Turner 综合征

131. 本例正确处理应是（ B ）

A. 立即输液并输血

B. 静脉注射阿托品

C. 肌注肾上腺素

D. 静脉滴注间羟胺

E. 终止手术，待病情好转再进行

132. 经积极处理，手术顺利完成。对该患者的术后指导错误的是（ A ）

A. 术后在观察室休息观察 30 分钟

B. 应严密观察腹痛、阴道出血、生命体征等

C. 嘱患者术后注意保持外阴清洁

D. 嘱患者注意观察阴道流血和腹痛情况，如出血多于月经量并伴有腹痛应及时就诊

E. 嘱患者术后禁盆浴和性生活 1 个月

133. 该患者术后 15 天，仍有较多阴道出血，经抗菌素及宫缩剂治疗无效，子宫稍大而软，宫口开，应首先考虑（ E ）

A. 子宫内膜炎

B. 吸宫不全

C. 宫腔粘连

D. 月经不调

E. 子宫复旧不全

134-135 题共用题干

王女士，30 岁，育有 2 孩，准备避孕。

134. 来医院咨询宫内节育器的放置禁忌证，护士的回答错误的是（ A ）

A. 月经过少

B. 宫颈内口过松

C. 生殖道炎症

D. 严重全身性疾病

E. 月经频发或不规则阴道流血

135. 一个月后，该女士来医院顺利放置宫内节育器，术后 3 天因少量阴道流血，自觉下腹轻度不适来复诊。最合适的处理是（ C ）

A. 立即取出宫内节育器

B. 应用抗生素，待阴道流血停止后取环

C. 暂不予处理，观察 1 周后，如症状不消失再就诊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197030154066006041>