

2024 年护士面试笔试题目

护士面试笔试题目 1

一、单项选择题：30 分

1.等渗性脱水，下列哪项是错误的

- A 临床最多见
- B 血清钠明显降低
- C 有轻度口渴
- D 眼球下陷

答案：B

2.急性肠梗阻治疗中，最首要措施是

- A 胃肠减压
- B 输血
- C 纠正水电解质紊乱
- D 及时手术

答案：C

3.肝移植患者出现下列哪项表现提示发生了排斥反应

- A 胆汁减少
- B 烦躁不安
- C 体温降低
- D 黄疸

答案：A

4.脾破裂引起下列何种休克

A 感染性休克

B 疼痛性休克

C 损伤性休克

D 低血容量性休克

答案：D

5. 甲亢病人术后最危险的并发症是

A 喉返神经损伤

B 术后呼吸困难和窒息

C 手足抽搐

D 甲状腺危象

答案：D

6. 颅脑外伤的中间清醒期的临床意义为

A 判断有无颅内感染

B 判断有无脑室内出血

C 判断有无硬膜外血肿

D 判断有无颅内肿瘤

答案：C

7. 治疗急性颅内高压的首选药物是

A 50% 葡萄糖

B 25% 山梨醇

C 30% 尿素

D 20% 甘露醇

答案：D

8.胸腔穿刺抽液时，患者出现头晕、出汗、面色苍白、四肢发凉，应立即

A 减慢抽液速度

B 停止抽液、平卧、观察血压

C 高浓度吸氧

D 皮下注射阿托品

答案：B

9.闭合性骨折在转运前最重要的是

A 使用止痛剂

B 作好手法复位

C 伤肢固定

D 保持肢体功能位

答案：C

10.最严重的石膏综合征是

A 呼吸困难

B 剧烈疼痛

C 急性胃扩张

D 末梢血运差

答案：C

11.下列哪个不是影响护患关系的影响源

A 护理人员的语言

B 行为举止

C 情绪

D 服务

答案: D

12. 女性患者, 71 岁, 长期卧床后, 骶尾部出现 $3 \times 5\text{cm}$ 大小压疮, 皮下有硬结, 皮肤有水泡, 并已破溃, 露出潮湿红润的疮面, 有痛感, 你诊断压疮为

A 淤血红润期

B 炎性浸润期

C 浅表溃疡期

D 坏死溃疡期

答案: B

13. 患者完全瘫痪, 肌力完全丧失, 你评估为几级肌力

A0 级

B4 级

C5 级

D6 级

答案: A

14. 患者脉搏每隔一个搏动后出现一次期前收缩, 叫

A 心动过速

B 间歇脉

C 脉搏短绌

D 交替脉

答案: B

15. 某药物的最小有效量和最小中毒量之间的差距为此药物的

- A 治疗量
- B 效价强度
- C 治疗窗
- D 安全范围

答案：D

16. 下列哪项是阿托品的药理作用

- A 胃肠平滑肌痉挛
- B 升高尿道与膀胱逼尿肌的张力和收缩
- C 使瞳孔扩大
- D 减慢心房和房室传导

答案：C

17. 青霉素过敏性休克首选什么药物抢救

- A 阿托品
- B 地塞米 X
- C 肾上腺素
- D 异丙嗪

答案：C

18. 胰岛素治疗中最易发生的并发症是

- A 脂肪萎缩或增生
- B 胰岛素抵抗
- C 过敏反应

D 低血糖反应

答案：D

19. 下列哪项不是胸外心脏按压的有效指征

A 扪及大动脉搏动

B 皮肤颜色由苍白发绀转为红润

C 瞳孔扩大

D 自主呼吸恢复

答案：C

20. 强心甙中毒最常见的表现是，是强心甙中毒的早期指征。

A 胃肠道反应

B 神经系统反应

C 心脏反应

D 呼吸系统反应

答案：A

21. 治疗饮食下列不正确的是

A 高蛋白饮食

B 低盐饮食

C 少渣饮食

D 半流质饮食

答案：D

22. 尿失禁的原因包括

A 真性尿失禁

- B 假性尿失禁
- C 压力性尿失禁
- D 以上均是

答案：D

23. 消化性溃疡患者口服氢氧化铝药物时不正确的方法为

- A 服药时间一般饭前 1 小时为宜
- B 宜咀嚼或磨碎后用水冲服，不宜整片吞服
- C 一般饭后 1 小时为宜
- D 也可在节律性疼痛前 30 分钟或睡前服用

答案：A

24. 发生空气栓塞时的正确体位是

- A 左侧卧位
- B 右侧卧位
- C 头低足高位
- D 左侧卧位并头低足高位

答案：D

25. 大量咯血致死因素最常见于

- A 窒息死亡
- B 休克死亡
- C 心衰死亡
- D 多脏器衰竭

答案：A

26. I 型呼衰的特征正确的是

- A 只有低氧血症，不伴有高碳酸血症
- B 既有缺氧又有二氧化碳潴留
- C 常见于肺泡通气不足
- D 氧疗的原则为低浓度持续给氧

答案：A

27. 测量血压时，使测得的血压偏高的因素正确的是

- A 袖带太宽
- B 袖带缠得太松
- C 手臂位置高于心脏水平
- D 视线高于水银柱弯月面

答案：B

28. 采集静脉血标本正确的是

- A 采血清用抗凝管
- B 采全血用普通管
- C 采血培养严格无菌操作，防止污染
- D 为减轻患者痛苦，可在输液处采血标本

答案：C

29. 尿细菌定量培养下列不正确的是

- A 最好是清晨第一次的清洁新鲜的中段尿
- B 在应用抗菌素后留取尿标本
- C 严格无菌操作，先清洗外阴，再留中段尿，并在一小时内做细菌培养

D 留取的尿标本未在一小时内做培养，应冷藏保存

答案：B

30.肝硬化最严重的并发症是

A 上消化道出血

B 肝性脑病

C 肝肾综合征

D 感染

答案：B

二、多项选择题：10 分

1.经静脉补钾的原则有

A 见尿补钾

B 每天补钾 3—6g

C 高浓度钾静脉注射

D 限制速度 0.75—1.5g/h

答案：ABD

2.休克治疗的原则有

A 保持呼吸道通畅

B 经常给病人翻身

C 保持病人安静

D 取中凹位

答案：ACD

3.急性坏死性胰腺炎的并发症有

- A 休克
- B 化脓性感染
- C 胰腺假性囊肿
- D 慢性胰腺炎

答案：ABCD

4.破伤风病人的典型症状有

- A 面色潮红
- B 角弓反张
- C 苦笑面容
- D 呼吸困难

答案：BCD

5.瘫痪患者常见的并发症

- A 压疮
- B 坠积性肺炎
- C 泌尿系感染
- D 心力衰竭

答案：ABC

三、名词解释：9分

1.缺氧：

答案：是指组织得不到充足氧或不能充分利用氧时，组织的代谢、功能，甚至形态、结构都可能发生异常变化的病理过程。

2.应急性溃疡：

答案：是指患者在遭受各类重伤、重病和其它应激情况下，出现胃、十二指肠粘膜的急性病变，主要表现为胃、十二指肠粘膜的糜烂、浅溃疡、渗血等，少数可较深或穿孔。

3.出血动脉：

答案：是大脑中动脉垂直向上发出的中央支，又称豆纹动脉，该动脉行程呈 S 形，因血流动力学关系在高血压动脉硬化时容易破裂而导致脑溢血，故又名出血动脉。

四、填空题：16 分

1.甲状腺危象多发生在术后()小时内，表现为() () 等症状。

答案：12-36 小时，高热、脉搏快弱

2.肠套叠的三大典型症状是() () () 。

答案：腹痛、血便、腹部肿块。

3.DIC 可分为() () () 。

答案：高凝期、消耗性低凝期、继发性纤溶亢进期

4.颅内压增高的“三主征”为() () () 。

答案：头痛、呕吐、视神经乳头水肿

5.Glasgow 昏迷评分法(GCS)评定患者的意识状况，按() () () 三方面的反应来计分。

答案：睁眼、语言、运动

6.骨折专有体征为() () () 。

答案：畸形、反常活动、骨擦音或骨擦感

五、是非题：10 分

1.消化系统由消化管和消化腺两大部分组成。(√)

答案：对

2.左心房的冠状窦口前内缘，三尖瓣隔侧尖附着缘和 Todaro 腱之间的三角区称为 Koch 三角。（×）

答案：错

3.氮质血症是指血中尿素、肌酐、尿酸等非蛋白含氮物质的含量降低。（×）

答案：错

4.代谢性碱中毒是指由于血浆 HCO_3^- 原发性增高所引起的 PH 值升高。（√）

答案：对

5.氧疗对低张性缺氧效果最好。（√）

答案：对

6.胃大部分位于左季肋区，小部分位于腹下区。（×）

答案：错

7.输卵管由内侧向外侧可分为子宫部、子宫峡部、子宫漏斗部、子宫壶腹部。（×）

答案：错

8.在脑和脊髓的内面，软脑膜、软脊膜和蛛网膜之间的腔隙称为蛛网膜下腔。（×）

答案：错

9.低渗性脱水是指失 Na^+ 多于失水。（√）

答案：对

10.男性尿道的二个弯曲耻骨下弯和耻骨前弯。后者是固定不变的。（×）

答案：错

六、简答题：16 分

帮助患者清除呼吸道分泌物时，应采取哪些措施？

护士面试笔试题目 2

1.细胞外液中的主要阳离子是(A)

A. 钠

B. 钾

C. 镁

D. 钙

2.下列哪项是等渗性缺水的特点(D)

A. 循环血量增多

B. 细胞外高渗状态

C. 细胞外低渗状态

D. 水与钠等比例丧失

3.中度低渗性缺水血清钠值(C)

A. 130mmol/L

B. 110mmol/L

C. 120mmol/L

D. 128mmol/L

4.水中毒治疗原则哪项正确(A)

A. 严重时静脉输注高渗盐水

B. 减少水和钠的继续丧失

C. 鼓励病人饮水

D. 静脉补充非电解质溶液

5.血清 pH 正常值(B)

A. 7.35~7.4

B. 7.35~7.45

C. 7.25~7.45

D. 7.3~7.45~

6. 第一间隙容纳体液成分(A)

A. 细胞内液

B. 血浆

C. 组织间液

D. 腹腔液

7. 正常成人体内过剩的钠钾主要经过下列哪项排出体外(D)

A. 汗水

B. 呼吸道蒸发

C. 粪便

D. 尿液

8. 外科中最常见的缺水类型(A)

A. 急性缺水

B. 慢性缺水

C. 继发性缺水

D. 原发性缺水

9. 下列哪项是等渗性缺水处理原则(C)

A. 5% 葡萄糖溶液

B. 10% 葡萄糖溶液

C. 平衡盐溶液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197122051005010010>