

皮肤与性病学(医学高级): 皮肤与性病学考试试题

1、单选 有助于黄瘤诊断的辅助检查不包括()。

- A. 冷冻切片猩红或苏丹红染色
- B. 血脂检查
- C. 脂蛋白电泳
- D. 免疫球蛋白测定
- E. 血液涂片查泡沫细胞

正确答案: E

(江南博哥) **参考解析:** 黄瘤病的皮损组织病理可检见泡沫细胞, 而非血液涂片

2、单选 多形红斑外用药物的治疗原则不包括()。

- A. 消炎
- B. 止痒
- C. 预防感染
- D. 干燥
- E. 收敛

正确答案: D

3、单选 下列各项, 不属桔梗的主治病证是

- A. 肺痈
- B. 咳嗽
- C. 咽痛
- D. 痰证
- E. 眩晕

正确答案: E

4、单选 皮肤纤维瘤的主要临床特点为()。

- A. 好发于躯干
- B. 皮疹为棕红、黄褐至黑褐色的圆形、卵圆形坚实丘疹
- C. 皮疹易于破溃
- D. 泛发性皮肤纤维瘤好发于儿童
- E. 皮损多伴有轻度疼痛或瘙痒

正确答案: B

5、单选 与II型超敏反应无关的成分是()。

- A. IgM / Iga
- B. 补体
- C. NK 细胞
- D. 吞噬细胞
- E. T 细胞

正确答案: E

参考解析： II型超敏反应是由 IgM / IgG 类抗体与靶细胞表面相应抗原结合后，在补体、吞噬细胞和 NK 细胞参与下，引起的以细胞溶解或组织损伤为主的病理性免疫反应。

6、单选 可用于热毒疮疡、烧烫伤的药物是

- A. 大黄
- B. 郁李仁
- C. 火麻仁
- D. 芫花
- E. 牵牛子

正确答案： A

7、单选 患者男，阴囊部出现针头大的丘疹，随年龄增多而逐渐增多，呈暗红色，病理可见真皮乳头层内毛细血管扩张，部分扩张的毛细血管由向下伸长的表皮突包绕，血管周围有轻度炎症细胞浸润，弹力纤维断裂，表皮棘层不规则肥厚，角化过度。你认为可能性最大的诊断应该是（）。

- A. 鲍温样丘疹病
- B. 血管角皮瘤
- C. 草莓状血管瘤
- D. 乳房外 Paget 病
- E. 阴囊湿疹

正确答案： B

8、单选 不是手足湿疹表现的是（）。

- A. 多形性皮损，境界不清
- B. 对称分布
- C. 常伴有甲增厚、污秽、脱落
- D. 一般不累及甲病变
- E. 伴有瘙痒

正确答案： C

9、多选 神经性皮炎有以下哪些特点区别于慢性湿疹（）。

- A. 先痒，后呈苔藓样变
- B. 皮损呈正常肤色苔藓化斑片，外周有正常肤色扁平丘疹
- C. 皮损呈紫红色苔藓化斑片，外周有紫红色扁平丘疹
- D. 好发于颈项、骶尾、四肢伸面
- E. 慢性病程，反复发作，无渗出史

正确答案： A, B, D, E

10、单选 SLE 累及关节肌肉时，下列哪个说法正确（）。

- A. 可有肌痛，肌无力明显
- B. 受累关节常发生畸形
- C. 可出现缺血性骨坏死，以股骨头受累最常见

- D. 5%患者有关节疼痛
- E. 血清酶升高

正确答案： C

11、单选 患者2个月前右臀、下肢起红斑、水疱，伴疼痛，经治疗皮损好转，但局部仍较疼痛。检查：右臀、下肢外侧、腹股沟部位可见色素沉着。舌暗红、苔白，脉弦细。治疗选用下列哪一方最为适宜：

- A. 龙胆泻肝丸加减
- B. 当归饮子加减
- C. 桃红四物汤加减
- D. 血府逐瘀汤加减
- E. 四物消风汤加减

正确答案： C

12、单选 以下关于急性期 HIV 感染的描述错误的是（ ）

- A. 临床症状多为非特异性
- B. CD_8^+ T细胞减少
- C. 血清抗 HIV 抗体阴性
- D. 多数患者无任何体征

正确答案： B

13、单选 下列不属于晚期梅毒的是（ ）。

- A. 结节性梅毒疹
- B. 树胶肿
- C. 近关节结节
- D. 红斑糜烂性梅毒疹
- E. 梅毒性主动脉瓣关闭不全

正确答案： D

参考解析： 红斑糜烂性梅毒疹是二期梅毒的黏膜损害之一。

14、多选 下列病毒不属于 DNA 病毒的是（ ）。

- A. 麻疹病毒
- B. 风疹病毒
- C. 人类乳头瘤病毒
- D. 埃可病毒
- E. 柯萨奇病毒

正确答案： A, B, D, E

参考解析： 人类乳头瘤病毒属于 DNA 病毒。麻疹病毒、风疹病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒均属于 RNA 病毒。

15、单选 对寻常型鱼鳞病描述正确的是（ ）。

- A. 常染色体隐性遗传

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198044024061006076>