

护士三基考试血液内科练习题

护士三基考试血液内科练习题

一、单选题 A1 型

(每题只有一个正确答案)

1、慢性淋巴细胞白血病首发症状常是：(E)

A、肝大

B、脾大

C、发热

D、贫血

E、淋巴结肿大

2、多发性骨髓瘤最常见的早期症状是：(C)

A、贫血

B、出血

C、骨痛

D、淋巴结肿大

E、高黏滞血症

3、病人，男，22岁。临床诊断为再生障碍性贫血。查体周身皮肤可见瘀点和瘀斑；左侧颊部可见一约1.2cm×0.8cm的口腔溃疡，口腔黏膜未见血疱形成；咽无充血，扁桃体不肿大；双肺未闻干湿啰音。为有效预防感染，目前该病人首要采取的护理措施是：(B)

A、加强营养

B、加强口腔护理

C、保护性隔离

D、保持皮肤清洁、干燥

E、保证会阴部清洁卫生

4、可确诊再生障碍性贫血的是(D)

A、进行性贫血、出血、感染、脾不肿大

B、网织红细胞减少

C、有氯霉素服药史

D、骨髓象见巨核细胞明显减少

E、服用抗贫血药物无效

5、使用维生素 B12 治疗时要注意补充 (B)

A、钠盐

B、钾盐

C、镁

D、钙

E、磷

6、患者男，50 岁。主因头晕、乏力，来医院就诊，实验室检查：

RBC $3.95 \times 10^{12} / L$ ，Hb 90g / L，疑诊为 (A)

A、贫血

B、神经衰弱

C、肾炎

D、脑水肿

E、白血病

7、造血干细胞移植患者进行中心静脉导管穿刺后应使用自粘弹性

绷带对伤口进行局部加压包扎几小时 (C)

A、8

B、12

C、24

D、30

E、48

8、关于铁的吸收，哪项错误 (C)

A、与维生素 C 同时服好

B、低铁比高铁好

C、与维生素 B12 同时服好

D、主要在十二指肠上段吸收

E、每天约吸收 1mg

9、再生障碍性贫血不正确的治疗是 (B)

A、贫血严重者可小量输新鲜血

B、并发肺部感染者给予氯霉素抗感染

C、可给予糖皮质激素治疗

D、内科治疗效果不佳可行脾切除

E、可给予胎肝细胞输注

10、急性再生障碍性贫血早期最突出表现是 (C)

A、出血

B、贫血

C、出血和感染

D、肝脾大

E、感染

11、脑膜及中枢神经系统白血病的叙述不正确的是 (D)

A、是由于白血病细胞浸润至脑膜或中枢神经系统所致

B、可出现头痛、恶心、呕吐

C、症状出现较晚，主要是因为化疗药物不易透过血脑屏障

D、起病急，多发于急性期

E、重者有呕吐、颈项强直等症状

12、营养性缺铁性贫血患儿最主要的特点是 (A)

A、小细胞低色素性贫血

B、正细胞低色素性贫血

C、大细胞低色素性贫血

D、大细胞高色素性贫血

E、小细胞高色素性贫血

13、有关口服铁剂的注意事项，错误的是 (E)

A、向患者说明服用铁剂后可出现黑便

B、服用铁剂前后 1 小时禁饮浓茶

C、避免铁剂溶液与牛奶同服

D、服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下

E、症状改善后可停药

14、急性白血病病人最常见的症状是 (A)

A、发热

B、贫血

C、出血

D、胸骨局限性压痛

E、疲乏

15、铁剂可用于治疗 (C)

A、溶血性贫血

B、巨幼红细胞性贫血

C、小细胞低色素性贫血

D、自身免疫性贫血

E、再生障碍性贫血

16、造血干细胞移植患者进行日常口腔护理的时间是 (C)

A、进食后 30 分钟后

B、进食后 1 小时后

C、进食后 30 分钟内

D、进食后 1 小时内

E、进食后 2 小时内

17、治疗慢性淋巴细胞白血病最常用的药物是： (C)

A、马法兰

B、羟基脲

C、氟达拉滨

D、干扰素

E、单克隆抗体

18、下列哪项是缺铁性贫血的表现 (D)

A、牙龈出血

B、发热伴大量出汗

C、骨骼疏松

D、毛发无光泽及“反甲”

E、皮肤紫癜

19、不符合特发性血小板减少性紫癜临床表现的是 (A)

A、脾大和贫血

- B、多有畏寒和发热
- C、多见于四肢黏膜出血
- D、内脏出血
- E、皮肤瘀斑、血肿

20、下列药物禁用于 ITP 病人的是 (D)

- A、强的松(泼尼松)
- B、阿莫西林
- C、红霉素
- D、阿司匹林
- E、地西洋

21、患者在进行药物淋浴过程中出现晕厥和虚脱时，以下护理方法错误的是 (B)

- A、立即停止药物淋浴
- B、协助患者半坐卧位
- C、用手指掐压人中、内关、合谷等穴位
- D、并立即通知医师，遵医嘱进行处理
- E、待患者休息精神好转后继续药浴

22、由免疫因素引起血小板减少的出血性疾病是 (C)

- A、白血病
- B、再生障碍性贫血
- C、ITP
- D、营养性贫血
- E、红细胞增多症

23、下列关于血小板的描述错误的是 (E)

- A、由骨髓成熟巨核细胞所产生
- B、功能为保护毛细血管的完整性
- C、参与止血和凝血过程
- D、许多出血性疾病常与血小板质与量的变化有关
- E、参考值为 $100 \times 10^9 \sim 200 \times 10^9 / L$

24、使用下列药物不损伤血小板的是 (E)

- A、阿司匹林
- B、右旋糖酐
- C、保泰松
- D、双嘧达莫
- E、硫酸亚铁

25、区分急性白血病和再生障碍性贫血的表现是 (E)

- A、发热
- B、贫血
- C、皮肤出血
- D、颅内出血
- E、胸骨压痛

26、下列哪项不是白血病的临床表现 (C)

- A、发热
- B、出血
- C、血糖降低
- D、贫血
- E、器官浸润

27、有关腹型过敏性紫癜病人腹痛特点的描述正确的是： (B)

- A、持续性胀痛
- B、阵发性绞痛
- C、针刺样痛
- D、持续性钝痛
- E、牵拉样痛

28、再生障碍性贫血应选用 (C)

- A、叶酸
- B、铁剂
- C、丙酸睾酮
- D、硫酸亚铁
- E、维生素 B6

29、锁骨下双腔中心静脉导管穿刺后伤口 24 小时换药一次，之后

每几日维护一次 (D)

A、 2

B、 3

C、 5

D、 7

E、 8

30、临床上不出现发绀的疾病是 (D)

A、 急性肺炎

B、 慢性阻塞性肺气肿

C、 自发性气胸

D、 严重贫血

E、 右心衰竭

31、下列关于病人入无菌层流室后的护理不正确的是： (B)

A、 米饭用高压蒸汽消毒后食用

B、 苹果用清水洗净即可食用

C、 进食前后漱口

D、 眼药水滴眼，每天 2~3 次

E、 女性每天会阴冲洗

32、中性粒细胞增多见于 (E)

A、 伤寒

B、 再生障碍性贫血

C、 脾功能亢进

D、 淋巴瘤

E、 慢性粒细胞白血病

33、CsA 毒副作用主要为 (E)

A、 肝毒性

B、 心脏毒性

C、 肺纤维化

D、 皮疹

E、 肾毒性

34、预防脑膜或中枢神经系统白血病的主要措施是（D）

- A、放射治疗
- B、联合化疗
- C、骨髓移植
- D、缓解巩固期鞘内注射化疗药物
- E、激素治疗

35、慢性粒细胞白血病临床特征中最为突出的是：（A）

- A、巨脾
- B、广泛出血倾向
- C、胸骨压痛
- D、严重贫血
- E、合并感染

36、患儿，1岁半。诊断为营养性缺铁性贫血，需口服铁剂治疗。

护士对家长进行应用铁剂

的指导，其中不正确的是（C）

- A、注意观察药物反应，可能有恶心、排便异常等
- B、应在两餐之间服用，减少对胃肠道的刺激
- C、可与牛奶同时服用，利于铁剂吸收
- D、可用吸管服用，以避免牙齿染黑
- E、患儿大便呈黑色是正常反应，停药后恢复正常

37、白血病患者行骨髓移植最适当的时机是（C）

- A、缓解诱导治疗前
- B、缓解期任何时机
- C、第一次完全缓解时
- D、合并严重感染时
- E、多次缓解之后

38、营养性巨幼细胞贫血出现震颤的护理措施有（E）

- A、预防感染
- B、防止心力衰竭
- C、提倡母乳喂养

D、绝对卧床休息

E、防止患儿受伤

39、铁剂治疗缺铁性贫血患儿后早期有效指标是 (C)

A、血红蛋白量上升

B、红细胞数上升

C、网织红细胞上升

D、红细胞形态正常

E、白细胞数正常

40、急性白血病化疗诱导缓解后，病人头痛、呕吐、颈强直，但不发热，最可能发生 (C)

A、脑出血

B、脑血栓

C、中枢神经系统白血病

D、脑膜炎

E、蛛网膜下腔出血

41、孕妇最易并发哪种贫血 (B)

A、恶性贫血

B、缺铁性贫血

C、再生障碍性贫血

D、溶血性贫血

E、珠蛋白生成障碍性贫血

42、引起婴幼儿缺铁性贫血的最根本的原因是 (A)

A、体内铁缺乏

B、铁的摄入不足

C、生长发育快，需铁量增加

D、某些疾病的影响

E、铁丢失过多

43、下列不是缺铁性贫血临床表现的是 (D)

A、含铁酶的活性降低

B、皮肤干燥、角化、无光泽

C、舌炎、口腔炎

D、皮肤黏膜瘀点、瘀斑

E、神经、精神异常

44、关于巨幼细胞性贫血的临床表现，描述不正确的是：（E）

A、舌炎

B、腹泻

C、牛肉样舌

D、对称性远端肢体麻木

E、异食癖

45、下列缺铁性贫血的特殊表现正确的是：（D）

A、乏力

B、头晕

C、皮肤、黏膜苍白

D、异食癖

E、心悸

46、有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述，下列哪项不正确（E）

A、症状纠正后继续服药 3~6 个月

B、网织红细胞数增加是治疗有效的指标

C、于饭后服用

D、服药后可出现黑便

E、可防止缺铁性贫血的复发

47、缺铁性贫血最主要的是缺（A）

A、贮存铁

B、血清铁

C、蛋白质

D、甲状腺素

E、钴

48、营养性缺铁性贫血，服用铁剂停药的时间应是（E）

A、血红蛋白量恢复正常

B、血红蛋白量恢复正常后 1 周

- C、血红蛋白量恢复正常后 2 周
- D、血红蛋白量恢复正常后 1 个月
- E、血红蛋白量恢复正常后 2 个月

49、患儿，5 个月。人工喂养，未添加辅食。1 个月来皮肤、黏膜苍白，肝脾增大。血红蛋白 80g / L，以小细胞为主。该患儿贫血为 (A)

- A、营养性缺铁性贫血
- B、溶血性贫血
- C、出血性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、营养性巨幼细胞贫血

50、营养性缺铁性贫血的好发年龄是 (D)

- A、1 个月
- B、2~3 个月
- C、6 个月内
- D、6 个月~2 岁
- E、3 岁以上

51、血小板减少性紫癜病因 (B)

- A、细菌直接感染
- B、自身免疫
- C、变态反应
- D、病毒
- E、寄生虫

52、关于自体外周血造血干细胞的回输，描述正确的是：(C)

- A、冷冻保存的造血干细胞可直接回输
- B、回输 2 袋外周血干细胞之间不用生理盐水冲管
- C、回输干细胞的同时，另一路静脉输注等量鱼精蛋白
- D、解冻融化后的干细胞应立即用有滤网输液器输注
- E、回输前不应用任何药物抗过敏

53、再生障碍性贫血患者应选用 (C)

- A、铁剂
- B、叶酸
- C、丙酸睾酮
- D、硫酸亚铁
- E、维生素 B6

54、移植前化疗期间患者的饮食护理要点错误的是 (C)

- A、移植前化疗阶段应进食含高蛋白、高维生素的饮食，如瘦肉、牛肉、剔刺的鱼肉、剔骨的排骨等，还要多吃新鲜的蔬菜
- B、有恶心症状时可少量进食，注意少食多餐。两餐之间可以吃不易引起恶心的辅助食物，如面包干、饼干等
- C、进餐与服药间隔应小于半小时
- D、不能食用腌制类、发酵类、罐头类、烧烤类、油炸类食物
- E、选择自己喜好的食物，特别注意的是所有的食物需要经过微波高温消毒 3~5 分钟

55、关于口服铁剂的护理，下列错误的是 (C)

- A、宜在饭后服用
- B、禁饮浓茶
- C、忌与维生素 C 同服
- D、避免与牛奶、磷酸盐同服
- E、液体铁剂经稀释后用吸管服用

56、糖皮质激素对下列哪种疾病治疗最有效 () (C)

- A、血友病
- B、原发性血小板增多症
- C、特发性血小板减少性紫癜
- D、血栓性血小板减少性紫癜
- E、弥散性血管内凝血

57、特发性血小板减少性紫癜的护理诊断是 (C)

- A、潜在并发症：心力衰竭
- B、营养失调
- C、潜在并发症：内脏出血

D、活动无耐力

E、有受伤的危险

58、警惕白血病患者颅内出血的血小板值为 (D)

A、 $100 \times 10^9 / L$

B、 $80 \times 10^9 / L$

C、 $50 \times 10^9 / L$

D、 $20 \times 10^9 / L$

E、 $10 \times 10^9 / L$

59、血液病患者的白细胞低于下列哪项时需进行保护性隔离 (A)

A、 $1.0 \times 10^9 / L$

B、 $1.5 \times 10^9 / L$

C、 $2.0 \times 10^9 / L$

D、 $2.5 \times 10^9 / L$

E、 $3.0 \times 10^9 / L$

60、中心静脉导管会出现堵塞时可用何种浓度的尿激酶进行通管 (D)

A、1 : 2000

B、1 : 3000

C、1 : 4000

D、1 : 5000

E、1 : 6000

61、关于慢性粒细胞白血病加速期的表现，描述不正确的是： (E)

A、不明原因高热

B、体重下降

C、骨、关节痛

D、进行性贫血

E、淋巴结迅速肿大

62、患儿，10个月，面黄来诊，诊断为营养性小细胞性贫血。下述处理哪项是不必要的 (D)

A、设法增进食欲

- B、口服铁剂
- C、口服维生素 C
- D、肌肉注射维生素 B12
- E、预防发生心功能不全

63、区别急性与慢性白血病的主要依据是 (D)

- A、病程长短
- B、发病年龄、性别
- C、贫血程度
- D、骨髓幼稚白细胞的成熟程度
- E、血白细胞剧增的程度

64、某患者，因特发性血小板减少性紫癜而入院，长期应用糖皮质激素治疗。患者向护士询问此药常见的不良反应。护士的回答不应包括 (E)

- A、感染
- B、糖尿病
- C、高血压
- D、多毛症
- E、末梢神经炎

65、患者女，发热、贫血。皮下有出血，脾大，占满腹部，胸骨隐痛。对此高热护理不宜采用的是 (D)

- A、冷盐水灌肠
- B、供给足够的水分
- C、头部置冰袋
- D、酒精擦浴
- E、给予药物降温

66、血液患者化疗期间应维持尿量在 (A)

- A、100ml / h
- B、50ml / h
- C、80ml / h
- D、300ml / h

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198101105126006034>