

2024 年公共卫生与预防医学题库

第一部分 单选题(300 题)

1、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

2、取无菌溶液时下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时瓶签向下
- B. 用前核对瓶签
- C. 检查药液有无沉淀
- D. 保持瓶盖内面无菌 用后立即盖上

【答案】：A

3、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
- B. 练习操作,以便从原处倒出
- C. 减少瓶内溶液
- D. 检查液体是否清亮 检查瓶口是否有裂缝

【答案】：A

4、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】：B

5、下列哪项不属医院感染【单选题】——

- A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎
- B. 入院 72 小时后发生的肺炎
- C. 无症状导管菌尿症
- D. 烧伤 6 小时入院的创面感染 产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】： A

6、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： C

7、脱隔离衣的正确步骤是【单选题】——

- A. 解腰带.刷手.解领扣.解袖扣.脱去隔离衣
- B. 松腰带.解袖扣.刷手.解领扣.系腰带.脱去隔离衣
- C. 松腰带.系腰带.解袖扣.刷手.解领扣.脱去隔离衣
- D. 解袖扣.刷手.解领扣.解腰带.脱去隔离衣 刷手.解腰带.解袖扣.解领扣.脱去隔离衣

【答案】： C

8、关于输血科预防医院内感染的措施,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
- D. 血浆置换术应在 II 类环境中进行并注意消毒隔离

每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】: B

9、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

- A. 潴留导尿持续 1 周
- B. 集尿袋位处膀胱水平之上
- C. 抗生素膀胱冲洗
- D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】: E

10、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

- A. 经消化道传播
- B. 接触传播
- C. 经呼吸道飞沫传播
- D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】: C

11、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

- A. 消毒温度为 65~75℃,作用时间 10~15min
- B. 消毒温度为 70~80℃,作用时间 5~8min
- C. 消毒温度为 45~55℃,作用时间 20~25min
- D. 消毒温度为 85~95℃,作用时间 10~15min 消毒温度为 62℃,作用时间 30min

【答案】: E

12、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

- A. 更改浸泡用药液
- B. 重新洗手
- C. 延长浸泡时间
- D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】: B

13、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

14、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离
- B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离
- C. 大面积烧伤进行接触隔离
- D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后6周

【答案】：E

15、《医院感染管理规范》对抗菌药物合理使用的要求中哪一项错误

【单选题】——

- A. 提高细菌培养的送检率。促进抗菌药物合理使用水平
- B. 医院应安排抗感染专家或有经验医师负责医院抗感染药物使用的指导、咨询工作
- C. 检验科和药剂科分别负责定期公布医院主要病原菌及其药敏试验结果
- D. 有条件的医院应开展抗感染药物临床应用的监测 医院抗菌药物使用率力争控制在60%以下

【答案】：E

16、一次性使用的注射器使用后正确的做法是【单选题】——

- A. 直接放入耐刺、防渗漏的利器盒
- B. 使用后的一次性针头应重新套上针头套
- C. 使用后用手直接分离针头
- D. 使用后先浸泡再用手直接分离针头

使用后的针头连同注射器丢入医用垃圾桶内处理

【答案】：A

17、目前引起输血后肝炎的主要肝炎病毒为【单选题】——

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 戊型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：C

18、对医院新建设施提出卫生学标准的审定意见【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

19、层流洁净室【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：A

20、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C.

保持瓶盖内侧面无菌

D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

21、手术间通常保持的温度【单选题】——

A. 22~26℃

B. 18~20℃

C. 22~25℃

D. 20~22℃ 16~18℃

【答案】：C

22、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

A. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】：D

23、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

A. 寄居部位的改变

B. 宿主的局部或全身免疫功能下降

C. 菌群失调和二重感染

D. 通过空气或水源的感染 潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】：D

24、刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取的隔离方式是【单选题】——

A. 消化道隔离

B. 严密隔离

C. 昆虫隔离

D. 保护性隔离 呼吸道隔离

【答案】： B

25、根据我国卫生标准回答:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

26、关于医院感染的概念错误的是:【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】: C

27、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

- A. 脑室镜
- B. 胸腔镜
- C. 腹腔镜
- D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】: E

28、不属于高度危险物品的是【单选题】——

- A. 腹腔镜
- B. 导尿管
- C. 体温表
- D. 穿刺针 手术器材

【答案】: C

29、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

30、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

- A. 8h
- B. 2h
- C. 16h
- D. 12h 4h

【答案】: E

31、李某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。他要将自己的病情告知外地的家人,他的信件应该怎样处理后方可寄出【单选题】——

- A. 含氯消毒液喷雾
- B. 甲醛熏蒸柜熏蒸
- C. 紫外线照射
- D. 过氧乙酸擦拭 高压蒸汽灭菌

【答案】: B

32、从医疗护理角度讲戴手套的作用不正确的是【单选题】——

- A. 手套可减少患者身上的微生物传播给医务人员的可能性
- B. 手套可以防止医务人员把自身手上的菌群转移给患者的可能性
- C. 手套可以防止医务人员成为传播微生物的媒介
- D.

手套可以防止医务人员将从患者或环境中污染的病原在人群中传播
戴手套后可以不必洗手

【答案】：E

33、传染病房两病床之间的距离应【单选题】——

- A. $\geq 2.0\text{m}$
- B. $\geq 1.5\text{m}$
- C. $\geq 1.2\text{m}$
- D. $\geq 1.1\text{m}$ $\geq 1.0\text{m}$

【答案】：D

34、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

- A. 进行消毒、毁形、进行无害化处理
- B. 经消毒灭菌后重复使用
- C. 集中管理,统一交废品公司回收利用
- D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡,再清洗,然后再进行灭菌处理

【答案】：A

35、传染病房每间病室的病人数不应超过【单选题】——

- A. 6人
- B. 5人
- C. 4人
- D. 3人 2人

【答案】：C

36、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通

过直接或间接传播引起的感染

【答案】：E

37、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】： B

38、经血液、体液传播病原体不包括【单选题】——

- A. 麻疹病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 疟原虫 丙型肝炎病毒

【答案】： A

39、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B. 非接触性感染
- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】： D

40、母婴室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 每名婴儿床位的占地面积不应少于 0.5-1m²
- B. 每张产妇床位的使用面积不应少于 5.5-6.5m²
- C. 严格探视制度,探视者应着清洁服装,洗手后方可接触婴儿
- D. 婴儿有感染性疾病时,应及时与其他婴儿隔离,但患儿母亲不需隔离 产妇在传染病急性期,应暂停哺乳

【答案】： D

41、属于高效消毒剂的是【单选题】——

- A.

醋酸氯己定

- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

42、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C. 城市中心
- D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】：A

43、肛管煮沸消毒时,操作错误的是【单选题】——

- A. 先将肛管洗刷干净
- B. 水沸后开始计时
- C. 肛管腔内注水,用纱布包好
- D. 冷水时放入 在沸水中持续 5~10 分钟

【答案】：D

44、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和采取措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】：E

45、下列属于医院感染的是【单选题】——

A. 皮肤粘膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现

B.

无明显潜伏期的感染为入院 48h 后发生者属医院感染

- C. 由于物理化学因素刺激而产生的炎症反应
- D. 患者原有的慢性感染在医院内急性发作 感染病灶自然扩散

【答案】： B

46、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】： D

47、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

- A. 化学指示卡法
- B. 生物测试法
- C. 化学指示管法
- D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】： B

48、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】： D

49、冲手时应取姿势为【单选题】——

- A. 指尖朝下,手肘朝上
- B. 手指及前臂前伸
- C. 双手互相搓洗手臂

D. 指尖朝上,手肘朝下 手指及前臂平伸

【答案】：D

50、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

- A. 肠道传染病
- B. 泌尿道感染
- C. 外伤感染
- D. 表皮传染病 呼吸道感染

【答案】：E

51、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸气灭菌法

【答案】：E

52、根据我国卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

53、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

- A. 完全具备持续的人传人的能力
- B. 狨猴为自然储存宿主
- C. 以接触传播为主,其次是呼吸道传播
- D. 单峰骆驼可能是人类感染来源 非密切接触即可引起人际间传播

【答案】：D

54、医疗废物为【单选题】——

- A.

使用过的注射针头

- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

55、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】：B

56、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

57、传染病门诊【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：D

58、使用化学消毒剂的注意事项不包括【单选题】——

- A. 性质不稳定的消毒液应临时配制
- B. 严格掌握浸泡时间
- C.

物品要全部浸没在消毒液内

D. 要配成最有效的浓度 消毒前必须用生理盐水冲洗

【答案】：E

59、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

A. 医院感染是指在医院内获得的感染

B. 与上次住院有关的感染是医院感染

C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染

D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】：E

60、手术间通常保持的湿度【单选题】——

A. 40~60%

B. 30~50%

C. 30~40%

D. 50~60% 40~50%

【答案】：D

61、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

A. 清洁的手术环境

B. 工作人员装束和手术室的无菌操作

C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备

D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】：E

62、下述不属于灭菌剂是【单选题】——

A. 20%戊二醛

B. 过氧乙酸

C. 环氧乙烷

D. 甲醛 含氯消毒剂
【答案】：E

63、有关医院感染预防与控制的错误概念是【单选题】——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】：E

64、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医师填报病例
- C. 专职护士到病室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中查找病例

【答案】：C

65、根据我国卫生标准回答以下问题：对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析，提出控制措施，并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

66、输血科预防医院感染的措施错误的是：【单选题】——

- A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测，不得检出致病性微生物和霉菌
- B. 保持环境清洁，每天清洁桌面
- C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗，并定期检查抗体水平

被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】：E

67、使用中消毒液细菌菌落总数应【单选题】——

- A. $\leq 200\text{cfu/ml}$
- B. $\leq 100\text{cfu/ml}$
- C. $\leq 15\text{cfu/ml}$
- D. $\leq 10\text{cfu/ml}$ $\leq 5\text{cfu/ml}$

【答案】：B

68、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

69、使用无菌容器正确操作的是【单选题】——

- A. 容器内无菌物取出后,未污染物品可放回
- B. 开盖 30 分钟内盖好,以防污染
- C. 手指不可触及容器内面及边缘,盖的内面朝上
- D. 手抓边缘,以便持物牢靠 盖的内面朝下,以便放置稳妥

【答案】：C

70、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】：E

71、医院感染监测;管理监督;评价效果;发现问题提出对策【单选题】

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】： C

72、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】

- A. 脑胶质瘤切除术
- B. 肛瘘切除术
- C. 胰十二指肠切除术
- D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】： A

73、传染病房使用口罩下述哪项是错误的【单选题】

- A. 不可用污染手触碰口罩
- B. 口罩必须遮住口鼻
- C. 不用时不能挂在胸前
- D. 护理严密隔离患者后,口罩污染面向内折叠,放置备用 口罩潮湿应立即更换

【答案】： D

74、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】

- A. 放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理
- B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃
- C. 放入黑色塑料袋内,按垃圾处理
- D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理 放入白色塑料袋内,标记处理

【答案】： A

75、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： D

76、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】： E

77、输液反应中属于医院内感染的是【单选题】——

- A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- B. 由于液体被细菌污染引起的发热
- C. 由于输注液体中的药物引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输注的液体中含有热源物质引起的发热

【答案】： B

78、伤寒病人应采取【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 保护性隔离
- D. 消化道隔离 呼吸道隔离

【答案】： D

79、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】： D

80、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 聚维酮(络合碘)
- C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- D. 乙醇 碘酊

【答案】： A

81、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 讲究个人卫生
- B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者
- C. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩
- D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】： E

82、治疗室的管理中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶不能超过 24 小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 4 小时内使用
- D. 碘酒、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并灭菌容器 1~2 次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不能超过 48 小时

【答案】： E

83、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后

B. 进行无菌技术操作前后

C.

戴口罩和穿、脱隔离衣前后

D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

84、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

A. 污染的手取避污纸可掀页撕取

B. 从页面抓取

C. 随便撕取

D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

85、传染病区使用的拖把【单选题】——

A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】：C

86、妇产科检查室【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：C

87、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

A. 大口容器,盛用消毒液

B.

大口容器,底部垫纱布

- C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】：A

88、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】

——

- A. 300张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于10人
- C. 300张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于1人
- D. 300张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员
300-500张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于2人

【答案】：B

89、医院污物的处理原则,下述哪项是错误的【单选题】

——

- A. 防止污染扩散
- B. 分类收集
- C. 分别处理
- D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

90、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】

——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】：C

91、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: E

92、关于无菌技术,以下操作错误的是【单选题】——

- A. 消毒液应浸没持物镊的 2/3 左右
- B. 一份无菌物品仅供一位病人使用
- C. 治疗室要湿式清扫,每日紫外线照射 1 次
- D. 衣帽要整齐,口罩遮住口鼻,修剪指甲,洗手 无菌物品与非无菌物品应分别放置

【答案】: A

93、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: B

94、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】: C

95、儿科病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

96、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是【单选题】——

- A. 检验人员
- B. 消化内科医师
- C. 消化内科护士
- D. 腹部外科医师 口腔科医师

【答案】：B

97、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

- A. 部分医院感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 滥用抗感染药物可致二重感染

【答案】：C

98、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：E

99、一般病室、办公室、治疗室、换药室、走廊等使用的拖把【单选题】——

- A. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
- B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

【答案】： E

100、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

- A. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣
- C. 严密隔离患者禁止走出病室
- D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】： E

101、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

- A. 手
- B. 饮水
- C. 食品
- D. 医疗器械 衣物

【答案】： A

102、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

- A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离
- B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房
- D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离患者禁止走出病房

【答案】： A

103、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

A.

腹腔镜用环氧乙烷消毒

- B. 消化内镜用 500×10^{-6} 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C. 直肠镜采用高压灭菌
- D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】： B

104、无菌盘铺好后,有效时间不超过【单选题】——

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 5 小时
- D. 7 小时 8 小时

【答案】： A

105、根据我国卫生标准回答:监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： E

106、属于高度危险性物品的是【单选题】——

- A. 手术器械和用品
- B. 体温表
- C. 呼吸机管道
- D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】： A

107、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去

B. 该病平均潜伏期过去

C.

该病常见潜伏期过去

D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

108、用紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

A. 20min

B. 25min

C. 15min

D. 35min 30min

【答案】：E

109、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

A. 10m

B. 2m

C. 1m

D. 5m 15m

【答案】：B

110、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理

D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】：C

111、牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械,首选灭菌方法为

【单选题】——

A. 环氧乙烷熏蒸灭菌

B. 压力蒸汽灭菌

C.

等离子体灭菌

D. 化学方法进行浸泡灭菌 煮沸消毒

【答案】：B

112、二级医院【单选题】——

A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$

B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：C

113、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

A. 严密隔离

B. 接触隔离

C. 呼吸道隔离

D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

114、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

A. 35 分钟

B. 25 分钟

C. 15 分钟

D. 30 分钟 20 分钟

【答案】：D

115、脊髓灰质炎宜采取【单选题】——

A. 消化道隔离

B. 呼吸道隔离

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：C

116、碘伏属于【单选题】——

A.

中效消毒剂

- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

117、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌
- D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

118、SARS 最主要的传染源是【单选题】——

- A. SARS 患者
- B. SARS 病毒携带者
- C. SARS 感染的动物
- D. 携带 SARS 的动物 污染的环境

【答案】：A

119、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——

- A. 30cm×30cm×20cm
- B. 30cm×30cm×40cm
- C. 30cm×40cm×30cm
- D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】：D

120、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌
- B. 洗手刷应一用一灭菌
- C. 隔离手术间应远离手术室入口处

D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁
【答案】：C

121、输血科的医院感染管理描述正确的是【单选题】——

- A. 血液检验和处置室设在清洁区
- B. 采集患者自体血应在 I 类环境中进行
- C. 储存、发放血液应分室在 I 类环境中进行
- D. 血浆置换术应在 II 类环境中进行 布局合理,分为有清洁区、污染区

【答案】： D

122、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】： B

123、输血科预防医院感染的措施错误的是【单选题】——

- A. 保持环境清洁,每日清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 血浆置换术应在 II 类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】： B

124、霍乱病人应采取【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 严密隔离

【答案】： E

125、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

- A.

10 分钟

B. 20 分钟

C. 15 分钟

D. 30 分钟 40 分钟

【答案】：D

126、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

A. 空气传播

B. 接触传播

C. 血液传播

D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

127、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：B

128、医院感染的含义是【单选题】——

A. 所有发生在医院内的细菌感染

B. 因医疗器械消毒不严造成的感染

C. 病人在住院期间发生的感染

D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染
医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】：D

129、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】——

A. 尽量减少侵入性操作

B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染

C.

积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染

D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措施,减少内源性感染

【答案】: B

130、根据我国下列卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品的卫生标准是

【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: C

131、输液反应中属于医院感染的有【单选题】——

A. 由于输注液体中药物引起的发热

B. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热

C. 由于液体被细菌污染引起的发热

D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管导管的感染引起的发热

【答案】: C

132、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

A. 血液

B. 体液

C. 汗液

D. 排泄物 分泌物

【答案】: C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/206055222243010130>