

2022 年执业药师之西药学专业二题库练习试卷 A 卷

附答案

单选题（共 50 题）

1、（2020 年真题）不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

- A. 布美他尼
- B. 呋塞米
- C. 依他尼酸
- D. 托拉塞米
- E. 螺内酯

【答案】 C

2、对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

- A. 地西洋
- B. 非苯二氮?类药物
- C. 苯二氮?类药物
- D. 氟西洋
- E. 扎来普隆

【答案】 D

3、甲状腺危象选用()

- A. 胰岛素
- B. 格列本脲
- C. 丙硫氧嘧啶
- D. 二甲双胍

E. 小剂量碘剂

【答案】 C

4、维生素 A 缺乏时引起

A. 角膜软化症

B. 成人佝偻病

C. 脚气病

D. 坏血病

E. 粗糙皮病

【答案】 A

5、多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

A. 增加心脏毒性

B. 增加肝毒性

C. 导致坏死性结肠炎

D. 易产生沉淀

E. 具有良好的协同作用

【答案】 D

6、可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

A. 多烯磷脂酰胆碱

B. 雷尼替丁

C. 甘草酸二铵

D. 甲氧氯普胺

E. 阿托品

【答案】 B

7、布洛芬的小儿常用量是一次口服

A. 5~10mg / kg

B. 0.5~2mg / kg

C. 3mg / kg

D. 7.5mg

E. 10mg / kg

【答案】 A

8、下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

A. 氢化可的松

B. 卡马西平

C. 利福平

D. 苯巴比妥

E. 苯妥英钠

【答案】 A

9、属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

A. 阿法骨化醇

B. 鲑降钙素

C. 奥利司他

D. 阿仑膦酸钠

E. 唑来膦酸

【答案】 C

10、对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

A. 奥司他韦

B. 阿糖腺苷

C. 干扰素

D. 阿昔洛韦

E. 阿德福韦酯

【答案】 D

11、通过产生一氧化氮(NO)松弛血管平滑肌，以扩张静脉为主的药物是

A. 双嘧达莫

B. 硝苯地平

C. 硝酸甘油

D. 普萘洛尔

E. 曲美他嗪

【答案】 C

12、患者女，55岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

【答案】 B

13、通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A. 地高辛

B. 氨力农

C. 氯沙坦

D. 美托洛尔

E. 卡托普利

【答案】 C

14、（2021 年真题）属于二肽基肽酶-4（DPP- 4）抑制剂的药物是（ ）

A. 西格列汀

B. 那格列奈

C. 格列美脲

D. 利拉鲁肽

E. 罗格列酮

【答案】 A

15、严重心衰首剂可出现低血压反应的药物是

A. 地高辛

B. 卡托普利

C. 氨氯地平

- D. 硝酸甘油
- E. 拉贝洛尔

【答案】 B

16、对于万古霉素，描述错误的是

- A. 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染
- B. 快速静滴会出现红人综合征
- C. 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- D. 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用
- E. 与氨基糖苷类合用产生协同作用

【答案】 D

17、氟西汀的作用机制是

- A. 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- B. 抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取
- C. 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取
- D. 抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解
- E. 阻断 5-HT 受体

【答案】 A

18、存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A. 卡莫司汀
- B. 表柔比星
- C. 泼尼松

D. 多西他赛

E. 地塞米松

【答案】 D

19、（2017年真题）抑制细菌叶酸合成（ ）

A. 头孢米诺

B. 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

C. 利福喷丁

D. 头孢吡肟

E. 依替米星

【答案】 B

20、属于广谱抗心律失常药物

A. 地高辛

B. 利多卡因

C. 苯妥英钠

D. 胺碘酮

E. 维拉帕米

【答案】 D

21、下列不属于肽类抗生素的是

A. 万古霉素

B. 去甲万古霉素

C. 利奈唑胺

D. 多黏菌素 B

E. 替考拉宁

【答案】 C

22、散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

A. 左氧氟沙星滴眼液

B. 复方托吡卡胺滴眼液

C. 毛果芸香碱滴眼液

D. 碘苷滴眼液

E. 阿昔洛韦滴眼液

【答案】 B

23、（2017年真题）患者，女，41岁，BMI25，最新诊断为2型糖尿病，空腹血糖8.4mmol/L，餐后2小时血糖16mmol/L，血肌酐70 μ mol/L

A. 阿卡波糖

B. 西格列汀

C. 利拉鲁肽

D. 格列齐特

E. 二甲双胍

【答案】 D

24、患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌II级，同侧腋下淋巴结1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A. 骨髓功能抑制

- B. 严重心脏病
- C. 腰椎间盘突出
- D. 妊娠及哺乳期妇女
- E. 心功能不全

【答案】 C

25、不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

- A. 拉米夫定
- B. 恩替卡韦
- C. 泛昔洛韦
- D. 干扰素- α
- E. 阿德福韦酯

【答案】 C

26、对合并有高氨血症的便秘患者, 适宜使用的泻药是

- A. 甘油
- B. 聚乙二醇 4000
- C. 乳果糖
- D. 硫酸镁
- E. 酚酞

【答案】 C

27、内分泌平衡障碍及精神神经失调所致的失眠宜选用

- A. 氟西洋

- B. 氯美扎酮
- C. 谷维素
- D. 夸西泮
- E. 10%水合氯醛依据睡眠状态合理用药

【答案】 C

28、下述利尿药中，可导致血钾升高的是

- A. 呋塞米
- B. 氢氯噻嗪
- C. 乙酰唑胺
- D. 氨苯蝶啶
- E. 甘露醇

【答案】 D

29、不能抑制胃酸分泌，可在两餐间和睡眠前服用，不属于治疗消化道溃疡的首选抗酸药物是

- A. 法莫替丁
- B. 硫糖铝
- C. 碳酸氢钠
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 雷贝拉唑

【答案】 C

30、患者,女 52 岁,因“闭经 1 年,潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊,临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为:戊酸雌二醇片,每日 1 次,每次 1mg,醋酸甲羟孕酮片每日 1 次,每次 2mg。

- A. 骨质疏松症
- B. 血栓性静脉炎
- C. 泌尿系统感染
- D. 血脂异常
- E. 腰椎间盘突出症

【答案】 B

31、与顺铂合用,致高尿酸血症的药物是

- A. 丙磺舒
- B. 呋塞米
- C. 苯海拉明
- D. 甲氨蝶呤
- E. 氟尿嘧啶

【答案】 A

32、(2018 年真题)同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A. 普通胰岛素注射液
- B. 精蛋白锌胰岛素注射液
- C. 预混胰岛素注射液
- D. 甘精胰岛素注射液
- E. 低精蛋白锌胰岛素注射液

【答案】 C

33、以下关于硫酸阿托品眼用凝胶的叙述，不正确的是

- A. 为散瞳药
- B. 前列腺肥大病人慎用
- C. 青光眼禁用
- D. 用于虹膜睫状体炎
- E. 用于验光配镜屈光度检查前的散瞳

【答案】 B

34、使用痤疮治疗药物不会出现

- A. 红斑
- B. 皮肤色素沉着
- C. 眼周局部刺激
- D. 中枢神经毒性
- E. 肝脏转氨酶升高

【答案】 D

35、需慎用司坦唑醇的是()

- A. 低血压患者
- B. 代谢性酸中毒患者
- C. 肝、肾病患者
- D. 高血压患者
- E. 高钾血症患者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206114240053010113>