

2023 年-2024 年护师类之主管护师考前冲刺模拟试 卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、洗胃时一般取什么体位

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 去枕仰卧位，头偏向一侧
- D. 仰卧位，头偏向一侧
- E. 头低脚高位

【答案】 B

2、颈胸部手术后应采取的体位是（ ）。

- A. 平卧 6~8 小时
- B. 高半坐卧位
- C. 平卧位，头偏向一侧
- D. 低半坐卧位
- E. 侧卧位

【答案】 B

3、患者女性，61 岁。因肛门下坠感、大便带血被诊断为肛管癌，需行的治疗方法是

- A. 经腹会阴联合直肠癌根治术
- B. 经腹直肠癌切除术
- C. 拉下式直肠癌切除术

- D. 经腹直肠癌切除、人工肛门、远端封闭手术
- E. 挂线疗法

【答案】 A

4、母乳中钙磷比例为（ ）。

- A. 1:2
- B. 1:3
- C. 2:1
- D. 1:2
- E. 3:1

【答案】 C

5、滴虫阴道炎的典型白带表现为（ ）。

- A. 稠厚豆渣样
- B. 稀薄泡沫状
- C. 浓稠干酪样
- D. 脓血样
- E. 洗肉水样

【答案】 B

6、伴有恶性贫血的慢性胃炎是

- A. 非萎缩性胃炎
- B. 自身免疫性胃炎
- C. 多灶萎缩性胃炎

- D. 急性胃炎
- E. 感染性胃炎

【答案】 B

7、见于急性再生障碍性贫血

- A. 严重内脏出血伴三系血细胞下降，骨髓多部位增生极度低下，无巨幼细胞
- B. 红系增生活跃，骨髓细胞外铁消失
- C. 维生素 B
- D. 血小板数量减少伴巨核细胞成熟障碍
- E. 轻度皮肤黏膜出血伴骨髓增生低下，雄激素治疗有效

【答案】 A

8、关于金属类节育器的消毒下列哪项错误

- A. 0.1%新洁尔灭浸泡 15 分钟
- B. 高压消毒
- C. 75%酒精浸泡 30 分钟
- D. 煮沸消毒
- E. 2.5%碘酊浸泡 5~10 分钟，脱碘后用

【答案】 B

9、患者女，18 岁。上呼吸道病毒感染后 2 周，突然发现皮肤发红，有瘀斑，伴牙龈出血。检查出血时间延长，血小板计数低于正常，皮肤束臂试验阳性。可能的疾病是（ ）。

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血

- C. 急性粒性白血病
- D. 慢性粒性白血病
- E. 过敏性紫癜

【答案】 A

10、患者女性，25岁。孕足月分娩一女婴，出生第2天，尿布上有白色黏液和少量血性分泌物，乳房略肿大。应给予的护理措施是

- A. 立即喂糖水，促进排泄
- B. 立即去医院检查
- C. 不予特殊处理
- D. 挤净乳房分泌物
- E. 用皂液清洗会阴

【答案】 C

11、初孕妇初次能感觉胎动的时间是

- A. 14~16周
- B. 15~18周
- C. 18~20周
- D. 20~24周
- E. 24周以上

【答案】 C

12、关于重症肌无力的治疗，说法不正确的是

- A. 血浆置换法效果仅维持2周左右

- B. 淋巴细胞置换法疗效短暂
- C. 对年轻女性、病程短、进展快的病人可行胸腺摘除术
- D. 对年龄较大、不宜手术者可行胸腺放射治疗
- E. 免疫抑制剂治疗首选硫唑嘌呤

【答案】 A

13、最有助于了解糖尿病控制程度的检查是（ ）。

- A. 测空腹血糖
- B. 测餐后 2 小时血糖
- C. 葡萄糖耐量试验
- D. 糖化血红蛋白测定
- E. 测餐后 2 小时尿糖

【答案】 D

14、痔早期常见症状是（ ）

- A. 坠胀感
- B. 疼痛
- C. 无痛性间歇性便后出血
- D. 瘙痒
- E. 痔块脱出

【答案】 C

15、妊娠 39 周患先兆子痫的初孕妇，恰当的处理应是

- A. 积极治疗，等待产程发动

- B. 治疗 24~48 小时症状改善后引产
- C. 积极治疗至预产期引产
- D. 静脉滴注缩宫素引产
- E. 行人工破膜引产

【答案】 B

16、患者女性，28 岁。平素月经规律，现停经 40 天。阴道流血 2 天，突发腹痛，伴恶心、呕吐、晕厥就诊。检查：T36.4℃，P120 次 / 分，Bp85/55mmHg，面色苍白，表情痛苦。双合诊：阴道后穹隆饱满，宫颈举痛明显，子宫未查清，左侧宫旁有触痛。

- A. 阑尾炎
- B. 先兆流产
- C. 输卵管妊娠破裂
- D. 子宫内膜异位症
- E. 附件炎

【答案】 C

17、女性，28 岁，平时月经规律，周期 28~30 天，因停经 50 天，少量阴道出血伴下腹痛 2 天入院。妇科检查：阴道有少量暗褐色血液，宫颈着色举痛，子宫增大，右侧附件增厚，压痛。首选简易的辅助诊断方法是

- A. 诊断性刮宫
- B. 阴道镜检查
- C. 盆腔 B 超检查
- D. 宫腔镜检查
- E. 腹腔镜检查

【答案】 C

18、支气管哮喘发作患者，不正确的护理措施是（ ）。

- A. 协助患者取舒适的半卧位或坐位
- B. 守护床边给予精神支持和心理护理
- C. 出汗多者应盖紧被褥少换衣服以防受凉
- D. 气促明显者给低流量鼻导管吸氧
- E. 严密观察生命体征、神志、尿量等变化

【答案】 C

19、孕妇 28 岁，G5P0，34+4 周，因阴道流血 3 天，出血量少于月经量入院。检查：宫高 31cm，胎心 145 次/分。无宫缩，头先露。最可能的诊断是（ ）。

- A. 胎盘早期剥离
- B. 前置胎盘
- C. 子宫破裂
- D. 宫颈息肉
- E. 宫颈癌

【答案】 B

20、破伤风病人的环境要求不包括（ ）。

- A. 单人房间
- B. 保持安静
- C. 适宜的温度、湿度
- D. 各项操作的镇静药使用后 1h 内进行
- E. 急救药品和物品齐全

【答案】 D

21、最简便的杀灭结核菌的方法是

- A. 70%酒精接触 2 分钟
- B. 直接焚烧带有病菌的痰纸
- C. 煮沸 1 分钟
- D. 来苏水接触 2~12 小时
- E. 阳光暴晒 2 小时

【答案】 B

22、下呼吸道的起点是

- A. 鼻
- B. 咽
- C. 喉
- D. 气管
- E. 肺泡

【答案】 D

23、消化性溃疡患者，出现呕暗红色血液，说明胃内积血量至少达到（ ）。

- A. 150~200mL
- B. 250~300mL
- C. 350~400mL
- D. 450~500mL
- E. 550~600mL

【答案】 B

24、在应用 ORS 液的过程中，错误的做法是

- A. 多用于中度以下的脱水
- B. 服用 ORS 液期间不要饮白开水
- C. 出现水肿时应停用 ORS 液
- D. 新生儿不宜用 ORS 液
- E. 明显腹胀者不宜用 ORS 液

【答案】 B

25、肺结核大咯血最致命的危险是

- A. 窒息
- B. DI
- C. 严重贫血
- D. 感染扩散
- E. 失血性休克

【答案】 A

26、女，25岁。3小时前因车祸致左胸和腹部撞伤，主诉头晕、心慌。体检：面色苍白，四肢厥冷，左上腹可见皮肤瘀斑。左上腹及中下腹部均有压痛，轻反跳痛，无肌紧张，血压 6.0/0kPa (50/0mmHg)，心率 140 次 / 分。

- A. 5%葡萄糖
- B. 10%葡萄糖盐溶液
- C. 3%氯化钠
- D. 平衡盐溶液

E. 11. 2%乳酸钠

【答案】 D

27、关于胎盘功能的描述，正确的是（ ）。

- A. 胎儿代谢产物经胎盘进入母血，由母体排出体外
- B. 只以简单扩散、易化扩散与主动运输进行物质交换
- C. 可合成人绒毛膜促性腺激素和肾上腺皮质激素等
- D. 胎儿代谢的主要能源葡萄糖以主动运输方式通过胎盘
- E. 防御功能极强可防止异种微生物通过胎盘影响胎儿

【答案】 A

28、社区护士在评估病人时，获得的客观资料是（ ）。

- A. 胸闷
- B. 头痛
- C. 失眠
- D. 口唇发绀
- E. 每日饮白酒 3 两

【答案】 D

29、外科 ICU 救治范围不包括

- A. 胸腹联合挤压伤病人
- B. 闭合性气胸病人
- C. 术中大出血的病人
- D. 休克病人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206133042221010154>