

# 初级护师专业知识模拟试题附答案解析

## A1/A2 型选择题(1~80 题)

### 答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将对应题号对应字母所属方框涂黑。

1. 慢性呼吸衰竭病人最早最突出表现是

A. 呼吸困难 B. 发绀 C. 烦躁不安 D. 血压下降 E. 少尿

2. 蛛网膜下腔出血病人需要绝对卧床休息时间是

A. 4 天 B. 1 周 C. 2 周 D. 3 周 E. 4 周

3. 洋地黄中毒，最常见心律失常是

A. 室性期前收缩二联律 B. 窦性心动过缓 C. 室性心动过速  
D. 室上性心动过速 E. 房室传导阻滞

4. 急性肾盂肾炎通常不出现

A. 血尿 B. 贫血 C. 肾区叩击痛 D. 尿路刺激征 E. 畏寒、发烧

5. 肺结核病人痰液简单而有效杀菌方法是

A. 掩埋 B. 煮沸 C. 阳光暴晒 D. 纸包后焚烧 E. 1%过氧乙酸浸泡

6. 颅内压增高临床表现是

A. 头痛、呕吐、眩晕 B. 头痛、呕吐、失眠 C. 头痛、呕吐、视乳头水肿  
D. 头痛、呕吐、肢体运动障碍 E. 头痛、视力下降、视乳头水肿

7. 肝硬化最常见并发症是

A. 感染 B. 肝性脑病 C. 原发性肝癌 D. 上消化道出血 E. 功效性肾衰竭

8. 严重水肿伴有少尿时, 每日摄水量最多不超出

- A. 100ml    B. 1000ml    C. 1500ml    D. ml    E. 2500ml

9. 肝硬化失代偿期最突出表现是

- A. 脾大    B. 腹水    C. 肝掌    D. 贫血    E. 出血

10. 肝性脑病最有意义体征是

- A. 肌张力增高    B. 腱反射亢进    C. 踝阵挛阳性    D. 扑翼样震颤    E. 巴宾斯基征阳性

11. 癫痫强直一阵挛发作时最主要护理是

- A. 防止外伤    B. 不可强力按压肢体    C. 保持呼吸道通畅  
D. 严密观察意识和瞳孔改变    E. 禁用口表测试体温

12. 癫痫最常见发作类型是

- A. 小发作    B. 强直-阵挛发作    C. 单纯部分发作    D. 复杂部分发作    E. 癫痫连续状态

13. 癫痫连续状态是指强直-阵挛发作连续日寸间最少超出

- A. 30秒    B. 15分钟    C. 30分钟    D. 60分钟    E. 90分钟

14. 癫痫强直-阵挛发作特点是

- A. 全身抽搐及意识丧失    B. 短暂意识障碍    C. 发生时间短促, 无意识障碍  
D. 个别肢体抽搐    E. 突然中止活动, 面色苍白

15. 癫痫病人禁止从事职业为

- A. 教师    B. 工人    C. 售票员    D. 秘书    E. 驾驶员

16. 外伤后急性硬脑膜外血肿患者经典意识障碍形式是

- A. 清醒与朦胧状态交替出现    B. 连续性昏迷加重    C. 早期清醒, 随即逐步昏迷  
D. 清醒, 随即昏迷, 再次清醒    E. 昏迷, 随即清醒, 再次昏迷

17. 患者突然尖叫两声，随之扑倒在地，两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，四肢抽搐，不省人事；醒后无记忆，应考虑为

A. 癔症性发作 B. 癫痫强直-阵挛发作 C. 阿-斯综合征 D. 脑血管意外 E. 昏厥

18. 慢性粒细胞性白血病临床特点是

A. 肝脾淋巴结轻度肿大 B. 皮疹多见 C. 早期有贫血和出血倾向

D. 以脾显著肿大为主，并有腹胀、低热 E. 以淋巴结肿大为主，伴有肝脾肿大

19. 心源性水肿常先发生于

A. 眼睑 B. 颈部 C. 上胸部 D. 背骶部 E. 踝部

20. 病人因站立时久，突感眼花，头晕，意识丧失，摔倒在地，片刻清醒，可能为

A. 休克 B. 晕厥 C. 浅昏迷 D. 意识含糊 E. 虚脱

21. 以下不符合急性胰腺炎腹痛特点是

A. 刀割痛或绞痛 B. 进食后疼痛缓解 C. 向腰背部呈带状性放射

D. 位于中上腹 E. 可阵发性加速

22. 右心衰竭与肝硬化临床表现区分是前者有

A. 肝肿大 B. 脾肿大 C. 周围静脉压升高 D. 下肢水肿 E. 腹水

23. 尿毒症患者饮食宜给予

A. 主食最好采取优质蛋白质制品 B. 尽可能补充水、钠、钾

C. 透析时宜给予高蛋白饮食 D. 多进含磷高食物

E. 高热量、高生物效价低蛋白饮食

24. 激励长久卧床心衰病人在床上作下肢活动，其目标主要是

A. 预防肌肉萎缩 B. 预防压疮 C. 预防下肢静脉血栓形成

D . 降低回心血量 E . 保持和维护活动耐力

25 . 对夜间阵发性呼吸困难病人, 最主要护理是

A . 通知病人呼叫方法 B . 加强巡视 C . 睡前吸氧

D . 给予镇静剂 E . 固定于半卧位

26 . 左心衰竭最经典临床表现是

A . 劳力性呼吸困难 B . 夜间阵发性呼吸困难 C . 端坐呼吸

D . 咳嗽、咳痰 E . 嗜睡

27 . 体力活动轻度受限, 日常活动能够引发呼吸困难为

A . 心功效 I 级 B . 心功效 II 级 C . 心功效 III 级 D . 心功效 IV 级 E . 心功效代偿期

28 . 可使用洋地黄情况是

A . 重度二尖瓣狭窄 B . 室上性心动过速 C . 严重房室传导阻滞

D . 梗阻性肥厚型心肌病 E . 急性心肌梗死二十四小时内

29 . 最严重心律失常是

A . 室上性阵发性心动过速 B . 室性阵发性心动过速 C . 多源性室性早搏

D . 心室颤动 E . 心房颤动

30 . 风湿性心脏瓣膜病变最常见心律失常为

A . 心房颤动 B . 心室颤动 C . 早搏 D . 异位性心动过速 E . 房室传导阻滞

31 . 风湿性心脏病最多见并发症是

A . 充血性心力衰竭 B . 心律失常 C . 栓塞 D . 感染 E . 亚急性感染性心内膜炎

32 . 肝癌患者首发症状是

A . 消瘦 B . 恶心、呕吐 C . 肝区疼痛 D . 黄疸 E . 贫血

33. 肝癌患者术前护理, 错误的是

- A. 给予维生素 K1    B. 适量输血和白蛋白    C. 术前一晚用肥皂水灌肠  
D. 全方面检验肝功效和凝血功效    E. 术前 3 天口服肠道不吸收抗生素

34. 肝叶切除患者术后护理, 错误的是

- A. 应专员护理    B. 吸氧 3~5 天    C. 术后取平卧位  
D. 激励早期下床活动    E. 术后经静脉补充营养

35. 体外循环手术患者术后电解质浓度监测尤其应注意

- A. 血钠浓度    B. 血钾浓度    C. 血氯浓度    D. 血钙浓度    E. 血镁浓度

36. 患者, 男, 59 岁。冠心病、心绞痛 5 年。3 小时前发生心前区激烈疼痛, 服用硝酸甘油 3 片未缓解, 急诊入院。心电图检验发觉 ST 段弓背上抬, 随即对应导联出现病理性 Q 波, 血压 85/55mmHg, 心率 108 次/分, 律齐。入监护室观察治疗, 经用药后疼痛缓解。7 小时后心电监测示血压 70/50mmHg, 心率 118 次/分, 患者烦躁不安, 皮肤湿冷, 此时最可能发生了

- A. 脑出血    B. 室壁瘤破裂    C. 心源性休克    D. 心律失常    E. 心力衰竭

37. 患儿, 女, 日龄 4 天, 足月顺产。现该患儿反应低下, 拒乳, 哭声低弱, 下肢及臀部皮肤暗红, 发硬, 压之凹陷, 拟诊为严寒损伤综合征, 在深入搜集评定资料中, 对判断病情最有价值是

- A. 体温    B. 体重    C. 脉搏    D. 呼吸    E. 血压

38. 骨折早期可引发

- A. 畸形愈合    B. 内脏损伤    C. 关节僵硬    D. 创伤性关节炎    E. 缺血性骨坏死

39. 患者, 男, 60 岁。患右肺中叶支气管扩张现患者痰多不易咳出。该患者可能存在体征是

- A. 消瘦、贫血    B. 呼吸运动减弱    C. 不足哮鸣音

D . 固定而持久不足湿啰音      E . 两肺底满布湿啰音

40 . 对非特异性感染患者健康教育, 错误是

A . 保持皮肤清洁      B . 预防皮肤损伤      C . 处理原发病

D . 治疗相关全身性疾病      E . 经常应用抗生素预防感染

41 . 骨折中期功效锻炼, 正确是

A . 锻炼前拆除外固定      B . 重点是患肢肌肉舒缩锻炼

C . 以重点关节为主全身锻炼      D . 固定范围以外部位锻炼

E . 骨折处上下关节重点活动

42 . 关于植皮术叙述, 错误是

A . 供皮区备皮, 小儿无须剃毛      B . 植皮区肉芽创面术前应勤换药

C . 创面涂片应无溶血性链球菌存在      D . 供皮区用酒精消毒, 不可使用碘酊

E . 取下皮片放在 37℃ 盐水中保留

43 . 观察休克病情改变简便而有效指标是

A . 体温      B . 呼吸      C . 尿量      D . 中心静脉压      E . 血气分析

44 . 对下肢骨牵引患者护理, 错误是

A . 骨牵引针孔每日滴乙醇      B . 牵引砝码不能接触地面      C . 抬高床头 15。 ~ 30。

D . 指导患者功效锻炼      E . 定时测量患肢长度

45 . 对化脓性关节炎患者进行局部灌洗护理, 正确是

A . 引流瓶低于床面 20cm      B . 术后 12 ~ 二十四小时内应慢速滴入

C . 冲洗液为含抗生素生理盐水      D . 引流管滴入管应高于床面 1cm

E . 引流液细菌培养阴性即可立刻拔除引流管

46. 患者, 男, 41 岁。有消化性溃疡病史 4 年。1 天来胃痛显著, 无恶心呕吐。今晨觉头昏、乏力、黑蒙, 排尿排便一次。对于该患者, 除腹痛外, 护士还应重点询问
- A. 排便习惯 B. 粪便颜色 C. 尿液颜色 D. 尿量 E. 有没有眩晕
47. 患者, 男, 45 岁。因车祸致伤急诊入院。初步检验拟诊骨盆骨折合并腹腔内脏损伤, 有休克征象。护士应首先给予
- A. 建立静脉通道 B. 准备骨盆兜, 行悬吊牵引 C. 准备腹腔手术止血
- D. 准备髋部石膏固定 E. 准备骨牵引器材
48. 急性出血坏死性胰腺炎最常见并发症是
- A. 化脓性感染 B. 休克 C. 急性肾衰竭 D. 急性呼吸窘迫综合征 E. 中毒性脑病
49. 急性阑尾炎术后最常见并发症是
- A. 切口感染 B. 出血 C. 腹腔感染 D. 腹腔脓肿 E. 粪瘘
50. 急性肾衰少尿无尿期饮食护理, 错误的是
- A. 热量供给以蛋白为主 B. 热量供给以糖为主 C. 可给适量脂肪乳剂
- D. 高维生素 E. 高热量
51. 绞窄性肠梗阻腹痛特点是
- A. 胀痛 B. 隐痛 C. 连续性腹痛 D. 阵发性腹痛 E. 连续性腹痛, 阵发性加剧
52. 结肠癌最早出现症状是
- A. 腹痛 B. 排便习惯及粪便性状改变 C. 腹部肿块 D. 全身癌性中毒症状 E. 肠梗阻
53. 孕 38 周孕妇, 因先兆子痫入院。现在患者轻微头痛, 血压为 140/90mmHg, 尿蛋白 (++) , 呼吸、脉搏正常。在应用硫酸镁治疗过程中, 护士应汇报医师停药情况是
- A. 呼吸 18 次/分 B. 膝反射消失 C. 头痛缓解 D. 血压 130/90mmHg E. 尿量 800ml/d

54. 对颈部急性蜂窝织炎, 需要紧急处理是

- A. 吞咽困难 B. 继发颅内感染 C. 呼吸困难 D. 高热 E. 脓血症

55. 静脉补钾先决条件是

- A. 尿量在 40ml/h 以上 B. 浓度在 0.3% 以下 C. 速度在 60 滴/分以下  
D. 总量在 4~5g/d 以下 E. 最多不要超出 6~8g/d

56. 女, 37 岁, 运动后突发右下腹阵发性剧痛, 向会阴部放射, 伴恶心、呕吐。既往有“慢性阑尾炎”史, 未作特殊处理。查体: 体温正常, 心肺无异常, 全腹软, 右下腹有轻度深压痛, 镜下血尿(++). 应首先考虑

- A. 慢性阑尾炎急性发作 B. 右侧附件炎 C. 右输尿管结石  
D. 胃、十二指肠溃疡穿孔 E. 急性胆囊炎

57. 女, 44 岁, 胃溃疡穿孔合并急性腹膜炎手术后 5 天, 体温 39℃, 大便 7~8 次/天, 有排不  
完感, 应考虑并发了

- A. 肠炎 B. 细菌性痢疾 C. 肠粘连 D. 盆腔脓肿 E. 膈下脓肿

58. 女, 50 岁, 胆囊切除术后右下肢数次输液发生了血栓性静脉炎, 对其护理错误的是

- A. 右下肢抬高 B. 局部热敷 C. 局部按摩 D. 理疗 E. 局部制动

59. 男, 20 岁, 从 3m 高处跌下骑跨于木梯上, 经检验阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀, 排尿困难, 尿道口滴血, 应考虑为

- A. 会阴部挫伤 B. 下腹部挫伤 C. 前尿道损伤 D. 后尿道损伤 E. 膀胱损伤

60. 男, 68 岁, 先是夜间尿频, 后逐步排尿时间延长, 尿不净, 今天下午排不出尿, 小腹胀痛来院就诊。首要处理是

- A. 穿刺抽尿 B. 膀胱造瘘 C. 导尿并留置导尿管 D. 压腹部排尿 E. 急诊手术



61. 颅底骨折诊疗主要依据是

A. 颅脑外伤史 B. 骨擦音 C. 脑脊液漏 D. X线摄片 E. B超检验

62. 患者, 男, 58岁。糖尿病病史30余年。现在使用胰岛素治疗, 但血糖未规律检测。近3月出现眼睑及下肢浮肿来诊。尿常规检验: 尿糖(++), WBC 0~4/HP, 尿蛋白(+++). 应优先考虑是

A. 胰岛索性水肿 B. 肾动脉硬化 C. 肾盂肾炎 D. 急性肾炎 E. 糖尿病肾病

63. 5个月小儿, 已添加菜汁、米汤, 母亲带其到儿保门诊健康咨询, 此时应指导家长给该小儿辅食是

A. 蛋黄 B. 饼干 C. 肉末 D. 馒头 E. 软饭

64. 早产儿, 出生2小时, 胎龄34周, 生后频发呼吸暂停, 医嘱给予吸氧, 该患儿吸氧时间最多不能超出

A. 12小时 B. 1天 C. 2天 D. 3天 E. 5天

65. 患儿, 9岁, 患急性肾小球肾炎2周, 现水肿消退、血压正常、无肉眼血尿, 血沉稍快 此时对患儿活动正确指导是

A. 继续卧床休息 B. 能够下床活动 C. 能够在家休养 D. 能够出院上学 E. 不限制活动

66. 女婴, 4天, 第一胎, 母乳喂养, 频发溢乳此时健康指导为

A. 改为人工喂养 B. 降低每次哺乳量 C. 延长哺乳间隔时间  
D. 哺乳后竖抱拍背 E. 哺乳后婴儿取左侧卧位

67. 患儿, 8岁, 急性肾小球肾炎1周来连续少尿, 二十四小时尿量为300ml, 晨起呕吐约200ml, 患儿第2天人水量应为

A. 200ml B. 300ml C. 500ml D. 700ml E. 800ml

68 . 8 个月女婴，提醒其发育正常运动特征是

- A . 会抬头    B . 会翻身    C . 会爬行    D . 用手握玩具    E . 独自行走

69 . 早产儿，胎龄 34 周，出生后给予 10% 葡萄糖试喂养，发觉吸吮无力，但有吞咽反射，未出现呛咳，应采取喂养方式是

- A . 母乳喂养    B . 乳瓶喂养    C . 滴管喂养    D . 鼻饲喂养    E . 静脉营养

70 . 患儿，3 岁，因腹泻出现中度脱水，补液过程中见尿排出，医嘱补钾，现剩下液体 400ml，最多可加入 10% 氯化钾

- A . 2ml    B . 4ml    C . 8ml    D . 12ml    E . 16ml

71 . 患者，女，16 岁。诊疗为缺铁性贫血入院。护士为其进行饮食指导时，最恰当食物组合是

- A . 鱼、咖啡    B . 瘦肉、牛奶    C . 羊肝、橙汁    D . 鸡蛋、可乐    E . 豆腐、绿茶

72 . 9 月龄患儿，单纯牛乳喂养，未添加辅食，因抽搐 2 次入院，血清  $Ca^{2+} 0.8mmol/L$ 。诊疗维生素 D 缺乏性手足搐搦症。对该患儿护理方法不正确是

- A . 惊厥时及时去除口鼻分泌物    B . 遵医嘱应用镇静剂和钙剂  
C . 补充钙剂时应快速静脉推注    D . 惊厥发作时保护患儿安全  
E . 保持平静，降低刺激

73 . 患儿，1 岁，发烧、咳嗽、喘息伴呕吐，体检见患儿呼气困难，口唇发绀，体温  $38.3^{\circ}C$ ，听诊两肺充满哮鸣音。此时首选护理方法是

- A . 吸氧    B . 降温    C . 止吐    D . 止咳    E . 超声雾化

74 . 初产妇，孕 39 周，1 临产后 1 小时破膜，应立刻采取方法是

- A . 保护会阴    B . 静滴抗生素    C . 立刻听胎心音

D . 做好接产准备      E . 激励产妇屏气用力

75 . 女, 30 岁, 停经 50 天, 阴道流血 1 天, 血量多于月经, 鲜红色, 伴有下腹部坠痛。内诊子宫增大如孕 50 天大小。宫颈内口可容 1 指, 阴道有活动性出血, 妊娠试验(+). 应考虑

A . 宫外孕      B . 先兆流产      C . 过期流产      D . 感染性流产      E . 难免流产

76 . 一男性新生儿经产钳助产娩出。出生后心率 95 次/分, 呼吸浅慢, 皮肤青紫, 四肢稍屈, 喉反射消失。Apgar 评分为

A . 4 分      B . 5 分      C . 6 分      D . 7 分      E . 8 分

77 . 跌倒时手掌撑地造成伸直型桡骨远端骨折, 其患处经典表现是

A . 方肩畸形      B . 垂腕畸形      C . 杜加试验阳性      D . “枪刺”畸形      E . 肘后三角关系失常

78 . 女, 54 岁, 胆源性胰腺炎发作数次, 对预防其胰腺炎再次发作最有意义方法是

A . 注意饮食卫生      B . 服用抗生素      C . 经常服用消化酶      D . 治疗胆道疾病      E . 控制血糖

79 . 女, 40 岁, 胆道手术后, T 管引流 2 周, 拔管前先试行夹管 1~2 天, 夹管期间应注意观察内容是

A . 饮食、睡眠      B . 腹痛、发烧、黄疸      C . 大便颜色

D . 引流口有没有渗液      E . 神志、血压和脉搏

80 . 现在我国对围生期时间要求是

A . 孕满 28 周至出生后 7 天      B . 孕满 32 周至出生后 7 天      C . 孕满 36 周至出生后 7 天

D . 孕满 38 周至出生后 7 天      E . 孕满 40 周至出生后 7 天

### B1 型选择题(81~90 题)

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个

与问题关系最亲密答案，并在答题卡上将对应题号对应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、数次或不被选择。

(81~83 题共用备选答案)

- A. 新生儿肝炎
- B. 母乳性黄疸
- C. 先天性胆道畸形
- D. 新生儿溶血病
- E. 新生儿败血症

81. 生后 1~3 周出现黄疸，进行性加重，大便呈陶土色，肝脏肿大。最可能诊疗是

82. 生后二十四小时内出现黄疸，最可能诊疗是

83. 黄疸 1 周内出现，黄疸退而复出，并进行性加重，发烧伴有全身中毒症状。最可能诊疗是

(84~86 题共用备选答案)

- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 预激综合征
- E. 病态窦房结综合征

84. 轻易引发血栓栓塞是

85. 可见于运动员是

86. 甲状腺功效亢进轻易引发

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207032151165006036>