

2021年7月淮南市大通区（卫生类）招聘考试《护理学》试卷

一、选择题

1、慢性阻塞性肺疾病患者，进行呼吸功能锻炼的方法是（）。

- A、胸式呼吸，缩唇呼吸，经口用力快速呼气
- B、腹式呼吸，缩唇呼吸，经口缓呼，呼气时口唇收拢
- C、腹式呼吸，缩唇呼吸，经口用力快速呼气
- D、胸式呼吸，缩唇呼吸
- E、以上都不是

【答案】B

【解析】慢性阻塞性肺疾病患者，进行呼吸功能锻炼的方法是腹式呼吸，缩唇呼吸，经口缓呼，呼气时口唇收拢。

2、患者男，58岁。X线胸片示2cm×25cm大小的左肺肿块影，并左侧胸腔积液，纤维支气管镜检查为鳞癌，行左上肺叶加淋巴结切除，手术后第2日病情平稳，患者可进行的活动是（）。

- A、在床边移步
- B、在护士的协助下在床上进行四肢活动
- C、在护士的协助下在室内行走5分钟左右
- D、患者出现心悸时应减低活动强度与速度
- E、去室外活动

【答案】C

【解析】此题考查的是原发性支气管癌的护理措施。在手术后应鼓励患者早期下床活动。术后第1日，生命体征平稳，应鼓励及协助患者下床或在床旁站立移步；带有引流管者要妥善保护；严密观察患者病情变化，如出现头晕、气促、心动过速、心悸和出汗等症状时，应立即停止活动。术后第2日，可扶持患者围绕病床在室内行走3~5分钟，以后根据患者情况逐渐增加活动量。

3、患者，男，36岁。因脑外伤急诊入院已3天，呈睡眠状态，可以唤醒但随即入睡，可以回答问题但有时不正确。该患者的意识状态是（）。

- A、浅昏迷
- B、昏睡
- C、嗜睡
- D、意识模糊
- E、谵妄

【答案】D

【解析】①嗜睡是最轻度的意识障碍。患者处于持续睡眠状态，能被唤醒，醒后能正确回答问题，但反应迟钝，停止刺激后很快入睡。②意识模糊的程度较嗜睡深，对周围环境漠不关心，答话简短迟钝，表情淡漠，可有错觉、幻觉、躁动不安、谵妄或精神错乱。对时间、地点、人物的定向力完全或部分障碍。③昏睡指患者处于熟睡状态，不易唤醒。较强刺激

4、下列有关护理诊断的描述，正确的是（）。

- A、一个患者只能有一个首优的护理诊断
- B、护士可参照马斯洛的基本需要层次论进行排序
- C、首优的护理诊断解决之后再解决中优问题
- D、现存的护理诊断应排在“有……危险”的护理诊断之前
- E、对于某个患者来说，护理诊断的先后次序常常是固定不变的

【答案】B

【解析】A选项是错误的，因为一个患者可以同时存在多个首优的护理诊断；C选项是错误的，因为并不一定是在首优问题解决后才解决中优问题，首优问题有可能需要一直执行，如氧气的给予，但同时患者可能存在焦虑、有皮肤完整性受损的危险等，它们需要在给氧的同时处理。D选项也是不正确的，因为某些“有……

危险”的护理诊断有可能排在现存的护理诊断之前。E选项是错误的，对于某个患者来说，随着患者病情轻重的变化，患者的护理诊断顺序也有可能随之改变。

5、护理诊断和医疗诊断的区别是（）。

- A、护理诊断是针对现存的或潜在的
- B、医疗诊断针对的只是现存的
- C、护理诊断适用对象包括个体、家庭、社区
- D、医疗诊断的对象是个体
- E、医疗诊断可同时有多个诊断

【答案】 D

【解析】 医疗诊断是一病一诊断，一般在疾病过程中保持不变。

6、患者，男，41岁，8小时前饮酒后出现上腹绞痛，向肩背部放射，送到医院急诊，怀疑为急性胰腺炎，

此时最具有诊断意义的实验室检查为（）。

- A、血清脂肪酶测定
- B、尿淀粉酶测定
- C、血钙测定
- D、血清淀粉酶测定
- E、白细胞计数

【答案】 D

【解析】 急性胰腺炎时，血清淀粉酶在发病后8小时开始升高，12~24小时达到高峰，48小时开始下降，尿

液淀粉酶在发病后12~24小时开始升高，1~2周达到高峰，此患者8小时前发病，并且尿液淀粉酶值受患

者尿量的影响，故血清淀粉酶测定最具诊断意义，升高到500U以上即可诊断为

急

7、作何种检查可以确诊（）。

- A、化验胃酸
- B、胃镜
- C、CT
- D、B超
- E、化验血常规

【答案】B

【解析】该患者需进一步作胃镜以确诊。纤维胃镜下可见溃疡呈圆形或椭圆形，底部平整，边缘整齐，深浅不一，早期病变限于黏膜下层，晚期可深达肌层。

8、最重要的门、腔静脉交通支是（）。

- A、腹膜后交通支
- B、直肠下段、肛管交通支
- C、胃底、食管下段交通支
- D、脐旁静脉与腹壁上静脉交通支
- E、脐旁静脉与腹壁下静脉交通支

【答案】C

【解析】门静脉与腔静脉之间有4个交通支：①胃底、食管下段交通支；②直肠下端、肛管交通支；③前腹壁交通支；④腹膜后交通支。其中以胃底、食管下段交通支最重要。

9、患者男，70岁。冠心病史15年。活动后出现心前区压榨样疼痛2小时。首选的治疗措施是（）。

- A、口服安体舒通
- B、嚼服达喜

- C、肌肉注射杜冷丁
- D、舌下含服硝酸甘油
- E、口服扑尔敏

【答案】C

【解析】根据该患者临床表现和疼痛特点，应为心肌梗死，首选治疗为肌肉注射杜冷丁（哌替啶）解除疼痛。

10、治疗支气管肺炎，抗生素应持续用至（）。

- A、体温正常后 2~3 天
- B、体温正常后 2~5 天
- C、体温正常后 3~7 天
- D、体温正常后 5~7 天
- E、体温正常后 8 天

【答案】D

【解析】支气管肺炎患者抗菌药物治疗：抗生素主要用于细菌性肺炎、支原体肺炎、衣原体肺炎及有继发细菌感染的病毒性肺炎。治疗前应作咽部分泌物或血液、胸腔穿刺液培养加药敏试验，以便于针对性选用有效药物。在病原菌未明，对未用过抗生素治疗的患儿，应首选青霉素，每次 20~40 万 U，每日肌肉注射 2 次，直至体温正常后 5~7 天为止。重症者可增加剂量 2~3 倍，静脉给药。

11、患儿，男，4 个月。人工喂养，睡眠时常烦躁哭闹，难以入眠。查体：体重 6kg，体温 37.9℃，有枕秃及颅骨软化，诊断为“佝偻病”。给予维生素 D₃ 30 万 IU 肌肉注射后突然发生全身抽搐 3 次，每次 20~60 秒，发作停止后精神如常。查血清离子钙为 1.0mmol/L，血清总钙为 1.8mmol/L。该患儿发生抽搐的原因是

()。

- A、酸中毒
- B、热性惊厥
- C、癫痫发作
- D、血清钙减少
- E、缺乏维生素 D

【答案】 D

【解析】 血钙 $<1.75\text{mmol/L}$ 发为惊厥（最常见），表现为双眼上翻，面肌颤动，四肢抽搐，意识丧失。发作时间数秒至数分钟，抽搐后意识恢复，精神萎靡而入睡，醒后活动如常。

12、与营养不良无关的指标是 ()。

- A、肌酐升高指数
- B、血清蛋白
- C、氮平衡
- D、整体蛋白更新率
- E、肌酐清除率

【答案】 E

【解析】 反应营养不良的指标有肌酐升高指数、血清蛋白、氮平衡及整体蛋白更新率，肌酐清除率是反应肾功能情况的指标。

13、全身麻醉中最严重的并发症是 ()。

- A、心搏停止
- B、肺不张
- C、肺梗死
- D、低血压

E、室性心律失常

【答案】A

【解析】心搏停止是全身麻醉中最严重的并发症，呼吸、循环系统的各项并发症若未及时发现和处理，均可导致心搏停止。高血压是全身麻醉中最常见的并发症。

14、吸气性呼吸困难主要见于（）。

A、喉头水肿

B、支气管哮喘

C、呼吸衰竭

D、肺结核

E、肺癌

【答案】A

【解析】吸气性呼吸困难见于各种原因引起的喉、气管、大支气管的狭窄与梗阻：

①喉部疾患，如急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、白喉、喉癌等；②气管疾病，如支气管肿瘤、气管异物或气管受压。其特点是吸气显著困难，呼吸肌极度紧张，胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显下陷（称为三凹征）。

15、儿科护士的角色不包括（）。

A、直接护理者

B、患儿代言人

C、患儿与家长的管理者

D、康复与预防的指导者

E、合作与协调者

【答案】C

【解析】儿科护理人员主要充当直接护理者，患者的代言人，患儿与家长的教育者，康复与预防指导者，合作与协调者，并非患儿与家长的管理者。

16、患者男，20岁。学生，3周前因淋雨感冒，未予重视。近来自感胸闷、气促、心悸、乏力，心电图显示：室性期前收缩，诊断为病毒性心肌炎。针对患者的病情下列说法不当的是（）。

- A、避免呼吸道感染
- B、避免过劳
- C、急性期绝对卧床
- D、症状消失后即可正常上学
- E、避免酗酒

【答案】D

【解析】病毒性心肌炎的护理：①调整情绪、避免激动。②注意休息与营养：急性期绝对卧床，出院后继续休息2~3个月，半年至1年避免重体力活动。注意摄取易消化、富含蛋白质和维生素的食物。③避免诱发因素：如过劳、缺氧、营养不良、呼吸道感染、酗酒等

17、胸外心脏按压频率是（）。

- A、40~60次/分
- B、60~80次/分
- C、100次/分
- D、100~120次/分
- E、120~140次/分

【答案】C

【解析】胸外心脏按压频率是100次/分，此题为记忆性题。

18、某护士轮值夜班，凌晨2点时应为某患者翻身。护士觉得很困乏。认为反正护士长也没在，别人也没有看到，少翻一次身不会就这么巧就出现压疮的。这种做法违反了（）。

- A、自强精神
- B、慎独精神
- C、奉献精神
- D、舒适感
- E、安全感

【答案】B

【解析】护士觉得很困乏，认为反正护士长也没在，别人也没有看到，违反慎独精神。

19、护士在铺备用床的操作中错误的是（）。

- A、移床旁桌距床 20cm
- B、套被套，折被筒齐床沿
- C、移椅距床 15cm
- D、铺大单，先床尾后床头
- E、身体重心下移，以节省体力

【答案】D

【解析】为保持病房整洁，随时迎接新患者，需要将床单位铺成备用床。铺备用床要求：①护士衣帽整洁；②视情况翻转床垫；③移开床旁桌 20cm、移开床旁椅距床 15cm；④先床头后床尾铺大单、套被套；⑤折被筒齐床沿；⑥套枕套；⑦用物归位。整个过程要注意身体重心下移，节省体力。

20、患者男，50 岁。因肝硬化食管静脉曲张，腹水入院治疗。放腹水后出现精神错乱、幻觉，伴有扑翼样震颤、脑电图异常等肝性脑病表现。此时患者可能处于肝性脑病的哪一期？（）

- A、前驱期
- B、昏迷前期

- C、昏睡期
- D、浅昏迷期
- E、深昏迷期

【答案】 C

【解析】昏睡期：木僵、昏睡为主。患者大部分时间处在昏睡中，呼之可醒，然后又入睡，答话不准、幻觉。如患者合作可引出扑翼样震颤。各种神经病理征陆续出现。脑电图出现明显异常。

21、麻痹性肠梗阻见于（）。

- A、肠系膜血栓
- B、异物堵塞肠腔
- C、急性弥漫性腹膜炎
- D、肠道功能紊乱
- E、水、电解质紊乱

【答案】 C

【解析】麻痹性肠梗阻常见于急性弥漫性腹膜炎、低钾血症等。

22、患者，女性，26岁，确诊肾病综合征1年，近日出现右下肢水肿明显，右腿较左腿明显肿胀，血清胆固醇3.84mmol/L。该患者可能出现了（）。

- A、右下肢感染
- B、右下肢静脉血栓
- C、右下肢水肿加重
- D、药物的副作用
- E、治疗无效

【答案】 B

【解析】患者右下肢水肿明显，右腿较左腿明显肿胀，应首先考虑为右下肢静脉

血栓。

23、一患者因左下肢血栓闭塞性脉管炎入院治疗，护士指导其做勃格运动的目的是（）。

- A、减轻下肢水肿
- B、促进患者舒适
- C、减慢肢体坏疽速度
- D、促进侧支循环建立
- E、提高日常活动能力

【答案】 D

【解析】 勃格运动可利用姿势的改变，被动增进末梢血液循环，促进侧支循环建立。

24、冬季病室中最适宜的温度和相对湿度是（）。

- A、室温 15~16℃，相对湿度 40%~60%
- B、室温 18~20℃，相对湿度 45%~50%
- C、室温 18~22℃，相对湿度 50%~60%
- D、室温 20~22℃，相对湿度 45%~50%
- E、室温 20~25℃，相对湿度 30%~40%

【答案】 C

【解析】 病区物理环境：一般病室适宜的温度为 18℃~22℃，相对湿度为 50%~60%为宜。

25、患者男，56 岁。被高处落下的重物砸伤头部，CT 片显示颈髓横断损伤，患者最可能出现（）。

- A、肾衰竭
- B、循环衰竭

- C、尿失禁
- D、呼吸衰竭
- E、坠积性肺炎

【答案】 D

【解析】 颈髓横断损伤可出现膈肌和呼吸肌麻痹，患者表现为进行性呼吸困难，出现呼吸衰竭症状。

26、患者男，30岁。饱餐后突发上腹持续性疼痛4小时，体检全腹有压痛，腹肌紧张，肝浊音界消失。对其诊断最有价值的检查是（）。

- A、血常规检查
- B、腹部CT检查
- C、立位腹部平片
- D、血淀粉酶测定
- E、纤维胃镜检查

【答案】 C

【解析】 饱餐后突发上腹部持续性疼痛，全腹有压痛，腹肌紧张，肝浊音界消失，因此考虑胃肠穿孔。立位腹部平片见膈下游离气体可明确诊断。

27、患者女，35岁。双手深II度烧伤恢复期。护士指导其双手平时正确的放置位置是（）。

- A、握拳位
- B、半握拳位
- C、伸直位
- D、半伸直位
- E、双手互握

【答案】 B

【解析】双手深Ⅱ度烧伤愈合会留下瘢痕，烧伤区皮肤会皱缩、变形，影响功能。因此，康复期双手应处于功能位即半握拳位。

28、患者，女，34岁。1周来觉外阴瘙痒，有豆渣样白带。查体：阴道黏膜红肿，附有白色膜状物，易剥离。引起该病的病原体为（）。

- A、阴道毛滴虫
- B、大肠埃希菌
- C、苍白密螺旋体
- D、白色假丝酵母菌
- E、金黄色葡萄球菌

【答案】D

【解析】豆渣样白带是典型的白色假丝酵母菌性阴道炎的表现。

29、该患者最可能的诊断为（）。

- A、急性胆囊炎、胆石症
- B、胃溃疡穿孔
- C、十二指肠球部溃疡
- D、急性胰腺炎
- E、肝癌结节破裂

【答案】D

【解析】急性胰腺炎的患者具有以下特征：①腹痛：腹痛是本病的主要表现，多数为突然发作，常在饱餐或饮酒后发作；②腹胀；③恶心呕吐；④发热；⑤水电解质及酸碱平衡失调；⑥休克；⑦多器官功能障碍等症状。根据患者的情况最主要的护理问题是疼痛。护理措施：①禁食：直到患者腹痛消失后开始进少量流质食物；②如患者伴有明显恶心、呕吐时，需作胃肠减压。

30、类风湿关节炎患者（）。

- A、关节疼痛呈游走性
- B、无关节畸形
- C、关节疼痛发作突然
- D、有关节畸形
- E、多累及单一关节

【答案】D

【解析】本题考查类风湿关节炎的关节受累特点。类风湿关节炎多累及双侧、对称性的多个小关节，常见的受累关节有腕、掌指关节、近端指间关节，晚期因骨质破坏以及关节周围的肌腱、韧带受损使手指关节半脱位，如尺侧偏屈、屈曲畸形、天鹅颈样畸形等。故本题的答案为D。

31、若考虑为水肿型胰腺炎，不应有的表现是（）。

- A、腹痛
- B、腹胀
- C、休克
- D、呕吐
- E、发热

【答案】C

【解析】水肿型胰腺炎病情一般较轻，可出现腹痛、腹胀、呕吐、发热等表现，胰腺有大片坏死时易并发休克，仅见于出血坏死型患者。

32、足月新生儿的护理措施中，不正确的是（）。

- A、合适的温、湿度
- B、尽早输液、输血
- C、合理喂养
- D、注意保暖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208111033131006031>