

## 一、单项选择题

1.左心衰竭最早出现的症状是：( A )

A.劳力性呼吸困难 B.心源性哮喘 C.端坐呼吸

D.咳粉红色泡沫痰 E.夜间阵发性呼吸困难

2.护士指导病人留取痰标本时不正确的是：( B )

A.最好清晨留取痰标本 B.最好是在刷牙后留取痰标本

C.用力咳出呼吸道深处痰 D.要注意防止唾液及上呼吸道分泌物污染

E.留取后及时送检

3.护士为病人进行体位引流，不正确的是( E )

A.确定引流体位很重要 B.引流应在进餐前 30min 完成

C.每天可引流 1~3 次 D.每次引流时间可持续 15min

E.引流后辅以雾化吸入可增加引流效果

4.护士在为病人进行胸部叩击，下列操作中不正确的是( D )

A.从肺底自下而上、由外向内进行叩击 B.将单层薄布置于病人胸廓叩击部位

C.每一肺叶连续叩击 1~2min

D.以轻柔的力度叩击胸部

E.叩击结束后协助病人用清水漱口

5.以呼气性呼吸困难为主要表现的是 ( D )

A.急性喉炎

B.肺炎

C.慢性支气管炎

D.支气管哮喘和肺气肿

E.胸腔积液

6.下列关于咯血病人的护理不正确的是 ( E )

A.大量咯血病人应禁食

B.小量咯血病人应绝对卧床

C.咯血量过多时可给予输血

D.极度紧张咳嗽剧烈的体弱者应给予强效镇咳药

E.窒息时立即给予半卧位

7.肺炎伴胸痛的病人适宜的体位是 ( D )

A.俯卧位

B.仰卧位

C.健侧卧位

D.患侧卧位

E.半坐卧位

8.支气管扩张大咯血病人最危险且最常见的并发症是 ( C )

A.严重贫血

B.休克

C.窒息

D.继发感染

E.肺不张

9.最常见的肺炎类型是 ( E )

A.过敏性肺炎 B.病毒性肺炎 C.支原体肺炎 D.真菌性肺炎

E 细菌性肺炎

10.慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时最主要的临床表现是（ C ）

A.咳嗽加重 B.咳白色泡沫痰与黏液痰 C.咳脓性痰且痰量增加

D.肺部有哮鸣音 E.肺底部有细湿罗音

11.支气管哮喘患者以哪种呼吸困难为主（ B ）

A.吸气性呼吸困难      B.呼气性呼吸困难      C 混合型呼吸困难

D.劳力性呼吸困难      E.静息性呼吸困难

12.预防慢性阻塞性肺疾病（ COPD ）应首先强调（ A ）

A.戒烟      B.预防感冒      C.避免受凉      D 加强锻炼      E.改善环境卫生

13.下列不是心肌梗死并发症的是（ C ）

A.心脏破裂      B.梗死后综合症      C.主动脉窦瘤破裂      D.心室壁瘤

E.二尖瓣脱落

14.多数急性心肌梗死患者最早出现和最突出的症状是（ A ）

A.剧烈而持久的胸骨后疼痛      B.心力衰竭      C.胃肠道反应

D.心源性休克      E.发热

15.左心衰竭的临床表现主要是由于( A )

- A.肺淤血、肺水肿所致      B.左心室扩大所致      C.体循环静脉压增高所致  
D.肺动脉压增高所致      E.心室重构所致

16.冠心病具有确诊价值的检查手段是( E )

- A.心电图      B.超声心动图      C.运动负荷试验      D.放射性核素检查  
E.冠状动脉造影

17.心绞痛发作时最重要的缓解方法是( B )

- A.立即到医院就诊      B.立即含服硝酸甘油      C.减少饮食摄入量  
D.吸氧      E.避免情绪激动

18.对于不稳定型心绞痛病人,最优先考虑的护理诊断/问题是( D )

- A.疼痛      B.活动无耐力      C.知识缺乏      D.潜在并发症:心肌梗死  
E.焦虑

19.心肺复苏基础生命支持的内容包括( E )

- A.保持气道通畅、恢复循环、脑复苏      B.人工呼吸、恢复循环、药物治疗  
C.气道插管、人工呼吸、恢复循环      D.保持气道通畅、人工呼吸、电除颤

E.开放气道、人工呼吸、恢复循环

20.建立人工通气的最好的方法是 ( B )

A.口对口人工呼吸    B.气管内插管    C.气管切开

D.清除呼吸道分泌物    E.呼吸机

21.心肌梗死最早出现的最突出的症状是 ( B )

A.胃肠道症状    B.胸痛    C.心律失常    D.心源性休克    E.心力衰竭

22.下列应用硝普钠的注意事项不当的叙述是 ( A )

A.快速静滴。将血压迅速降至正常    B.避光输入    C.现配现用

D.每六小时换一次    E.长期应用易出现氰化物中毒

23.病毒性心肌炎的护理重点在于 ( C )

A.加强锻炼，增强机体抵抗力    B.接种流感疫苗，预防感冒

C.充分休息，保证丰富的营养    D.绝对卧床 3 个月，低盐饮食

E.小量应用糖皮质激素，并注意不良反应

24.梗阻性肥厚型心肌病病人出现胸痛，不宜采用的处理方法是 ( A )

A.卧床休息    B.硝酸甘油含服    C.美托洛尔口服

D.给氧

E.合心爽口服

25.胺碘酮最严重的不良反应是 ( D )

A.转氨酶升高    B.胃肠道反应    C.甲亢    D.肺纤维化

E.心律失常

26.室性阵发性心动过速最常见于 ( A )

A.急性心肌梗死    B.心肌病    C.心肌炎    D.洋地黄中毒

E.电解质紊乱

27.引起支气管扩张的主要原因是 ( B )

A.先天性发育缺陷    B.支气管—肺组织的感染和支气管阻塞

C.支气管外部纤维的牵拉    D.遗传因素    E.过敏体质

28.急性呼吸衰竭与慢性呼吸衰竭的鉴别，下列哪项正确 ( D )

A.有无呼吸困难    B.有无发绀    C.有无肺水肿    D.起病缓急

E.有无低氧和二氧化碳潴留

29.关于慢性呼吸衰竭病人建立人工气道的目的，下列哪项是错误的 ( D )

A.有利于气道分泌物的清除    B.有利于保持气道的通畅

C.有利于吸出误吸得胃内容物 D.有利于防止下呼吸道感染

E.便于与呼吸机连接

30.诊断气胸最有价值的检查项目是 ( A )

A.胸部 X 线或 CT B.症状 C.体征 D.病史 E.动脉血气分析

31.慢性支气管炎最主要的并发症是 ( E )

A.肺出血 B.支气管扩张 C.小叶性肺炎 D.肺栓塞

E.肺气肿、肺心病

32.慢性支气管炎患者的下列表现中，哪项不应使用抗生素 ( A )

A.咳粘液样痰 B.发热 C.喘息伴哮鸣音 D.肺内多量湿啰音

E.外周血白细胞  $15 \times 10^9 / L$

33.有关慢性支气管炎诊断标准，咳嗽、咳痰反复发作时间应为 ( D )

A.每年发作至少 3 个月，持续 10 年以上 B.每年发作至少 1 个月，持续 2 年以上

C.每年发作至少 2 个月，持续 3 年以上 D.每年发作至少 3 个月，持续 2 年以上

E.每年发作至少 6 个月，持续 4 年以上

34.慢性支气管炎急性发作期治疗，下列各项中不恰当的是 ( E )

A.应用敏感抗生素 B.应用祛痰、镇咳药物 C.应用支气管扩张剂

D.雾化吸入稀释痰液 E.菌苗注射

35.应用呼吸机对 ARDS 患者治疗的最佳通气模式是 ( A )

A.呼气末正压 B.压力支持 C.同步间歇指令通气 D.控制通气

36.缺氧患者最典型的症状是 ( E )

A.心率加快 B.紫绀 C.头痛 D.兴奋 E.呼吸困难

37.教科书中有关通气 / 血流比例，下列哪项是错误的 ( D )

A.通气 / 血流比值大于 0.8，导致无效通气 B.肺泡通气量约 4L / min

C.肺血流量约 5L / min D.通气 / 血流比例失调可以引起 CO<sub>2</sub> 潴留

E.通气 / 血流比值小于 0.8，形成动静脉分流

38.呼吸衰竭时发生二氧化碳潴留的主要机制是由于 ( C )

A.通气 / 血流比例失调 B.弥散障碍 C.肺组织通气不足

D.动静脉分流 E.无效腔通气

39.对于 II 型呼吸衰竭的患者，最适宜的吸氧浓度为 ( D )

A.10% ~ 45% B.35% ~ 40% C.51% ~ 60% D.25% ~ 35% E.10% ~ 50%



40.以下哪项不是肺炎支原体肺炎的临床表现 ( E )

- A、起病缓慢，从上呼吸道开始 B、乏力、咽痛 C、咳嗽、发热
- D、发热、纳差 E、肌痛、不发热

41.关于阻塞性肺气肿，哪一项描述是正确的 ( C )

- A.经积极治疗可以痊愈 B.仅限于肺泡弹性减退与膨胀
- C.其病理改变不完全可逆 D. $\alpha_1$ —抗胰蛋白酶增加易发生肺气肿
- E.肺功能改变主要是肺活量减少

42.下列不符合肺炎雷伯杆菌肺炎的临床特点的是 ( A )

- A.青壮年多见，预后良好 B.起病急、胸痛、畏寒
- C.咳嗽，咳砖红色胶冻样痰 D.对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感
- E.白细胞正常或增加

43.根据变应原吸入后哮喘发生的时间，速发型哮喘的定义为 ( D )

- A.6 小时左右发病，持续时间长，可达数天
- B.吸入变应原的同时发生反应，6 小时达高峰，12 小时后逐渐恢复正常
- C.吸入变应原的同时发生反应，6 小时可达高峰，24 小时后逐渐恢复正常

D.吸入变应原的同时发生反应，15~30分钟达高峰，2小时后逐渐恢复正常

E.吸入变应原的同时发生反应，15~30分钟达高峰，12小时后恢复正常

44.慢性肺源性心脏病降低肺动脉高压的首选治疗是（ B ）

A.支气管舒张剂 B.氧疗 C.呼吸兴奋剂 D.利尿剂 E.强心剂

45.最常见的肺炎类型是（ E ）

A.过敏性肺炎 B.病毒性肺炎 C.支原体肺炎 D.真菌性肺炎

E.细菌性肺炎

46.慢性肺源性心脏病发生的关键环节是（ C ）

A.肺间质纤维化 B.肺气肿 C.肺动脉高压 D.肺动脉分支血栓栓塞

E.肺阻塞性通气障碍

47.肺功能测定常用的有以下几项，哪项对于诊断肺气肿最有价值（ B ）

A.肺活量 B.残气量，残气量/肺总量（%）测定

C.弥散功能 D.潮气量

E.每分钟静息通气量

48.胸腔抽液每次不宜超过（ E ）

A.0.5~1.0LB.0.3~0.5LC.0.5L 以上 D.0.3L 以下 E.1.0L 以上

49.肺炎胸痛放射到上腹部时病变常累及 ( D )

A.患侧肺的下叶 B.肋胸膜 C.脏层胸膜 D.隔胸膜 E.纵胸膜

50.关于肺心病的并发症，下列哪项少见 ( B )

A.消化道出血 B.心肌梗死 C.肺性脑病 D.休克 E.心律失常

51.鉴别再障和急性白血病的最主要的检查项目是 ( E )

A.血小板数 B.周围血查幼红细胞 C.周围血查幼粒细胞

D.网织红细胞数 E.骨髓检查

52.病原体不断侵入血中并在血中繁殖产生毒素，表现出严重中毒症状时，应诊断为 ( C )

A.毒血症 B.菌血症 C.败血症 D.变应性亚败血症 E.脓毒血症

53.营养性缺铁性贫血的患儿最主要的特点是 ( A )

A.小细胞低色素性贫血 B.正细胞低色素性贫血 C.大细胞低色素性贫血

D.大细胞高色素性贫血 E.小细胞高色素性贫血

54.对发热的血液病人护理措施不妥的是 ( A ) A.降温措施主要是乙醇擦浴 B.体温超过 38.5°C应

降温

C.药物降温，药量不宜过大 D.每日液体入量在 3000ml 左右

E.给高蛋白、高热量、高维生素饮食

55.铁剂在饭后服用的理由是（ D ）

A.防止过敏反应 B.促进铁剂的消化 C.有利于铁剂的吸收

D.减少铁剂对胃肠道的刺激 E.不会损坏牙齿

56.白血病的特异性体征为（ C ） A.头痛 B.关节痛 c.胸骨下段压痛 D.肢体瘫痪 E.皮肤瘀点

57.重性再生障碍性贫血的早期突出表现为（ C ） A.贫血 B.黏膜溃疡 C.出血与感染 D.骨髓增生减低 E.食欲减退

58.有关急性特发性血小板减少性紫癜，不正确的是（ D ） A.多见于儿童 B.多有畏寒、发热 C.皮下出血多见于四肢

D.脾大 E.严重者可有内脏出血

59.为防止急性白血病病人继发感染，错误的护理措施是（ E ） A.做好口腔护理，经常漱口 B.保持皮肤清洁，防止破损

c.保持大便通畅，以防肛裂 D.限制探视

E.使用药物尽量采用肌肉注射

60.缺铁性贫血治疗最重要的是（ A ）

A.补充铁剂 B.病因治疗 C.脾切除 D.少量输血

E.肌肉注射维生素

61.下列哪项是再生障碍性贫血的诊断依据之一 ( C ) A.网织红细胞增多 B.肝脾肿大 C.全血细胞减少 D.骨髓增生活跃

E.不易感染及出血

62.再生障碍性贫血高热病人最适宜的降温措施是 ( E ) A.肌肉注射退热药 B.口服退热药 C.乙醇擦浴 D.静脉输液

E.冰袋置头部及大血管处或温水擦浴

63.皮肤紫癜、明显齿龈出血的血液病病人口腔护理，应避免 ( B ) A.无刺激的漱口水漱口 B.用牙签剔牙 C.湿棉球擦拭牙齿

D.渗血齿龈用明胶海绵贴敷 E.齿龈陈旧血块双氧水漱口

64.下列哪项检查不属于内分泌功能鉴定试验的是 ( E )

A.葡萄糖耐量试验 B.血钾、钠、氯测定 C.血气分析

D.甲状腺碘放射性核素扫描 E.血清抗甲状腺微粒体抗体测定

65.下列试验检查中，哪一种对诊断甲亢最可靠 ( D )

A.甲状腺大 B.基础的代谢率增高 C.中枢神经系统兴奋性增高

D.T3T4 增高 E.多食、消瘦

66.下列哪一种疾病可与 Graves 病伴发 ( E )

A.1 型糖尿病 B.慢性特发性肾上腺皮质功能减退症

C.特发性血小板减少性紫癜 D.重症肌无力 E.以上都是

67.原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是 ( A )

A.血 TSH B.血总 T3 C.血游离 T3 D.血总 T4 E.血游离 T4

68.抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指证是 ( D )

A.出现低钾血症 B.合并严重感染 C.出现严重心律失常

D.二氧化碳结合力  $< 5.0 \text{ mmol/L}$  或血  $\text{PH} < 7.1$  E.常规应用

69.磺脲类药物的主要副作用是 ( B )

A.恶心、呕吐 B.低血糖反应 C.肝功能损害 D.白细胞减少 E.皮肤瘙痒

70.可引起低钠、低氯、水中毒的是 ( D )

A.胰岛素 B.格列吡嗪 C.格列喹酮 D.氯磺丙脲 E.二甲双胍

71.低容量性低钠血症对机体最主要的影响是 ( C )

A.酸中毒 B.氮质血症 C.循环衰竭 D.脑出血 E.神经系统功能衰竭

72.痛风属于那种代谢病( D )

A.糖 B.蛋白质 C.脂肪 D.嘌呤 E.核糖

73.下列哪项是糖尿病酮症酸中毒补钾的原则( C )

A.治疗酸中毒起初的 2 小时

B.治疗前, 血钾正常, 每小时尿量 20ml 以上

C.治疗前, 血钾正常, 每小时尿量 40ML 以上

D.治疗前, 血钾正常, 每小时尿量 30ML 以上

E.治疗前, 血钾高于正常

74.正常人低血糖是指( C )

A.血糖低于 3.3mmol/L B.血糖低于 3.0mmol/L

C.血糖低于 2.8mmol/L D.血糖低于 2.5mmol/L

E.血糖低于 2.2mmol/L

75.较为可靠的反映贫血程度的检查部位是( D )

A.耳轮皮肤 B.面颊, 皮肤黏膜 C.颈部皮肤及舍面

D.睑结膜, 指甲, 口唇 E.手背皮肤及口腔黏膜

76.缺铁性贫血在成年男性中最多见得原因是（ A ）

A.消化道慢性失血 B.铁需要量增加 C.失血过多

D.铁摄入不足 E.骨髓造血功能减退

77.缺铁性贫血的预后取决于（ D ）

A.铁剂应用时间的长短 B.影响铁剂吸收因素的有无 C、铁剂应用途径

D.原发病是否能够治疗彻底 E.铁剂用量太小

78.特发性血小板减少性紫癜的首选治疗方法为（ B ）

A.免疫抑制剂 B.糖皮质激素 C.抗纤溶药物 D.脾切除 E.氨肽素

79.急性白血病浸润的体征最多见于（ C ）

A.胸骨压痛 B.牙龈肿胀，皮肤损害 C.淋巴结、肝脾大

D.中枢神经系统 E.心脏增大

80.关于急性输血溶血反应叙述不正确的是（ A ）

A.多为血管外溶血 B.可由血型不合引起

C.突感烦躁不安、寒战、高热、头胀痛 D.可并发 DIC 出血不止

E.输液和碱化尿液治疗



81.类风湿关节炎最常见的肺部受累表现为( B )

A.结节样变 B.肺间质病变 C.胸膜炎 D.肺动脉高压 E.Caplan

82.下列哪项是类风湿关节炎关节受累的特点( C )

A.下肢大关节非对称性肿 B.大关节游走性疼痛 C.小关节持续性对称性肿

D.足关节红肿热痛 E.负重关节疼痛

83.类风湿关节炎治疗的目的不包括( E )

A.控制关节疼痛 B.防止关节破坏 C.保护关节功能

D.提高患者的生活质量 E.彻底治愈疾病

84.系统性红斑狼疮关节表现的特点是( E )

A.对称性关节炎, 常见关节畸形 B.对称性近端指间关节肿, 可见关节畸形

C.对称性远端指间关节肿, 可见关节畸形 D.足关节红肿、疼痛。反复发作

E.对称性关节疼痛或肿, 减少出现关节畸形

85.下列不需要激素冲击治疗的是( D )

A.急进性狼疮肾炎 B.严重的狼疮脑病 C.严重的狼疮肺炎

D.严重的皮疹 E.严重的溶血性贫血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218023116076006036>