

新冠防控相关知识考试

1. 根据《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册(试行)》的要求，核酸采样点的设置错误的是 [单选题]

采样点应当为独立空间

采样点均为污染区，不需要在内部划分相应的清洁区和污染区 (正确答案)

采样点需配备手卫生设施或装置

每个采样点应当至少配备 1~2 名采样人员

2. 根据《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册(试行)》的要求，关于新冠核酸标本的运，下列说法正确的是 [单选题]

院内短距离转运，不需要使用密闭箱转运，使用密闭袋即可

标本转运箱封闭前，须使 0.55% 含氯消毒剂喷洒消毒

标本转运箱开启前，须使 055% 含氯消毒剂喷洒消毒

疑似或确诊患者标本应进行单独转运 (正确答案)

3. 依据《关于印发应对冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》中，在中高风险地区预检分诊点一级防护装备至少包括那些 [单选题]

工作服、医用外科口罩

工作服、医用外科口罩、一次性工作帽

工作服、医用外科口罩、一次性工作帽、一次性乳胶手套

工作服、医用外科口罩、一次性工作帽、隔离衣、一次性乳胶手套 (正确答案)

4. 医疗机构应当实行传染病的什么制度，对传染病患者、疑似传染病患者，应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊 [单选题]

预检、隔离

分诊、消毒

预检、分诊 (正确答案)

消毒、隔离

5. 新型冠状病毒感染患者采集标本送检核酸时，以下选项中，优先考虑采集 [单选题]

鼻咽拭子+口咽拭子 (正确答案)

口咽拭子

鼻咽拭子

粪便标本

6. 关于新型冠状病毒感染的流行病学特点，以下哪项不正确？ [单选题]

新型冠状病毒在潜伏期无传染性 (正确答案)

新冠肺炎发病后 5 天内的传染性较强

在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能
人群普遍易感

7. 新肺炎疫情期间医务人员防护技术指南规定，医务人员诊疗操作过程中，手部未见明显污染物时使用哪种消毒剂 [单选题]

皮肤消毒剂

速干手消毒剂 (正确答案)

外科手消毒剂

洗手液

8. 新冠肺炎所有病例根病情化至少（）小时内订正临床病情严重程度 [单选题]

2

6

12

24(正确答案)

9. 以下关于新冠肺炎疑似病例的定义哪项不正确 [单选题]

有流行病学史中的任何一条，且符合临床表现中任意两条

有流行病学史中的任何两条，且符合临床表现中任意一条 (正确答案)

无明确流行病学史的，符合临床表现中任意 2 条，同时新型冠状病毒特异性 IgM 抗体阳性(未接种疫苗)

符合临床表现中的 3 条

10. 2020年 1 月 20 日，国家卫生健康委员会发布公告新冠肺炎纳入法定（）类传染病，采取（）类传染病的预防、控制措施 [单选题]

甲类、甲类

乙类、乙类

乙类、甲类 (正确答案)

丙类、乙类

11. 急诊手术患者处置正确的是 [单选题]

必须先进行新冠肺炎排查，阴性才能做手术

在正常急诊手术室安排急救手术

应根据病情进行相应处理，不能因为等待核酸检测采样或检测结果而延误治疗 (正确答案)

患者来不及排查，医生按正常手术着装立即行急诊手术

12. 《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》中指出下列哪项不能有效灭活新型冠状病毒 [单选题]

75% 乙醇

含氯消毒剂

过氧乙酸

氯己定(正确答案)

13. 以下关于病区终末消毒说法正确的是 [单选题]

患者出院后，若使用的床单被套无可见污物，则不需要更换进行消毒处理

无特殊感染患者出院后，床单元物表使用清水擦拭即可

患者出院后，可直接采用紫外线照射消毒

终末消毒应遵循先清洁、后消毒，从相对清洁到污染区域的原则(正确答案)

14. 依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第八版）》，新冠肺炎的传染源主要有
[单选题]

新型冠状病毒感染的患者和无症状感染者(正确答案)

一般接触者

密切接触者

密接的密接

15. 依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第八版）》，新冠肺炎疑似病例的排除标准是 [单选题]

疑似病例 1 次新冠病毒核酸检测阴性且发病 7 天后新冠病毒特异性 IgM 抗体和 IgG 抗体仍为阴性

疑似病例连续 2 次新冠病毒核酸检测阴性（采样时间至少间隔 24 小时）且发病 7 天后新冠病毒特异性 IgM 抗体和 IgG 抗体仍为阴性(正确答案)

疑似病例连续 2 次新冠病毒核酸检测阴性（采样时间至少间隔 24 小时）且发病 14 天后新冠病毒特异性 IgM 抗体和 IgG 抗体仍为阴性

疑似病例连续 2 次新冠病毒核酸检测阴性（采样时间至少间隔 24 小时）且发病 14 天后新冠病毒特异性 IgM 抗体为阴性

16. 以下关于新型冠状病毒肺炎临床特点中说法错误的是 [单选题]

潜伏期 1~14 天，多为 7~10 天(正确答案)

儿童病例症状相对较轻，极少数儿童可有多系统炎症综合征

以发热、干咳、乏力为主要表现，部分患者以嗅觉、味觉减退或丧失等为首发症状

重型、危重型患者病程中可为中低热，甚至无明显发热

17. 以下关于新冠肺炎患者的实验室检查中哪项说法不正确？ [单选题]

多数患者 C 反应蛋白（CRP）和血沉升高

若新型冠状病毒总抗体阳性，则特异性 IgM 抗体及 IgG 抗体至少有一项为阳性 (正确答案)

新型冠状病毒特异性 IgM 抗体、IgG 抗体在患者发病 1 周内的阳性率均较低

抗体检测可能会出现假阳性，一般不单独以血清学检测作为诊断依据

18. 依据国务院《应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案》，临床科室疫情防控第一责任人是 [单选题]

业务院长

科主任 (正确答案)

护士长

感控护士

19. 关于常态化疫情防控中普通临床科室医务人员防护方法错误的是 [单选题]

穿工作服

戴医用外科口罩

戴医用防护口罩 (正确答案)

落实标准预防措施

20. 普通科室住院患者管理做法错误的是 [单选题]

经过入院筛查排除新冠肺炎的患者住院期间可以不戴口罩 (正确答案)

患者住院期间，原则上不得离开病区

患者住院期间应禁止串病室

病区应适当控制收住院患者密度

21. 住院患者管理中做法错误的是 [单选题]

加强对住院患者的体温和感染相关症状监测

如病区发现可疑新冠肺炎患者时，应立即启用缓冲病区，将可疑患者隔离收治

发现发热病人立即上报疑似病例 (正确答案)

患者病情允许时必须全程佩戴符合国家要求的无呼气阀口罩

22. 住院病房中发现疑似新冠肺炎患者时做法错误的是 [单选题]

应立即启用缓冲病区，将疑似患者隔离收治，并报告医院相关部门

隔离病区内患者实行分组护理

同病区隔离患者的密接患者暂时原地隔离

同一病区其他病室患者立即安排出院 (正确答案)

23. 患者新型冠状病毒核酸检测阳性，首诊医生需（）小时完成传染病疫情卡报告

[单选题]

2 (正确答案)

4

12

24

24. 患者男，20岁，3天前从国内中高风险区至成都，因“胃痛”至我院就诊，持健康绿码，询问病史时正确的是 [单选题]

因持绿码，可不询问新冠病毒感染相关症状

因持绿码，可不询问新冠病毒感染相关流行病学史

因来自国内中高风险区，应详细询问流行病学史及症状 (正确答案)

拒绝患者就诊

25. 关于常态化疫情防控中普通临床科室医务人员防控要点说法错误的是 [单选题]

医务人员是个人健康安全的第一责任人

应严格自律，不聚餐，减少集中开会

杜绝科室间不必要的人员往来

在岗医务人员应集中住宿，避免回家接触家人 (正确答案)

26. 关于常态化疫情防控中普通临床科室医务人员防控做法正确的是 [单选题]

穿工作服进入休息室

在污染区饮水、就餐

组织全体科室人员聚餐

避免无防护条件下交谈 (正确答案)

27. 以下说法正确的是 [单选题]

密切接触者是指疑似病例和确诊病例症状出现当天，或无症状感染者标本采样当天开始，与其有近距离接触但未采取有效防护的病例

输入继发病例的判断中，不论其是否到过或居住在境内有确诊病例或无症状感染者报告的社区，只要病例发病前 14 天内与境外输入病例有明确接触史而感染，即可为输入继发病例

一般接触者是指与疑似病例、确诊病例和无症状感染者在乘坐飞机、火车和轮船等同一交通工具、共同生活、学习、工作以及诊疗过程中有过接触，但不符合密切接触者判定原则的人员 (正确答案)

聚集性疫情是指 14 天内在学校、居民小区、工厂、自然村、医疗机构等小范围内发现 3 例及以上病例

28. 关于新冠肺炎无症状感染者说法正确的是 [单选题]

需按确诊患者进行隔离 (正确答案)

无症状表明无传染性

住院和门诊患者中目前存在大量的无症状感染者

为了早发现无症状感染者，应对所有门诊患者进行新冠核酸筛查

29. 以下关于无症状感染者的说法错误的是 [单选题]

是指呼吸道等标本新型冠状病毒病原学检测呈阳性，无相关临床表现，如发热、干咳、咽痛等临床症状与体征，且 CT 影像学无新冠肺炎影像学特征者

发病日期为阳性标本采集时间，诊断日期为阳性检出时间

应当集中隔离医学观察 14 天

已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，无需再进行 14 天的居家医学观察 (正确答案)

30. 关于普通临床科室设置缓冲病区说法错误的是 [单选题]

缓冲病区除污染区（患者隔离病室）外，还应至少设有潜在污染区，用于医务人员脱卸防护用品

潜在污染区的设置可利用缓冲病区相邻病房，或在缓冲病区外使用物理屏障隔出独立区域

缓冲病区应设置在相对独立的位置，不应穿插在普通病区中间

缓冲病区内必须设置清洁区，用于穿戴防护用品 (正确答案)

31. 关于普通病房缓冲病区说法正确的是 [单选题]

缓冲病区内清洁区、潜在污染区、污染区的相对位置应符合由污到洁的流线

缓冲病区与非缓冲病区之间应设置醒目标识 (正确答案)

缓冲病区的病室应随时紧闭门窗

缓冲病区与非缓冲病区之间共用一套集中通风系统

32. 新型冠状病毒肺炎的“四早”措施不包括以下哪项 [单选题]

早发现

早报告

早隔离

早预防 (正确答案)

33. 根据目前掌握的新型冠状病毒物学特点、流病学特征、致病性、临床表现等信息，该病原体暂按照病原微生物危害程度分类中第几类病原微生物进行管理？ [单选题]

第一类

第二类 (正确答案)

第三类

第四类

34. 关于普通临床科室收治择期患者，下列做法正确的是 [单选题]

患者从国外回来，经过 14 天集中隔离，核酸检测阴性，回家第三天到医院就诊，评估患者无发热、无症状即可正常收治入院

患者办理入院时有七天前的核酸检测阴性报告，无流行病学接触史，无发热，但有干咳、胸痛、乏力症状，自述有受凉史，可正常收治入院

患者从低风险区旅行回来，第二天即到医院就诊，入院处将其带到发热门诊进行筛查排除新冠肺炎后正常收治入院

患者办理入院时有发热症状，入院处医务人员将其带到发热门诊进行筛查排除新冠肺炎后再收治入院 (正确答案)

35. 以下关于住院病区患者的陪护及探视管理说法错误的是 [单选题]

加强探视和陪护管理，强化病区 24 小时门禁管理

无关人员禁止随意出入

陪护人员无流行病学史、无症状和发热即可进入病区陪护 (正确答案)

取消非必要的现场探视和陪护

36. 按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》新型冠状病毒感染的肺炎患者出院/转科后可使用（）的含氯消毒剂对环境和使用后的医疗设备进行终末消毒 [单选题]

500mg/L

1000mg/L (正确答案)

2000mg/L

5000mg/L

37. 《四川省应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案》中要求，住院病区应实行封闭管理制度，关于病区进出口通道以下说法错误的是 [单选题]

设置唯一进出口通道及筛查专岗

核对出入病区人员陪护/探视证和身份证

严格限制无关人员进入

天府健康码正常即可放行进入 (正确答案)

38. 疑似或确诊新冠肺炎患者医疗废物的管理中，说法正确的是 [单选题]

污染区产生的医疗废物，在离开前应当对包装袋表面采用 1000mg/L 的含氯消毒液喷洒消毒 (正确答案)

污染区产生的医疗废物，在离开前应当对包装袋表面采用 2000mg/L 的含氯消毒液喷洒消毒

每天运送结束后，可使用 500mg/L 含氯消毒液对运送工具擦拭消毒

每天运送结束后，可使用 2000mg/L 对运送工具含氯消毒液擦拭消毒

39. 《四川省应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案》中关于眼科门诊防控措施，说法错误的是 [单选题]

眼科专科仪器和器械均采用一人一用一消毒制度

裂隙灯等精密仪器建议用保鲜膜包裹，使用后进行消毒

对于非接触性眼压计、检眼镜等非接触性检查器具可不用消毒 (正确答案)

所有进入门诊的患者进行体温测量，查健康码，询问流行病史，进行手卫生

40. “三区两通道”中不包括 [单选题]

污染区

潜在污染区

清洁区

医务人员通道

污染通道 (正确答案)

41. 根据《医院感染管理办法》，下列说法错误的是 [单选题]

用于注射、穿刺的医疗器具必须一用一灭菌

接触完整皮肤的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平

一次性使用的压脉带可送消毒供应中心消毒后重复使用 (正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225132114343012004>