

普外创伤外科下半年护士三基理论考核试题及答案

1.分级护理制度是指患者在住院期间，医护人员根据患者病情和生活自理能力进行评定而确定的护理级别，主要分为（）

- A.特级护理
- B.一级护理
- C.二级护理
- D.三级护理
- E.以上所有(正确答案)

2.二级护理要求几小时巡视患者，观察病情变化（）

- A. 1小时
- B. 2小时(正确答案)
- C. 3小时
- D. 4小时

3.下列哪个选项不是特级护理的内容（）

- A.维持生命，实施抢救性治疗的重症监护患者
- B.自理能力重度依赖的患者(正确答案)
- C.各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者
- D.病情危重，随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者

4.胃肠减压患儿胃肠功能恢复的指征是（）

- A. 胃肠减压量逐渐减少颜色变浅
- B. 腹胀减轻
- C. 肛门排气排便
- D. 饥饿感增强

E. 以上全部都是(正确答案)

5.在进行下列哪些情况需要进行者身份确认（）

A.标本采集

B.给药

C.输血或血制品

D.以上都是(正确答案)

6.嵌顿性腹股沟疝嵌顿超过（）小时禁忌直接手法复位

A. 24

B. 12(正确答案)

C. 48

D. 72

E. 6

7.下列说法错误的是（）

A.患者新入院时，责任护士向患者说明佩戴腕带的目的和意义，并帮助患者正确佩戴

B.患者在院期间应始终佩戴腕带，出院时由护理人员协助取下

C.有创诊疗、输液输血、抢救、语言交流障碍的患者等必须佩戴“腕带”，用以识别患者身份,其他患者可以不用佩戴(正确答案)

D.对无法进行患者身份确认的无名患者，同样需要佩戴腕带

8.下列关于新生儿黄疸治疗仪使用时的注意事项正确的是（）

A.光疗过程中随时观察患儿眼罩、会阴道庶盖物是否覆盖完好，皮肤有无破损。

B.注意翻身，防止骶尾部皮肤压伤及烫伤。

C.清洁患儿皮肤，剪指甲，戴眼罩，戴手套、脚套，遮盖会阴，男婴注意保护阴囊，其余均裸露，单面光疗应定时翻身。

D.注意辐射台请勿直接照射黄疸治疗仪的面板，以免灯管炸裂。

E.以上均对(正确答案)

9.2岁以下的小儿肌肉注射宜选择 ()

A.臀大肌

B.三角肌

C.臀中肌、臀小肌(正确答案)

D.股外侧肌

E.肱二头肌

10. 儿童先天性巨结肠典型的临床表现是 ()

A.便秘(正确答案)

B.腹胀

C.呕吐

D.腹痛

E.便血

11. 关于抢救药品及设备的管理, 哪项错误 ()

A.专人管理

B.定品种数量定期检查

C.定位放置

D.外借时一定要登记(正确答案)

12. TDP照射时照射头与被照射部位距离为 ()

A.20-30cm(正确答案)

B.20-40cm

C.30-50cm

D.30cm

E.50cm

13. 插胃管时，病人出现呛咳、发绀时，应（）

- A. 嘱病人深呼吸
- B. 立即拔出胃管休息片刻后重插(正确答案)
- C. 嘱病人做吞咽动作
- D. 让病人休息一会再插
- E. 继续插管

14. 儿童心肺复苏中胸外心脏按压的指征（）

- A. 呼吸不规则，表现为抽泣样呼吸
- B. $P < 60$ 次/分伴有灌注不良的体征(正确答案)
- C. 意识障碍，出现昏迷
- D. 心率不齐
- E. 呼吸暂停

15. 回流灌肠的目的（）

- A. 促进肠管蠕动，清除粪便，减轻腹胀
- B. 缩小肠管扩张段
- C. 减轻炎症刺激及水肿，防止术中粪便污染
- D. 减少术后并发症
- E. 上述均是(正确答案)

16. 关于先天性肥厚性幽门狭窄，下列叙述正确的是（）

- A. 生后2—4周出现呕吐
- B. 呕吐进行性加重
- C. 可见胃型及蠕动波

D. 钡餐示幽门呈“鸟喙状”

E. 上述均是(正确答案)

17. 同时抽取不同种类血标本时应先注入 ()

A 血培养(正确答案)

B 抗凝管

C 干燥管

D 促凝管

E 绿头肝素管

18. 腕带信息必须保持字迹清晰规范、准确无误项目包括 ()
病区

A 病区

B 姓名、性别

C. 年龄、住院号等

D. 以上所有(正确答案)

19. 对于药物过敏患者应选用腕带扣颜色为 ()

A. 蓝色

B. 红色(正确答案)

C. 粉色

D. 白

E 橙色

20. 进行青霉素皮肤试验前应重点评估的内容是 ()

A 用药史和过敏史(正确答案)

B 意识状态与合作能力

- C 目前诊断与病情
- D 注射局部有无红肿硬结
- E 输血史

21.外科中最常见的两种休克是（）

- A感染性休克、心源性休克
- B低血容量性休克、感染性休克(正确答案)
- C低血容量性休克、过敏性休克
- D感染性休克、神经性休克
- E低血容量性休克、心源性休克

22.高效辐射烧伤治疗仪的治疗作用（）

- A.活化细胞、加速血液循环，减少渗出
- B.增强再生愈合能力，增加营养吸收和废物排出，预防和控制感染
- C.可减少疮面分解毒物的吸收，减轻中毒者症状
- D.刺激肉芽及上皮组织生长，加速愈合、止痒镇痛
- E.以上均对(正确答案)

23. 关于无创血压监测，下列不正确的是（）

- A.无创伤性，重复性好
- B.自动测压，省时省力，易掌握
- C.能间接判断是否有心律失常(正确答案)
- D.自动检测血压袖带的大小，测量平均动脉压准确
- E.可引起肢体神经缺血、麻木等并发症

24. 哪一类水、电解质紊乱最容易发生低血容量性休克（）

- A 低渗性脱水(正确答案)

- B 高渗性脱水
- C 等渗性脱水
- D 水中毒
- E 低钾血症

25.抢救青霉素过敏性休克病人的首选药物是（）

- A 盐酸肾上腺素(正确答案)
- B 去甲肾上腺素
- C 异丙肾上腺素
- D 盐酸异丙嗪
- E 硫酸阿托品

26.复苏药物首选的给药途径是（）

- A 气管内给药
- B 皮下注射
- C 静脉注射(正确答案)
- D 肌肉注射
- E 动脉注射

27.防止手术部位感染最有效的对策是（）

- A 术前预防使用抗生素
- B 术后加强营养
- C 提高患者免疫力
- D 严格无菌操作(正确答案)
- E 加压包扎

28.一位急诊创伤病人同时出现下列病情，你先抢救哪一项（）

A.窒息(正确答案)

B.昏迷

C.骨折

D.心律失常

E.伤口出血

29.持续使用心电监护仪的婴幼儿，电极片应每几天更换一次。（）

A.一天

B.二天

C.三天(正确答案)

D.七天

30.你作为夜间值班护士，发现两名患者家属情绪激动，扬言进行打架，你此时应该拨打的电话为（）

A.67064

B.65549(正确答案)

C.67890

D.62143

31.鼓励肠梗阻患儿术后早期活动的最主要作用是（）

A 防止便秘

B 防止肠粘连(正确答案)

C 有利于循环

D 促进食欲

E 促进伤口愈合

32.目前收治患儿病情危重，正在抢救，此时你应该拨打电话为（）

A.6363-7064

B.6363-5549

C.6363-7890

D.6331-9026(正确答案)

33.惊厥较重或时间较长者不是观察重点的是 ()

A 血压

B 呼吸

C 脉搏

D 大小便(正确答案)

E 意识及瞳孔变化

34.急性阑尾炎穿孔病人术后采取半坐卧位的主要目的是 ()

A 缓解呼吸困难

B 减少静脉回心血，减轻心脏负担

C 有利于腹腔引流，使感染局限化(正确答案)

D 减轻腹壁伤口疼痛

E 减少局部出血

35.立即执行的医嘱，在处方开出后多少时间内执行 ()

A 15分钟(正确答案)

B 5分钟

C 30分钟

D 60分钟

E 12小时

36.空气栓塞时应采取的卧位是 ()

- A 半卧位
- B 左侧卧位，头高足低位
- C 右侧卧位，头低足高位
- D 左侧卧位，头低足高位(正确答案)
- E 端坐位

37.下列输液所致的发热反应的处理措施哪一项是错误的（）

- A 出现反应，立即停止输液
- B 通知医生及时处理
- C 寒战者给予保温处理
- D 高热者给予物理降温
- E 及时应用抗过敏药物(正确答案)

38.最为严重的静脉输液治疗并发症是（）

- A 静脉炎
- B 皮肤坏死
- C 导管相关性血流感染(正确答案)
- D 导管堵塞
- E 血栓

39.中心静脉通路的拔除时患儿的体位要求为（）

- A 俯卧位
- B 左侧卧位
- C 头低足高位
- D 右侧卧位
- E 平卧位(正确答案)

40.转运过程中需要夹闭的管路是（）

- A 尿管
- B 胸腔闭式引流
- C 伤口引流
- D 动脉导管(正确答案)
- E 气管插管

41.最常见的输血反应是（）

- A 过敏反应
- B 发热反应(正确答案)
- C 溶血反应
- D 循环负荷过重
- E 枸橼酸钠中毒反应

42.使用冰袋为高热患者降温时,应将冰袋放在（）

- A 颈前部
- B 足底部
- C 背部
- D 前额、体表大血管流经处(正确答案)
- E 枕后部

43.低钾血症的主要表现中错误的是（）

- A 精神萎靡
- B 肠鸣音亢进(正确答案)
- C 心音低钝
- D 肠麻痹
- E 肌肉兴奋性降低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226120043155010045>