

血液病诊疗与护理考核

一、选择题

1.最常见的贫血是：[单选题] *

- A.再生障碍性贫血
- B.巨幼红细胞性贫血
- C.缺铁性贫血✓
- D.急性失血性贫血
- E.溶血性贫血

2.最能反映贫血的实验室检查指标是:[单选题] *

- A.红细胞计数
- B.网织红细胞计数
- C.红细胞沉降率
- D.血红蛋白定量✓
- E.血清蛋白总量

3.鉴别出血倾向者的重要筛选试验是[单选题] *

- A.血小板计数✓
- B.血管型缺陷测定
- C.阿司匹林耐量试验
- D.血小板粘附试验
- E.凝血因子测定

4.有关出血倾向的护理措施下列哪项错误[单选题] *

- A.避免皮肤摩擦， 操作轻柔
- B.避免肌肉注射
- C.注意口腔清洁， 少吃坚硬食物
- D.鼓励肢体活动✓
- E.床单平整， 被褥轻软

5.引起出血的原因不包括：[单选题] *

- A.血小板的质异常
- B.血小板的量异常
- C.血管通透性增加
- D.凝血功能异常
- E.贫血✓

6.体内铁吸收的主要部位是[单选题] *

- A . 胃
- B. 十二指肠及空肠上端✓
- C. 空肠下端
- D . 结肠
- E . 直肠

7.正常细胞性贫血常见于[单选题] *

- A . 巨幼细胞贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 地中海贫血

D . 铁幼粒细胞性贫血

E . 再生障碍性贫血✓

8.大细胞性贫血常见于[单选题] *

A . 巨幼细胞贫血✓

B. 缺铁性贫血

C . 溶血性贫血

D . 失血性贫血

E . 再生障碍性贫血

9.成人男性血红蛋白的参考值范围是[单选题] *

A . 100 ~ 140g / L

B. 140 ~ 170g / L

C . 110 ~ 150g / L

D . 170 ~ 200g / L

E. 120 ~ 160g / L✓

10.可准确反映贫血患者体内贮存铁情况的指标是[单选题] *

A . 血清铁蛋白✓

B. 含铁血黄素

C . 血清铁

D . 总铁结合力

E . 骨髓铁染色

11.成人缺铁性贫血的主要病因是：[单选题] *

A.需铁量增加及摄入不足

B.造血功能衰竭

C.慢性失血✓

D.铁的吸收不良

E.胃酸缺乏

12.下列哪项在缺铁性贫血时见不到：[单选题] *

A.眩晕或晕厥

B.气促

C.皮肤粘膜苍白

D.指甲变薄，变脆

E.红细胞数减少较血红蛋白量减少明显✓

13.口服铁剂治疗缺铁性贫血，早期观察有效的指标是：[单选题] *

A.红细胞数量增多

B.血红蛋白量增多

C.网织红细胞计数升高✓

D.红细胞比积恢复

E.红细胞大小不等现象消失

14.急性再生障碍性贫血早期最突出的表现是：[单选题] *

A.出血

B.贫血

C.出血和感染✓

D.肝、脾肿大

E.感染

15.再生障碍性贫血实验室检查不可能出现：[单选题] *

A.血象呈全血细胞减少

B.贫血属于正常细胞型

C.网织红细胞增多✓

D.骨髓粒细胞减少

E.骨髓增生低下

16.急性再生障碍性贫血病人一般不出现：[单选题] *

A.进行性贫血

B.感染

C.出血

D.全血细胞减少

E.肝、脾淋巴结肿大✓

17.哪项不属于贫血引起的表现：[单选题] *

A.心率加快

B.体力下降

C.食欲下降

D.血压下降✓

E.全身乏力，头晕

18.某急性再生障碍性贫血病人，突然出现头痛、头晕，视力模糊、呕吐，疑为颅内出血，护士首先应给予病人：[单选题] *

A.头部置冰袋✓

B 低流量吸氧

C.头低脚高位

D.保持口腔清洁

E.鼻饲流质饮食

19.引起再生障碍性贫血最常见的药物是：[单选题] *

A.磺胺药

B.氯霉素✓

C.保太松

D.氯丙嗪

E.阿司匹林

20.对有明显出血现象的病人，以下哪项处理是错误的：[单选题] *

A.尽量减少注射次数

B.注射后延长针口按压时间

C.静脉注射时延长扎止血带时间✓

D.注射后观察针口渗血情况

E.止血操作动作就轻柔

21.缺铁性贫血发生率在哪组人群最低：[单选题] *

A.婴儿

B.妊娠妇女

C.年轻妇女

D.青少年

E.老年人✓

22.含铁丰富的食物不包括：[单选题] *

A.肉类

B.豆类

C.谷类✓

D.海带

E.蛋黄

23.有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述，下列哪项不正确：[单选题] *

A.症状纠正后继续服药 3-6 个月

B.网织红细胞数增加是治疗有效的指标

C.可饭后服用

D.服药后可出现黑粪

E.可防止缺铁性贫血的复发✓

24.口服铁剂治疗哪项错误：[单选题] *

A.不宜与牛奶同服

B.液体铁剂用吸管

C.可与茶同服，促进吸收✓

D.定期检查血常规

E.宜餐后服用

25.营养室制定含有瘦肉、蛋黄、猪肝、黑木耳的菜谱适合哪种血液病患者：[单选题] *

A.急性白血病

B.缺铁性贫血✓

C.再生障碍性贫血

D.特发性血小板减少性紫癜

E.过敏性紫癜

26.某缺铁性贫血患者,口服硫酸亚铁 0.3 克,每日 3 次进行治疗,护士通知患者应采取以下哪种方法:[单选题] *

A.每间隔 8 小时一次.

B.三餐饭前服用.

C.三餐饭后服用.✓

D.早晨 10 时,下午 3 时和睡前服用.

E.在一天中任选时间服用.

27.某急性再生障碍性贫血患者,突然出现头痛、呕吐、瞳孔大小不等、一侧肢体瘫痪,首先考虑:[单选题] *

A.颅内感染

B.颅内出血✓

C.脑膜炎

D.出血性休克

E.脑血栓

28.某缺铁性贫血患者,口服硫酸亚铁 0.3 克,每日 3 次进行治疗,护士通知患者应采取以下哪种方法:[单选题] *

A.茶水送服

B.三餐饭前服用

C.三餐饭后服用✓

D.在一天中任选时间服用

E.牛奶送服

29.某再生障碍性贫血患者,出现高热并且时有抽搐,此时最适宜的降温措施是以下哪种方法:[单选题] *

- A.温水擦浴
- B.酒精擦浴
- C.口服退热药
- D.冰水灌肠
- E.头部及大血管处放置冰袋✓

30.再生障碍性贫血病人发生高热,家属要求使用酒精拭浴降温,你向其解释不宜使用的理由是,它会使病人 : [单选题] *

- A.体温上升
- B.失水
- C.皮肤出血加重✓
- D.感染扩散
- E.降温效果差

31.缺铁性贫血治疗最重要的是 : [单选题] *

- A.补充铁剂
- B.病因治疗✓
- C.脾切除
- D.少量输血
- E.肌肉注射维生素 B

32.急性再生障碍性贫血早期最突出的表现是:[单选题] *

- A.出血
- B.贫血

C.出血和感染✓

D.肝,脾肿大

E.感染

33.关于口服铁剂治疗缺铁性贫血叙述错误的是[单选题] *

A . 从小剂量开始以减少胃肠道反应

B. 与维生素 C 同用可增强效果

C . 服药后常出现大便发黑

D . 血象恢复正常后可马上停药✓

E . 服药 2 小时内禁止饮浓茶

34.慢性再生障碍性贫血首发和主要的表现是[单选题] *

A . 贫血✓

B. 出血

C. 感染

D . 肝、脾、淋巴结肿大

E . 胸骨压痛

35.口服硫酸亚铁必有的不良反应是[单选题] *

A . 黑便✓

B. 便秘

C . 腹泻

D . 恶心

E . 腹痛

36.关于雄激素的描述，不正确的是[单选题] *

- A. 可刺激肾脏产生促红细胞生成素
- B. 对骨髓有直接刺激红细胞生成作用
- C. 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药
- D. 需治疗 3~6 个月才能判断疗效
- E. 该药吸收快, 需要深部肌肉注射✓

37. 急性白血病出血的主要原因是: [单选题] *

- A. 感染
- B. 毛细血管破裂
- C. 播散性血管内凝血
- D. 血小板减少✓
- E. 凝血酶原缺乏

38. 白血病患者突然出现头痛, 恶心, 呕吐, 视力模糊等症状常提示: [单选题] *

- A. 败血症
- B. 脑膜炎
- C. 脑炎
- D. 颅内出血✓
- E. 消化道出血

39. 白血病患者出现发热不宜采用: [单选题] *

- A. 休息
- B. 鼓励饮水
- C. 冷敷
- D. 酒精擦身✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226144212031010044>