

眼科专科知识考试试题含答案

1、关于泪小管炎的临床表现，下列哪项不正确()

- A、眼红
- B、结膜充血
- C、摘除泪囊后，从泪小点挤压无黏性分泌物
- D、常由沙眼衣原体

答案：C

2、下列哪种情况不会引起代谢性白内障()

- A、糖尿病
- B、低血钙
- C、长期运用类固醇药物
- D、半乳糖血症
- E、低血糖

答案：C

3、由于角膜内皮损伤和炎症细胞或色素的同时存在而形成的产物()

- A、房水闪辉
- B、瞳孔区晶体表面见环形色素
- C、KP
- D、瞳孔膜闭
- E、房水中大量炎症细胞

答案：C

4、闭角型青光眼急性期的表现不正确的是()

- A、前房消失
- B、视力下降
- C、角膜上皮水肿，角膜后色素沉着
- D、瞳孔散大

答案：B

5、站在 1M 处仍看不见视力表第一行，应测()

- A、手动
- B、指数
- C、光感
- D、无光感

答案：B

6、白内障的主要症状是()

- A、视力障碍

- B、眼痛
- C、眼充血
- D、压痛
- E、眼分泌物

答案：A

7、Vogt-小柳原田综合征是指()

- A、葡萄膜炎
- B、脑膜刺激征
- C、一眼穿通伤或内眼手术后双眼发生内芽肿性葡萄膜炎
- D、疱疹脱色素为主要特征
- E、虹膜脱色素为主要特征

答案：B

8、视功能检查有()

- A、视力
- B、视野
- C、色觉
- D、以上都包括

答案：D

9、我科白内障患者术后出院一般多久复查()

- A、1-3 天
- B、2-5 天
- C、3-7 天
- D、5-9 天
- E、7-10 天

答案：E

10、预防虹睫炎引起的继发性青光眼，局部应点()

- A、1%匹罗卡品
- B、0.5%噻吗心安
- C、0.25%依色林
- D、0.5%可的松
- E、1%阿托品

答案：E

11、玻璃体积血的自发吸收时间是()

- A、4-6 个月
- B、3-4 个月

- C、1-2 个月
- D、2-4 个月
- E、以上均不是

答案：A

12、3%的左氧氟沙星滴眼液的作用是()

- A、缩瞳
- B、扩瞳
- C、降眼压
- D、升眼压
- E、消炎

答案：E

13、指测眼压 TN 是指()

- A、眼压高
- B、眼压低
- C、眼压正常
- D、测不出
- E、以上都不是

答案：C

14、青光眼斑是指位于()

- A、晶状体前囊下的片状白色混浊
- B、晶状体后囊下的片状白色混浊
- C、晶状体皮质的白色混浊
- D、晶状体核的白色混浊
- E、晶状体前极的白色混浊

答案：A

15、我科沙眼的主要治疗方法()

- A、局部滴眼药水
- B、口服药物
- C、手术治疗
- D、烧灼治疗
- E、理疗

答案：A

16、什么情况下医生可以下达口头医嘱()

- A、新病人入院
- B、手术前

- C、手术中
- D、产妇分娩时
- E、抢救病人时

答案：E

17、测视力前应评估患者哪项内容()

- A、有无佩戴角膜接触镜
- B、是否会使用视力表
- C、是否佩戴框架眼镜
- D、以上都是

答案：D

18、治疗性泪道探通主要用于()

- A、泪小管阻塞
- B、泪小点阻塞
- C、泪总管阻塞
- D、成人鼻泪管阻塞
- E、婴幼儿泪道阻塞

答案：E

19、下列哪项药物青光眼患者慎用()

- A、典必殊
- B、普南扑灵
- C、派立明
- D、阿托品
- E、氟美瞳

答案：D

20、原发性开角型青光眼治疗原则不正确的是()

- A、一旦确诊立即手术
- B、可用1%匹罗卡品
- C、可行氩激光小梁成型术
- D、当视野

答案：A

21、A超主要用于生物测量()

- A、主要为白内障患者
- B、近视眼患者，尤其是病理性近视
- C、其他与眼轴变化相关的疾病
- D、屈光手术前的检查

E、以上都是

答案：E

22、我国首位致盲的眼病是()

A、青光眼

B、视网膜脱离

C、老年性白内障

D、糖尿病性视网膜病变

答案：C

23、患者既往有高血压病史，术后下列哪项药物不建议应用()

A、复达欣

B、明可欣

C、卡络磺钠

D、地塞米松

答案：D

24、下列哪项是眼内进入不明液体的现场急救应()

A、包扎右眼，转送医院

B、硼酸液点眼

C、消炎药点眼

D、涂红霉素眼膏

E、大量清水反复冲洗

答案：E

25、我国人群目前视力损伤的首位原因是()

A、白内障

B、屈光不正

C、视网膜疾病

D、青光眼

E、角膜混浊

答案：B

26、视力丧失最快的眼底病变是()

A、视网膜中央动脉阻塞

B、视网膜中央静脉阻塞

C、球后视神经炎

D、视乳头炎

E、视网膜脱离

答案：A

27、急性闭角型青光眼最典型的症状是()

- A、眼部及头部胀痛
- B、昏迷
- C、躁动
- D、樱桃红斑
- E、水肿

答案：A

28、下列哪种疾病需半卧位()

- A、视网膜脱离
- B、白内障
- C、青光眼
- D、玻璃体积血
- E、以上都是

答案：D

29、我科对于春季角结膜炎治疗，不正确的是()

- A、长期应用类固醇，以减轻症状及发作
- B、可用抗组胺类药
- C、应用非甾体消炎药
- D、必要时可用 2%环胞霉素 A
- E、冷敷

答案：A

30、下列哪项眼药水需冷藏保存()

- A、小牛血清去蛋白提取物
- B、安达芬
- C、贝复舒
- D、爱尔卡因
- E、以上都是

答案：E

31、DR 的患者最容易发生下列哪种类型的视网膜脱离()

- A、孔源性视网膜脱离
- B、渗出性视网膜脱离
- C、牵拉性视网膜脱离
- D、以上均不是

答案：C

32、视网膜脱离的诊断依据有()

- A、患者主诉有飞蚊症
- B、眼底检查：视网膜隆起
- C、眼底检查：视网膜有裂孔
- D、以上都是

答案：D

33、指测眼压时，下列记录哪个表示眼压最低（ ）

- A、T-1
- B、T-2
- C、T-3
- D、Tn
- E、T+1

答案：C

34、矫正近视眼应用哪种透镜（ ）

- A、凹透镜
- B、凸透镜
- C、平光镜
- D、以上都是

答案：A

35、泪道冲洗时，清水完全沿原路返回，则表明阻塞部位是（ ）

- A、泪小管阻塞
- B、泪小点阻塞
- C、泪总管阻塞
- D、鼻泪管阻塞
- E、鼻泪管阻塞合并慢性泪囊炎

答案：A

36、患者突发头痛 眼部胀痛，呕吐，该病例可能的诊断是（ ）

- A、原发性开角型青光眼
- B、原发性闭角型青光眼
- C、角膜炎
- D、急性闭角型青光眼
- E、Fuchs 综合征

答案：D

37、下列检查中，最适宜眼眶骨折的检查是（ ）

- A、X线摄片
- B、超声波

- C、CT
- D、MRI
- E、以上都不是

答案：C

38、治疗虹膜状体炎的重要原则和关键措施是()

- A、缩瞳
- B、应用激素
- C、抗生素
- D、散瞳
- E、中药

答案：D

39、哮喘患者禁用下列哪项眼药水()

- A、托百士
- B、苏为坦
- C、可乐必妥
- D、典必殊
- E、美开朗

答案：E

40、眼球钝挫伤所致的前房积血最常见的并发症是()

- A、并发性白内障
- B、玻璃体积血
- C、黄斑囊样水肿
- D、视神经萎缩
- E、继发性青光眼

答案：E

41、不属于眼压高低的决定因素有()

- A、身高，体重
- B、上巩膜静脉压
- C、房水生成速率
- D、房水通过小梁网流出的阻力

答案：A

42、远视力检查时，患者在5m仍看不清第一行视标，应让患者()

- A、眯眼
- B、往前走直至看清第一行视标
- C、坐下

- D、歪头
- E、两眼同时看

答案：B

43、下列属于高渗脱水剂，能够降眼压的是()

- A、贝他根
- B、甘露醇
- C、乙酰唑胺
- D、适利达
- E、匹罗卡品

答案：B

44、青光眼的最主要特征为()

- A、视力下降
- B、眼痛
- C、眼球充血
- D、眼压升高
- E、虹视

答案：D

45、眼压正常值为()

- A、10-20mmhg
- B、20-30mmhg
- C、30-40mmhg
- D、50-60mmhg
- E、10-21mmhg

答案：E

46、飞蚊症的患者玻璃体的变化为()

- A、多数有玻璃体混浊
- B、70%有威胁视力的病变
- C、多数需要手术治疗
- D、可能伴有闪光感
- E、注视暗色背景明显

答案：D

47、我科目前哪项手术常规下需要全麻下进行()

- A、巩膜扣带术
- B、小梁切除术
- C、冷冻术

- D、DCR
- E、Phaco

答案：D

48、不属于葡萄膜炎解剖部位分类的是()

- A、前葡萄膜炎
- B、中间葡萄膜炎
- C、视网膜脉络膜炎
- D、后葡萄膜炎
- E、全葡萄膜炎

答案：C

49、近视患者的眼轴通常比正常人()

- A、过宽
- B、过窄
- C、过短
- D、过长
- E、不一定

答案：D

50、视网膜脱离最明显的症状()

- A、眼前有漂浮物
- B、视力明显下降
- C、眼痛
- D、眼部充血
- E、散光

答案：B

51、取深层角膜异物时应注意()

- A、异物取出后点抗生素眼液
- B、务必一次取净
- C、严格执行无菌操作
- D、包扎
- E、缝合伤口

答案：C

52、老年性白内障分为()

- A、皮质性
- B、核性
- C、囊下性

D、以上均是

答案：D

53、视网膜脱离患者行 VR 术，玻璃体腔注入惰性气体，该气体是()

A、C₂F₆

B、C₁F₄

C、C₆F₂

D、C₃F₈

答案：D

54、下列不属于 ICGA 强荧光的表现是()

A、自发荧光

B、异常血管

C、组织渗漏

D、荧光染色

E、荧光遮蔽

答案：E

55、下列哪项眼药水是麻药()

A、典必殊

B、普南扑灵

C、派立明

D、阿托品

E、爱尔卡因

答案：E

56、下列哪项是正视眼随年龄的增高逐渐失去调节能力的原因()

A、晶状体混浊

B、睫状肌功能减弱

C、瞳孔变小

D、视网膜变性

E、晶状体纤维硬化

答案：E

57、眼科 OCT 的临床应用有()

A、发现眼底疾病的微小病变，协助诊断

B、确定眼科疾病的病变位置

C、测量眼部局部病变厚度、面积、容积等，用于眼科疾病的随诊、疗效判断

D、以上都是

答案：D

58、我科黄斑变性患者一般注射下列哪些药物()

- A、可乐必妥
- B、康柏西普
- C、典必殊
- D、苏为坦
- E、以上都不是

答案：B

59、沙眼病原体的首次分离者是()

- A、Halbestaedter
- B、Prowazek
- C、汤飞凡
- D、郭秉宽
- E、陈耀真

答案：C

60、霰粒肿是指()

- A、急性化脓性炎症
- B、慢性化脓性炎症
- C、慢性炎性肉芽肿
- D、渗出性炎症

答案：C

61、前房积血可分为几级()

- A、2级
- B、3级
- C、4级
- D、5级
- E、6级

答案：B

62、我科下列哪项手术不需要剪眼毛()

- A、视网膜脱离
- B、青光眼
- C、玻璃体腔内注药术
- D、白内障
- E、以上都不是

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236051114102010051>