

妇产科护理学试题及答案（整理版）

试题一

1.关于子宫的位置与形态，正确的为 D

- A.位于盆腔下方
- B.形如扁梨形
- C.容积为2ml
- D.前与膀胱，后与直肠为邻
- E.子宫峡部非孕时长3cm

2.保持子宫前倾位置的一对主要韧带是 C

- A.圆韧带
- B.阔韧带
- C.主韧带
- D.骨盆漏斗韧带
- E.子宫骶骨韧带

3.与后穹隆顶端贴接的部分为 E

- A.宫颈口
- B.附件
- C.膀胱
- D.直肠
- E.直肠子宫陷凹

4.关于骨盆外测量径线的描述，错误的是 B

- A.髂棘间径为两侧髂前上棘外缘间的距离
- B.坐骨结节间径为两侧坐骨结节外缘间的距离
- C.骶耻外径为第五腰椎棘突下至耻骨联合上缘中点的距离
- D.髂嵴间径为两侧髂嵴外缘间的距离
- E.耻骨弓角度由左右两耻骨降支组成

5.某孕妇，妊娠41周，为防止“过期妊娠”入院引产。入院前嘱病人按医嘱口服己烯雌酚三天，其作用是应用雌激素功能中的B

- A.促进子宫发育，肌层增厚
- B.提高子宫平滑肌对催产素的敏感性
- C.促进子宫内膜增生
- D.促进输卵管蠕动
- E.对下丘脑，垂体的正负反馈作用

6.产科复查一般不再检查的项目是 E

- A.测体重
- B.测血压

C. 胎方位

D. 听胎心音

E. 骨盆外测量

7. 正常胎心音的速率是 D

A. 60-80 次/分

B. 80-100 次/分

C. 100-120 次/分

D. 120-160 次/分

E. 160-180 次/分

8. 妊娠24 周后听胎心音的听诊部位， 错误的是 D

A. 骶右前位， 母体脐上右侧

B. 枕右前位， 母体脐下右侧

C. 枕左前位， 母体脐下左侧

D. 骶左前位， 母体脐下左侧

E. 肩先露， 母体腹壁脐周围

9. 正常的胎动每小时 B

A. 1-2 次

B. 3-5 次

C. 6-8 次

D. 9-12 次 E. 13-16 次

10. 某女士， 足月妊娠临产后， 因某些原因， 需阴道检查， 结果为： 扪及胎儿的小囟门在母体骨盆的左前方。 A

A. 枕前露

B. 额先露

C. 面先露

D. 臀先露

E. 肩先露

11. 枕先露分娩中， 胎头俯屈后下降通过产道， 正常情况下是以胎头的 C

A. 枕额径

B. 枕颈径

C. 双顶径

D. 双颞径

E. 枕下前凶径

12. 第三产程一般不超过 D

A. 5min

B. 10min

C.20min

D.30min

E.40min

13 确定已进入第二产程的表现E

A. 胎膜已破

B. 宫缩频而强

C. 肛门稍松弛

D. 产妇屏气用力

E. 肛查: 宫口开全

14. 显示胎盘尚未剥离的是A

A. 子宫底上升

B. 子宫收缩呈球形

C. 阴道少量流血

D. 阴道口外露脐带自行下降延伸

E. 在耻骨联合上方压子宫下段时脐带回缩

15. 冯女士, 第一孕, 妊娠40周, 初产妇. 临产6小时, 宫口开大3cm; 临产11小时,

宫口开全, 先露头, 先S 0, 胎心正常。此时产程属于A

A. 产程正常

B. 潜伏期延长

C. 活跃期延长

D. 活跃期停滞

E. 第二产程

16. 前置胎盘的主要症状为E

A. 胎位异常

B. 胎先露高浮.C 子宫大于符合孕周

D. 子宫硬如板样

E. 无痛性反复流血

17. 为防止前置胎盘患者继续流血, 禁止做A

A. 肛查

B.B 超

C. 听诊胎心

D. 腹部触诊检查

E. 胎儿电子监护

18. 不会并发胎盘早剥的选项为D

A. 双胎

- B. 妊高征
- C. 羊水过多
- D. 过期妊娠
- E. 腹部直接受到撞击

19. 提示重型胎盘早剥病人隐性出血多的征象, 不包括D

- A. 贫血貌加重
- B. 腹痛增剧
- C. 子宫板硬
- D. 胎位清楚
- E. 宫底增高

20. 硫酸镁毒性反应解救药物是E

- A. 阿托品
- B. 肾上腺素
- C. 10% 葡萄糖
- D. 苯巴比妥钠
- E. 10-% 葡萄糖酸钙

21. 可促进胎儿非成熟的药物是C

- A. 利托君
- B. 硫酸镁
- C. 地塞米松
- D. 维生素
- E. 维生素K

22. 了解胎而肺成熟可测定羊水的D

- A. 肌肝比值
- B. 淀粉酶值
- C. 脂肪细胞值
- D. 卵磷脂/鞘磷脂比值
- E. 胆红素值

23. 陈女士, 30 岁, 已婚. 自述停经50 天时确诊为" 早孕", 至停经60 天时, 阴道少量流血2 天 .

现停经 3 个多月, 妇科检查记录: 子宫检查如孕7 周大小. B 超检查未见胎心搏动. 最大可能为E

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

24. 陈女士,28岁,既往体健.第1孕,妊娠36周,自觉头痛3天,检查:血压160/110mmhg,产科腹部触诊情况正常,双下肢水肿(+),尿蛋白>0.5g/24h.此孕妇患C

- A. 轻度妊高征
- B. 中度妊高征
- C. 先兆子痫
- D. 产前子痫
- E. 妊高合并高血压

25. 静脉注射缩宫素加强宫缩一般每分钟不超过D

- A.10 滴
- B.20 滴
- C.30 滴
- D.40 滴
- E.50 滴

26. 宫口未开全者发生脐带脱垂, 第一项紧急措施是C

- A. 紧急呼叫值班医生和麻醉医师
- B. 氧气吸入并开放静脉输液
- C. 取头低臀高位并手置阴道上推先露部
- D. 配血更衣皮肤消毒
- E. 连接胎心和宫缩监护仪

27. 针对先兆子宫破裂, 防止子宫破裂的护理措施, 不妥的是E

- A. 立即停止缩宫素静脉滴注
- B. 吸氧建立静脉通路
- C. 即刻给予抑制宫缩药物
- D. 指导产妇深呼吸
- E. 安置产妇头高脚低位

28. 孕42周产妇, 给予缩宫素引产4h后, 产妇主诉腹痛难忍。查体: 子宫下段压痛明显, 伴血尿。诊断先兆子宫破裂。首选护理措施是D

- A. 配血备皮
- B. 通知家属
- C. 陪伴产妇
- D. 停缩宫素
- E. 吸氧保暖

29. 下列哪一项不属于抢救新生儿窒息的护理措施。E

- A. 清理呼吸道
- B. 建立自主呼吸

- C. 改善血液循环
- D. 预防感染
- E. 产后半小时母乳喂养

30. 孕妇并发念珠菌性阴道炎，其白带的变化为D

- A. 稀薄的
- B. 黄水样的
- C. 泡沫状的
- D. 豆渣状的
- E. 脓血样的

31. 目前认为子宫肌瘤的形成可能与E

- A. 生活环境有关
- B. 心情抑郁有关
- C. 生育过多有关
- D. 接触有害物质有关E. 体内雌激素水平过高有关

32. 子宫癌变的好发部位是E

- A. 宫颈内口的黏膜上皮
- B. 宫颈外口鳞柱状上皮交界处
- C. 宫颈外口与内口交界处
- D. 宫颈管下缘
- E. 宫颈内口与宫颈管交界处

33~34 题共用题干

汪女士，45岁，未婚，普查发现：子宫呈均匀性增大，如孕6周，质硬光滑，活动。追问病史：月经过多4~5年，且经期延长为12天，无痛经史。初步考虑子宫肌瘤。

33. 为明确诊断临床最常用的辅助检查为D

- A. X线摄片
- B. 宫颈活体组织检查
- C. 阴道脱落细胞检查
- D. B超
- E. 诊断性刮宫

34. 汪女士问治疗方案，医生提出的治疗方案应该是C

- A. 转诊另一家医院再复查
- B. 立即手术切除
- C. 保守治疗
- D. 做CT进一步检查
- E. 在家休息3个月再复查

35. 护士向她解释更年期无排卵型功血的治疗原则是B

- A. 止血, 随访
- B. 调整周期, 减少经量

- C. 全子宫切除
- D. 放疗照射卵巢
- E. 止血, 调整周期, 促排卵

36. 施行人工流产负压吸宫术是在妊娠A

- A. 10 周内
- B. 8 周内
- C. 6 周内
- D. 14 周内
- E. 24 周内

37. 哪项不是避孕药物的副作用B

- A. 类早孕反应
- B. 痛经
- C. 月经量减少
- D. 服药期出血
- E. 体重增加

38. 患者吸宫流产术中, 感胸闷、头晕, 检查: 血压70/50mmHg, 脉搏50 次/分, 应首选何种药物治疗B

- A. 安定
- B. 阿托品
- C. 哌替啶
- D. 苯巴比妥钠
- E. 氯丙嗪

39. 女, 25 岁, 丈夫为军人, 于月经14 天到部队探亲, 丈夫对橡胶过敏, 最好的避孕方法是B

- A. 宫内节育器
- B. 速效口服避孕药
- C. 长效口服避孕
- D. 阴茎套
- E. 皮下埋植避孕

40. 30 岁, 哺乳期闭经, 检查: 宫颈着色, 子宫如孕2 个月大小, 质软, 双附件正常, 做人工流产术, 术中夹出黄色脂肪样组织, 患者感到剧烈腹痛, 伴恶心呕吐。应诊断为B

- A. 人流综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 感染
- D. 宫外孕
- E. 吸宫不全

填空题 (每空1 分, 共10 分)

1. 无保护性生活后，口服紧急避孕药的时间是（）小时内。
2. 妊娠晚期，孕妇体重增加每周不超过（）Kg。
3. 产孕妇的最佳卧位是（）。
4. 临产后胎头下降以（）为标志。
5. 妊娠合并心脏病产后出血禁用（）止血。
6. 产后出血的原因是（）（）（）（）。
7. 宫内节育器放置时间是在月经干净后（）天。

名词解释（每题2分，共10分）

1. 临产
2. 产褥期
3. 前置胎盘
4. 羊水过多
5. 阴道自净作用

简答题（20分）

1. 口服短效避孕药的方法和注意事项。（4分）
2. 叙述妊娠合并心脏病早期心衰的表现。（4分）
3. 叙述葡萄胎吸宫术后随访和健康指导内容。（6分）
4. 简述三个产程。（3分）
5. 妊娠期臀位矫正的时间和方法。（3分）

病例分析题（20分）

1. 单女士,27岁,妊娠39周,阵发性宫缩痛约30min 急诊入院,检查:宫缩持续50s,间歇2~3min,宫口开大3cm,先露头,胎膜未破,先露"0",胎心正常,

(1) 要注意此产妇已临产,表现为(2分) D

- A. 正常产力
- B. 协调性宫缩乏力
- C. 不协调性宫缩乏力
- D. 协调性宫缩过强
- E. 不协调性宫缩过强

(2) 在护理措施中,不妥的是(2分) C

- A. 吸氧
- B. 陪伴产妇
- C. 立即灌肠
- D. 准备接生物品
- E. 准备抢救新生儿物品

(3) 要适当提早消毒外阴准备接生,避免引起诸多母儿损伤,但不包括(2分) C A. 产道撕裂B. 产后出血C. 早产D. 母儿感染E. 新生儿颅内出血

(4) 如新生儿窒息首选的处理措施是什么? (2分)

2. 孕35周臀位, 不规则宫缩, 胎心音148次/分, 血压128/92mmHg, 先露高浮, 无破水, 收治入院待产。

(1) 待产3h后, 胎膜破裂, 护士应立即 (2分) A

- A. 做肛门检查听胎心
- B. 测量生命体征
- C. 呼叫其他人员抢救
- D. 开放静脉输液
- E. 给予氧气吸入

(2) 应急护理完成后, 护士还需向产妇讲解绝对卧床是 (2分) D

- A. 为了胎儿尚小需保胎
- B. 能阻止羊水流出
- C. 便于观察宫缩进展
- D. 防止脐带脱垂
- E. 能减少体力消耗

(3) 此时该孕妇的主要护理诊断 (2个)、护理目标及相应的护理措施为什么? (8分) 加试题

李太太, 剖宫产术后1小时, 现血压14/10Kpa, 脉搏100次/分, 刀口敷料无渗出, 留置尿管24小时,

主诉腹痛。请制定护理计划 (列出主要护理诊断3个, 叙述相应护理措施) (10分)

答案

试题十一

一、单项选择题

1D	2C	3E	4B	5B	6E	7D	8D	9B	10A
11C	12D	13E	14E	15A	16E	17A	18D	19D	20E
21C	22D	23E	24C	25D	26C	27E	28D	29E	30D
31E	32E	33D	34C	35B	36A	37B	38B	39B	40B

二、填空题

- 1. 72
- 2. 0.5
- 3. 左侧卧位
- 4. 坐骨棘
- 5. 麦角新碱
- 6. 宫缩乏力、胎盘因素、软产道撕裂凝血功能障碍
- 7. 3-7天

三、名词解释

- 1. 有规律宫缩, 先露下降, 宫口扩张和宫缩管消失标志临产;
- 2. 产妇全身各器官除乳腺以外从胎盘娩出至接近或恢复正常未孕状态时所需时期 一般为6周
- 3. 胎盘附于子宫下段, 甚至胎盘的下缘, 达到或覆盖宫颈内口, 胎盘位置低于先露部;

4. 妊娠期间,羊水量超过2000ml,即为羊水过多;
5. 阴道上皮细胞内含有丰富的糖原,在阴道杆菌的作用

简答题

1. 方法: 月经第五天晚开始服用,以后每晚一粒,连服22天,漏服应于次晨补服,停服用将出现阴道流血,若无流血应在停服的第七天为晚开始服用下一周期

注意事项:1) 将药物放于深色的瓶中,置于儿童够不着的地方

2.1) 轻微活动便感到胸闷、心悸、气短

2) 安静休息时,心率大于110次/分,呼吸大于20次/分

3) 夜间睡眠时常因胸闷而需端坐呼吸,或到窗前呼吸新鲜空气

4) 听诊肺部有少量持续的湿罗音,咳嗽后仍然存在

3. 随访(2年): 1) HCG——测(-)后每月测一次只测半年,后每3个月测一次测半年,再继续测一年6个月测一次

2) 阴道流血

3) 盆壁组织

4) 有无转移(X线检查肺部)

健康指导: 避孕2年

1) 禁止服用避孕药

2) 禁止宫内节育

4. 第一产程(宫颈扩张期): 从正式临床到宫口开全,经产妇需6~8小时,初产妇需11~12小时

第二产程(胎儿娩出期): 从宫口开全到胎儿娩出,经数分钟,初产妇1~2小时

第三产程(胎盘娩出期): 从胎儿娩出到胎盘娩出,约需5~15分钟,不超过30分钟

5. 1) 妊娠30周时方法: ①胸膝卧位②激光照射③艾灸至阴穴

2) 妊娠32—34周时方法: 外倒转术

病例分析

—

1. D; 2.C 3.C

二

1. A

2. D

3. 有胎儿受损的危险: 胎心维持正常

有感染的危险: 无感染发生

加试题

1. 疼痛病人自述疼痛减轻

2. 组织灌注量改变血压脉搏平稳

3. 排尿方式改变尿管排出后可自行排尿

试题二

1. 作为推算预产期的根据哪项不合适? B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236110013241010043>