

中医眼科学试题及答案

1、描述眼底病灶隆起或凹陷时,每3个屈光度相当于

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm

E. 0.3cm

【答案】A

2、以下哪项不是聚星障的眼部体征

A. 抱轮红赤

B. 黑睛表面点状混浊

C. 黑睛病灶呈树枝状

D. 黑睛病灶呈地图状

E. 黑睛病灶状如豆腐渣

【答案】E

3、患者,男,35岁,视力下降,眼前黑影,视大为小,视物变性;黄斑水肿.渗出;兼见胸膈胀满,眩晕心悸,肢体乏力,舌苔白腻,脉沉滑,多因于

A. 肝肾两亏

B. 脾失健运

C. 痰湿蕴结

D. 肝经郁热

E. 以上都不是

【答案】C

4、针眼在未成脓期时不当挤压或可导致（）重症

A. 胞生痰核

B. 眼丹

C. 睑弦赤烂

D. 眶脓肿

E. 睑脓肿

【答案】B

5、“四边皆白,中心一点微黄色”是指

A. 枣花翳障

B. 優月翳

C. 黑水凝翳

D. 散翳

E. 白翳黄心内障

【答案】E

6、眉棱骨痛病名见于

A. 《审视瑶函》

- B. 《张氏医通》
- C. 《证治准绳》
- D. 《儒门事亲》
- E. 《证治要诀》

【答案】 A

7、阴虚火旺所致眼病的内治法是

- A. 疏风清热法
- B. 泻火解毒法
- C. 疏肝理气法
- D. 祛风散寒法
- E. 滋阴降火法

【答案】 E

8、为预防近视,应注意营养均衡,勿过食

- A. 肉类
- B. 鱼类
- C. 柑橘类水果
- D. 含钙高的食物
- E. 甜食. 软食

【答案】 E

9、下列哪一项不是胎患内障的临床表现

- A. 前后囊膜局限性混浊
- B. 围绕晶珠中央板层或带状混浊
- C. 周边部大小不一的短棒状混浊,放射状排列形如花冠
- D. 晶珠完全混浊,瞳神区发白
- E. 晶珠后囊膜下颗粒状.片状或囊泡状混浊

【答案】E

10、患者撞击伤目,血灌瞳神,久不消散,舌质紫黯,脉弦涩,治宜

- A. 疏肝解郁,止血散瘀
- B. 行气活血,祛瘀通络
- C. 疏肝理气,化痰散结
- D. 补益肝肾,活血明目
- E. 清热利湿,软坚散结

【答案】B

11、胎患内障的发病原因主要是什么

- A. 先天因素
- B. 劳倦因素
- C. 外伤因素
- D. 衰老因素

E. 药物不良反应

【答案】A

12、治疗近视心气不足者, 首选方剂为

A. 补阳还五汤

B. 肾气丸

C. 定志丸

D. 济生肾气丸

E. 附子理中丸

【答案】C

13、暴风客热多因

A. 风热之邪外袭

B. 外感疫毒之气

C. 风热湿邪搏结

D. 风寒客目

E. 痰湿内蕴

【答案】A

14、患者头痛, 连及目眶, 视力急降。检查眼部可见白睛混赤肿胀, 黑睛混浊呈雾状, 前房极浅或几近消失, 瞳神散大, 呈淡绿色, 眼硬如石。全身兼见恶心呕吐, 口苦口干, 尿黄便结, 舌红苔黄, 脉弦数。多因

A. 肝胆火炽

- B. 肝阳上亢
- C. 肝胃虚寒
- D. 肝郁结化火
- E. 瘀血阻滞

【答案】A

15、中医眼科名词“黄仁”指现代眼科哪一解剖部位

- A. 虹膜
- B. 瞳孔
- C. 晶状体
- D. 玻璃体
- E. 黄斑

【答案】A

16、瞳神紧小的主要临床特征是

- A. 白睛混赤, 瞳仁紧小, 目珠触痛, 黄液上冲, 血灌瞳神
- B. 抱轮红赤, 瞳仁缩小, 瞳仁边缘有白色渗出物黏附
- C. 抱轮红赤, 黑睛里层下方有沉着物, 黄仁肿胀, 瞳仁缩小, 阴看不大, 阳看不小
- D. 抱轮红赤, 神水混浊, 瞳仁边缘似锯齿或梅花样
- E. 白睛混赤肿胀, 神水混浊, 黄液上冲迅速增多, 黄仁灰黄, 瞳仁缩小, 瞳后隐约可见黄光反射

【答案】C

17、胞睑红肿热痛,伴大便干结,多为

- A. 外感风热
- B. 阳明实火
- C. 脾胃湿热
- D. 心火上炎
- E. 肝胆火炽

【答案】 B

18、眼眶由几块骨组成

- A. 6 块
- B. 7 块
- C. 8 块
- D. 9 块
- E. 10 块

【答案】 B

19、用五轮学说指导辨证,下列正确的是

- A. 上睑下垂多从脾经论治
- B. 白睛混赤多从肺经论治
- C. 两眦赤烂多从心火论治
- D. 黑睛生翳多从肝胆论治

E. 瞳神紧小多从肾论治

【答案】 ABCD

20、患者暴风客热症见目痛灼热,怕热畏光,热泪如汤,眵多黄稠,胞睑红肿,白睛红赤浮肿;证属热重于风者,治宜选用

A. 银翘散

B. 导赤散

C. 泻肺饮

D. 菊花决明散

E. 以上都不是

【答案】 C

21、晶状体相当于双凸透镜,其屈光度约为

A. 19D

B. 43D

C. 25D

D. 30D

E. 40D

【答案】 A

22、肝劳的主要临床表现如头眼胀痛等,常在以下哪种情况下出现

A. 晨起后

B. 劳动后

- C. 游泳后
- D. 患肝病后
- E. 久视后

【答案】E

23、患者 8 岁, 针眼红肿痛, 灼热疼痛, 白睛红赤肿胀嵌于睑裂, 舌红苔黄, 脉数, 宜采用下列何方加减治疗

- A. 银翘散
- B. 仙方活命饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 普济消毒饮
- E. 以上都不是

【答案】B

24、眼眶由几块骨组成

- A. 6 块
- B. 7 块
- C. 8 块
- D. 9 块
- E. 10 块

【答案】B

25、治疗聚星障阴虚邪留证的主方是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 银翘散
- C. 加減地黄丸
- D. 四顺清凉饮子
- E. 三仁汤

【答案】C

26、视瞻昏渺中有一定自愈性的病变是

- A. 年龄相关性黄斑变性
- B. 中心性渗出性视网膜脉络膜病变
- C. 缺血性视神经病变
- D. 中心性浆液性视网膜脉络膜病变
- E. 玻璃体积血

【答案】D

27、天行赤眼暴翳病发于眼睛的部位是

- A. 白睛
- B. 黑睛
- C. 白睛和黑睛同时发病
- D. 睑胞和白睛同时发病
- E. 白睛和眦部同时发病

【答案】B

28、治疗凝脂翳属里热炽盛证的主方是

- A. 银翘散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 四顺清凉饮子
- D. 大承气汤
- E. 新制柴连汤

【答案】C

29、正常眼球向前平视时,眼球与眶缘的位置关系是

- A. 与外侧眶缘平行
- B. 在外侧眶缘之后 2——5mm
- C. 突出外侧眶缘 12——14mm
- D. 在外侧眶缘之后 12——14mm
- E. 突出外侧眶缘 2——5mm

【答案】C

30、患者女,28岁,1型糖尿病史10年。双眼视物模糊1个月,裂隙灯下显微镜检查双眼晶状体前后囊下出现雪片状及白点状混浊,间接检眼镜下眼底未见明显异常,诊断

- A. 先天性白内障
- B. 年龄相关性白内障

- C. 糖尿病性白内障
- D. 核性白内障
- E. 以上都不是

【答案】C

31、胞生痰核,痰热蕴结证的主方是

- A. 化坚二陈汤
- B. 三仁汤
- C. 除湿汤
- D. 温胆汤
- E. 除风清脾饮

【答案】D

32、患者,女,58岁,视物模糊,晶体混浊,头晕耳鸣,腰膝酸软,舌红少苔,脉细。宜选下列何方治疗

- A. 杞菊地黄丸
- B. 驱风一字散
- C. 除风益损汤
- D. 泻心汤
- E. 九味羌活汤

【答案】A

33、患者视近清楚,视远模糊,外眼检查未见异常,眼底或可见视网膜呈豹纹状改变,伴面色无华,神疲乏力,舌质淡,苔薄白,脉细弱。其证候为

- A. 气血不足
- B. 气滞血瘀
- C. 风热外袭
- D. 心阳不足
- E. 肝肾不足

【答案】A

34、病久未愈,赤时轻时重,视物不清;黑睛后色素性附着物,黄仁不荣,瞳神不圆;伴头晕耳鸣,腰膝酸软;舌红少苔,脉细。宜选用

- A. 金匱肾气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 加減驻景丸
- E. 以上都不是

【答案】C

35、患眼被剪刀刺伤,剧痛畏光,热泪频流,视力剧降。白睛混赤,黑睛破损,黄仁组织脱出,神水混浊,黄液上冲,舌红苔黄,脉数。证属

- A. 气滞血瘀
- B. 络伤出血

- C. 毒伤健眼
- D. 脓毒侵袭
- E. 阴亏翳留

【答案】D

36、患者,男,28岁,车祸外伤后3个月,视盘色淡近苍白,头痛健忘,舌暗红有瘀点,脉细涩。下列哪一方剂适用

- A. 四物五子丸
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 桃红四物汤
- E. 明目地黄汤

【答案】D

37、《原机启微》“其病隐涩不自在,稍觉眵噪,视物微昏”所描述的“热积必溃之病”是指()

- A. 漏睛
- B. 漏睛疮
- C. 睑弦赤烂
- D. 针眼
- E. 蟹睛

【答案】A

38、患者,青壮年,单眼发病,视物模糊,视物变小变形;黄斑部有圆形渗出灶及出血,血色鲜红;兼见眼部干涩,五心烦热,口千咽燥,心烦失眠,舌红少苔,脉细数,其治法为

- A. 活血化瘀,疏肝行气
- B. 滋阴降火,止血化瘀
- C. 清热解毒,活血通络
- D. 滋肾养阴,凉血润燥
- E. 行气解郁,化瘀止血

【答案】B

39、视瞻昏渺的主要临床表现为

- A. 视物模糊,或眼前暗影,或视物变形.变暗,或视大为小,或视瞻有色或视直为曲
- B. 视物不清或视力骤降,虹视,伴头痛剧烈,畏光流泪
- C. 眼前骤见红花或黑花,或如烟云渐升
- D. 视力急剧下降,部分视野缺损
- E. 初起眼内渗涩,继之患眼刺痛,畏光流泪,视力下降

【答案】A

40、睑弦赤烂,痛痒并作,眵泪胶黏,睫毛成束,宜用

- A. 银翘散
- B. 除湿汤
- C. 导赤散合黄连解毒汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 泻心汤

【答案】 B

41、患者黑睛浑浊, 表面粗糙, 边界模糊, 发展迅速, 伴目赤疼痛, 属于

A. 新翳

B. 宿翳

C. 赤膜

D. 白膜

E. 以上都不是

【答案】 C

42、狭义的内障专指

A. 绿风内障

B. 青风内障

C. 圆翳内障

D. 高风内障

E. 黑风内障

【答案】 C

43、圆翳内障的病因是

A. 外伤

B. 先天

C. 年老

D. 中毒

E. 辐射

【答案】 C

44、双眼频频目眨,不能自主,病属

A. 目劓

B. 目翳

C. 风牵偏视

D. 胞轮振跳

E. 辘轳转关

【答案】 A

45、天行赤眼与西医学哪一疾病相似

A. 沙眼

B. 春季结膜炎

C. 流行性出血性结膜炎

D. 过敏性结膜炎

E. 病毒性角膜炎

【答案】 C

46、《目经大成·阴风障》记载：“大道行不去，可知世界窄，未晚草堂昏，几疑大地黑”，是对()的症状描述

- A. 视衣脱离
- B. 视瞻昏秒
- C. 高风内障
- D. 视衣脱离
- E. 暴盲

【答案】 C

47、突起睛高的病因病机是

- A. 肝郁化火, 攻冲目窍
- B. 风痰上逆, 阻滞脉络
- C. 恣嗜烟酒, 过食肥甘之品而生
- D. 素体阴亏, 阴虚阳亢
- E. 风热邪毒侵袭或邻近病灶毒邪蔓延所致

【答案】 E

48、突起睛高的病因病机是

- A. 肝郁化火, 攻冲目窍
- B. 风痰上逆, 阻滞脉络
- C. 恣嗜烟酒, 过食肥甘之品而生
- D. 素体阴亏, 阴虚阳亢

E. 风热邪毒侵袭或邻近病灶毒邪蔓延所致

【答案】E

49、患者黑睛浑浊,翳与黄仁粘连,瞳神变形不圆,属于

A. 冰瑕翳

B. 云野

C. 厚翳

D. 斑脂翳

E. 以上都不是

【答案】D

50、胞睑振跳,时疏时频,劳累或失眠加重,兼见心烦失眠,怔忡健忘,食少体倦,舌淡苔薄白,脉细弱,宜采用下列何方加减治疗

A. 补中益气汤

B. 当归活血饮

C. 归脾汤

D. 正容汤

E. 逍遥散

【答案】C

51、睑弦赤烂,痛痒并作,眵泪胶黏,睫毛成束,宜用

A. 银翘散

B. 除湿汤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236153104141010050>