

a1 型题

1、尿毒症患者护理措施不包括

- a 饮食清单, 易消化, 优质低蛋白 b 准确记录 24 小时出入液量 c 给予心理支持, 增强治疗信心
d 皮肤瘙痒时用酒精擦洗 e 避免劳累, 预防感染

答案: d

2、张力性气胸首选的治疗方法是

- a 胸腔闭式引流 b 吸氧 c 呼吸机 d 呼吸兴奋剂 e 气管切开 答案: a

3、下列哪种病人可以做胃镜检查

- a 精神失常者 b 严重的血凝障碍者 c 腐蚀性食管炎 d 严重心肺, 肝肺功能不全者 e 上消化道出血 答案: e

4、目前内镜消毒最常用的消毒剂是

- a 2%戊二醛溶液 b 氯巴定 c 食具净 333 d 扎溴铵 e 氧氯灵 答案: a

5、对病毒性心肌炎最有诊断价值的检查是

- a 超声心动图 b 血清病毒中和抗体滴度 c 心音图 d 心电图 e 胸片 答案: b

6、胃镜检查病人的护理下列哪一项是错的

- a 检查前禁食 12h b 检查完后即可进食, 进水 c 腹胀者可进行按摩, 促进排气
d 检查前可皮下注射阿托品 e 检查后当日以流食或易消化半流质为主

答案: b

7、肺性脑病不能用高浓度氧, 主要是为

- a 缺氧不是主要因素 b 会引起氧中毒 c 促进 CO₂ 排出过度
d 能解除缺氧对外周化学感受器的刺激 e 诱发代谢性酸中毒

答案: d

8、肺心病患者呼吸功能锻炼下列哪项是正确的

- a 腹式呼吸 b 缩唇呼吸 c 深而慢呼吸 d 不用胸部辅助呼吸肌参与呼吸 e 以上四点综合运用

答案：e

9、关于肺炎患者痰培养,下列哪种方法正确

- a 晨起深部痰液咳入无菌容器里 b 尽可能在不用抗生素前 c 任何时间的痰均可
d 在两小时内送检 e 可借助雾化吸入导痰

答案：c

10、服毒后最好在几小时内洗胃

- a 12 小时 b 10 小时 c 6 小时 d 8 小时 e 8-10 小时 答案：c

11、护理少尿或无尿病人,最主要的措施是

- a 卧床休息 b 预防感染 c 保证饮食总热量 d 严格控制钾摄入 e 限制蛋白质的摄入 答案：d

12、消化道中毒后洗胃,每次注入洗胃液量最好为

- a 100-150ml b 500-600ml c 1500ml d 200-250ml e 1000ml 答案：d

13、纠正 CO 中毒缺氧的最有效措施是

- a 低流量吸氧 b 输血 c 静脉给普鲁卡因 d 静脉给阿托品 e 高压氧仓 答案：e

14、下列哪项最适合急性肾盂肾炎病人饮食需要

- a 高脂肪,高糖,高维生素饮食 b 高脂肪,高蛋白,高糖饮食 c 高脂肪,高钙饮食,多饮水
d 清单富有营养,多种维生素饮食,多饮水 e 高脂肪,高热量饮食,多饮水

答案：d

15、持续性非窝床腹膜透析患者出现腹膜炎,下列护理措施哪项是错误的

- a 用 1000ml 透析液连续冲洗 3-5 次 b 暂时改做间歇性腹透
c 腹膜透析内加抗生素 d 立即拔管 e 全身应用抗生素

答案：d

16、腹膜透析时出现腹痛,下列处理不恰当的是

- a 给透析液适当加温 b 改用高渗透析液 c 减慢透析液进出速度 d 让病人变换体位 e 及时治疗腹膜炎

答案：b

17、对原因不明的急性中毒,宜取的洗胃液是

a 茶叶水 b 1:5000 的高锰酸钾溶液 c 2%碳酸氢钠 d 温开水、生理盐水 e 2-4%鞣酸 答案: d

18、植入永久性起搏器术后, 护士指导的内容哪项不妥

a 平卧 24 小时, 同时持续 24 小时心电监护 b 体温升高时要告诉护士 c 保持持续吸氧一周

d 手术侧上肢要制动 72 小时 e 术后第四天手术侧上肢要进行功能锻炼

答案: c

19、保护易感人群的主动免疫措施是

a 接种抗毒素 b 接种疫苗, 菌苗, 类毒素 c 加强营养 d 注射丙种球蛋白 e 注射高价免疫球蛋白

答案: b

20、指导伤寒病人卧床休息至什么时候逐渐增加活动量

a 发热后一周 b 热退后第一天 c 热退后两周 d 发热后两周 e 热退后一周 答案: e

21、预防伤寒病关键的环节是

a 控制传染源 b 切断传播途径 c 做好传染病调查 d 提高人群免疫力 e 以上都不是 答案: b

22、成人患急性弥漫型腹膜炎, 并发休克应采取的体位是

a 头低足高卧位 b 去枕平卧 c 侧卧位 d 头低仰卧位 e 半卧位 答案: b

23、防止 t 管引流时, 下列哪种情况说明胆道远端畅通

a 黄疸消退, 引流量增多, 食欲无好转 b 食欲好转, 黄疸消退, 引流量减少

c 上腹胀痛, 引流量突然减少 d 腹痛和黄疸减轻, 引流量增多

e 体温接近正常, 引流量增多, 仍有腹痛

答案: b

24、下肢深静脉畅通功能实验的目的是了解

a 下肢静脉有无曲张 b 交通支瓣膜功能情况 c 大隐静脉瓣膜功能是否正常

d 下肢深静脉有无阻塞 e 下肢深静脉瓣膜功能情况

答案: d

25、颅底骨折脑脊液耳漏, 哪项护理错误

a 保持耳道清洁 b 避免腹压增加 c 将干棉球放置外耳道口 d 禁止腰穿 e 冲洗耳道使之畅通 答案: e

26、腹部损伤行腹腔穿刺,抽得不凝血液,应诊断为

a 空腔脏器破裂 b 实质性脏器破裂 c 误穿入腹腔血管 d 后腹膜血肿 e 前腹壁血肿 答案: b

27 检查肛管直肠疾病最长用的卧位是

a 左侧卧位 b 膝胸卧位 c 截右位 d 右侧卧位 e 蹲位 答案: b

28、临床使用三腔管压迫食道静脉止血,管端应悬的重物应为

a 0;3 公斤 b 1 公斤 c 5 公斤 d 0;5 公斤 e 3 公斤 答案: d

29、颅脑损伤病人的护理措施哪项不正确

a 按 gos 表评估意识 b 监测瞳孔变化 c 有无夏柯氏症出现 d 测生命体征 e 正确使用脱水药 答案: c

30、急性阑尾炎时,最具有诊断意义的体征是

a 腹肌紧张 b 结肠冲气实验阳性 c 阑尾点固定性压痛 d 要大肌实验阳性 e 闭孔肌实验阳性 答案: c

31、判断甲亢治疗效果的标志是

a 情绪变化 b 食欲变化 c 甲状腺大小变化 d 体重变化 e 脉率及脉压变化 答案: e

32、下列哪项是乳腺癌皮肤凹陷的机理

a 乳房皮下淋巴管被癌细胞堵塞 b 癌肿侵犯 cooper 韧带使其收缩

c 癌肿乳管使其收缩 d 癌细胞亲润大片肌肤 e 乳腺血管内有血栓

答案: b

33、终末血尿提示位置在

a 前尿道 b 肾 c 肾盂 d 后尿道或膀胱基底部 e 输尿管 答案: d

34、筋膜室综合症的正确处理是

a 抬高患肢 b 立即切开复位,探索血管 c 拆除外固定 d 密切观察有无肾功能损害 e 彻底切开筋膜见压

答案: e

35、做尿脱落细胞学检查,应收集

a 晨起第一次尿 b 晨起第二次尿 c 收集 12h 尿 d 任何时间的尿均可 e 收集 24h 尿 答案: b

36、肺叶及全肺切除术后,输液速度应为

a 大于 40 滴/分 b 尽可能快 c 没有限制 d 不能超过 40 滴/分 e 尽可能慢 答案: d

37、闭合性骨折石膏固定后最多见的并发症是

a 血管损伤 b 神经损伤 c 骨化性肌炎 d 关节僵硬 e 缺血性肌挛缩 答案: d

38、急性胰腺炎时,淀粉酶下降后又上升,表示

a 病情又有反复 b 胰泡细胞功能恢复 c 发生并发症 d 病人抵抗力增强 e 病情基本得到控制 答案: a

39、阴道转移结节破溃大出血时,护士应采取紧急止血方法不妥的是

a 给予心理护理,减少心情焦虑 b 注意观察病情变化及时测量血压,脉搏
c 立即行阴道添满 d 双手拳压迫腹主动脉 e 建立静脉通道,给予止血药物

答案: d

40、正常产后第三天,乳房涨满而痛,无红肿,伴低热,首先解决的方法是

a 芒硝敷乳房 b 用吸奶器吸奶 c 生麦芽煎汤喝 d 让新生儿多吸允双乳 e 少喝汤水 答案: a

41、下列哪项有促进乳汁分泌的作用

a 早吸吮多吸吮 b 大剂量雌激素制剂 c 多吃水果 d 前列腺素 e 孕激素制剂 答案: a

42、念珠菌性阴道炎最常见易感人群为

a 老年妇女 b 幼女 c 长期应用光谱抗生素患者 d 月经期妇女 e 哺乳期妇女 答案: c

43、产后会阴部护理哪项是错误的

a 会阴部用 1: 5000 高锰酸钾溶剂每天冲洗两次 b 会阴部水肿者,用 50%硫酸镁湿热敷
c 嘱产妇向会阴伤口侧卧位 d 擦洗原则为由上至下由内而外 e 大便后用水清洗保持会阴部清洁

答案: c

44、后穹隆穿刺下列哪项是对的

a 仰卧位用 4 号针头 b 膀胱结石位用九号针头 c 随意卧位,几号针头都可以
d 坐卧位用 5 号针头 e 侧卧位用 12 号针头

答案: b

45、关于塑料尼龙类的节育器消毒,正确的是

A. 75%酒精浸泡 30 分钟 b;95%酒精浸泡 30 分钟 c;经无菌水冲洗后使用 d;煮沸消毒 e;高压灭菌

答案: a

46、母乳喂养时,避免乳头皲裂最主要的措施是:

- a 喂哺前消毒乳头 b 苯甲酸雌二醇涂乳头防皲裂 c 保持正确吸乳姿势
d 喂哺前清洗乳头 e 让新生儿早吸吮多吸吮母乳

答案: c

47、病人被确诊膀胱阴道瘘,漏管开口于阴道壁左侧,请问病人术后最佳卧位是:

- a 仰卧位 b 俯卧位 c 右侧卧位 d 侧卧位 e 左侧卧位 答案: c

48、为中、重度营养不良患儿补液时,哪项不正确:

- a 补液总量应适当减少 b 补液速度稍慢 c 注意补充热量和蛋白质 d 注意补钙、补镁 e 不应补钾

答案: e

49、小儿呼吸系统疾病护理要点哪项不妥:

- a 卧床休息 b 勤翻身拍背吸痰 c 护理操作要集中进行 d 室内通风换气 e 咳喘较重者平卧 答案: e

50、护理青紫型先心病患儿,要保证入量防止脱水,其目的是:

- a 防止心力衰竭 b 防止肾衰 c 防止休克 d 防止血栓栓塞 e 防止便秘 答案: d

51、对白血病患者使用化疗药时,错误的操作是:

- a 化疗药物多静脉给药 b 鞘内用药时应快速给药 c 密切观察化疗药物的毒性反应
d 注射时应确认静脉通畅时方能注入 e 操作时最好带一次性手套

答案: b

52、胰岛素使用时应除外哪一项:

- a 餐前 15-30 分钟注射 b 皮下注射 c 计量准确 d 每次更换注射部位 e 肌肉注射 答案: e

53、格林-巴利综合征瘫痪病人护理措施哪项不正确:

- a 补充营养 b 耐心解释病情 c 保护瘫痪肢体,有利恢复
d 鼓励咳嗽,清除痰液 e 绝对卧床,避免做肢体被动活动

答案: e

54、服用水杨酸制剂时,哪项不正确:

- a 空腹服用 b 出汗时及时更衣 c 必要时加服维生素 k d 防止受凉 e 同时服用氢氧化铝 答案: a

55、下列哪一项对诊断麻疹恢复期最有意义:

- a 发热、流涕、咳嗽 b 结合膜充血、流泪 c 手心、脚心有斑丘疹 d 咽红、口腔粘膜充血
e 皮肤呈麦麸样脱屑, 棕褐色色素沉着

答案: e

56、一位心梗病人心电图监护时发现一提前出现的宽大畸形的 qrs 波群, t 波与 qrs 主波方向相反, 你认为这个 qrs 最可能是:

- a 窦性心律不齐 b 交界区早搏 c 房性早搏 d 室性早搏 e 正常现象 答案: d

57、某幼儿班, 近半个月连续出现 10 余名 3-4 岁幼儿精神不振、食欲不振, 其中 5 名儿童发热、巩膜黄染; 对于患病幼儿, 最正确的处理措施是:

- a 立即疏散该班 b 立即注射甲肝疫苗 c 立即注射甲肝疫苗和丙种球蛋白
d 立即检查肝功能 e 立即注射乙肝疫苗

答案: c

58、男、50 岁、在家用煤气加热器淋浴时出现头晕、头痛、乏力、胸闷、心悸、恶心等症状; 对其进行抢救的首要措施是:

- a 立即将病人搬到室外空气新鲜处 b 吸氧 c 给与止痛药 d 保持呼吸道通畅 e 松解衣服 答案: a

59、男、18 岁、喷洒农药 3 小时后发生头晕、恶心、腹痛、呼吸有蒜味、神志清楚; 患者喷洒时反穿背心短裤, 在清除患者被污染的皮肤时忌用温开水的原因:

- a 防止烫伤患者皮肤 b 防止皮肤血管扩张, 促进毒物吸收
c 抑制呼吸中枢 d 无法清除毒物 e 防止毒物对热发生反应

答案: b

60、王某、冠心病 14 年、因心前区疼痛症状加重就诊, 在诊室门口护士见到该病人突然晕倒、意识丧失、颈动脉搏动消失、呼吸停止、瞳孔扩大; 此时护士应进行哪项抢救措施:

- a 吸氧 b 人工呼吸 c 向胸骨中下 1/3 处捶击 1-2 次 d 心脏按压 e 静脉输液 答案: c

61、男性、40 岁; 饱食后上腹剧痛, 伴恶心、呕吐、腹胀 2 小时; 血淀粉酶 2000 温氏单位、尿淀粉酶 80 温氏单位; 下列哪项不作为重点观察内容:

- a 生命体征 b 腹胀、腹痛、肠鸣音 c 血气分析、血、尿淀粉酶结果 d 呕吐次数 e 尿量、意识

答案: d

62、男性、50 岁; 腹股沟肿块 2 年, 考虑腹股沟直疝和斜疝鉴别诊断最有意义的是:

a 疝块的形状 b 嵌顿的程度 c 包块的位置 d 发病的年龄

e 回纳疝块后压住内环口, 增加腹压后肿块是否在出现

答案: e

63、男性、头部被木棍击伤, x 显示: 颅骨凹陷 0.7cm; 适宜的处置为:

a 立即手术 b 50%葡萄糖注射 c 严密观察病情变化 d 20%甘露醇 125ml 快速点如入 e 垫纱布卷包扎

答案: c

64、男性、30 岁、病毒性肝炎 5 年; 现肝、脾肿大、肝功能损坏, wbc $4 \times 10^9/l$; 为确诊是否为门脉高压, 最有意义的检查是:

a 食道钡餐检查 b 直肠镜检查 c 骨髓检查 d 脐周有无静脉曲张 e 经皮脾静脉造影 答案: a

65、女性、26 岁、右侧卵巢肿物 2 年, 1 小时前突然有下腹剧痛伴恶心、呕吐; 妇科查体: 子宫-、右侧附件有手拳大小的囊性肿物、边界清、活动差、左附件-、旗诊断是:

a 肿瘤破裂 b 右侧附件肿瘤蒂扭转 c 左附件炎性包块 d 肿瘤感染 e 肿瘤恶变 答案: b

66、女、5 岁、浮肿三天伴肉眼血尿, 以急性肾炎住院; 护士应该在饮食方面知道患儿注意:

a 低盐饮食, 1-2g/日 b 可以自由选择自己喜欢的零食 c 高蛋白饮食

d 浮肿消退后可以进食普食 e 限制糖的摄入

答案: a

67、某三岁小儿、急性溃疡性口炎; 下列护理措施中哪项是错误的:

a 3%过氧化氢溶液清洗口腔 b 1%利凡诺溶液清洗口腔 c 西瓜霜粉剂涂患处

d 2%碳酸氢钠溶液清洗口腔 e 1%复方龙胆紫溶液涂口腔

答案: d

68、男、25 岁、结肠息肉住院; 明日行内镜下结肠息肉切除术, 术前准备直接影响疗效的是:

a 术前流质饮食 b 术前消除紧张、恐惧心理 c 术前常规肛门指诊

d 肠道清洁 e 术前是否用镇静药

答案: d

69、男、25 岁、结肠息肉住院; 明日行内镜下结肠息肉切除术; 术前肠道准备哪项是错误的:

a 番泻叶 b 硫酸镁 c 甘露醇 d 蓖麻油 e 乙二醇平衡液 答案: c

70、男、25岁、结肠息肉住院;明日行内镜下结肠息肉切除术;术后饮食应该是:

- a 正规饮食 b 流食三天;少渣饮食一周 c 流食一周
d 流食一天、少渣饮食 2-3 天 e 流食一天后、正常饮食

答案: c

71、男性、25岁、左腰部刺伤入院;bp70/50mmhg、伤口持续溢出淡红色液体、左上腹触痛、但无肌紧张及反跳痛;诊断应首先考虑:

- a 脾破裂 b 胃穿孔 c 肠破裂 d 肾损伤 e 胰腺损伤 答案: d

72、男性、25岁、左腰部刺伤入院;bp70/50mmhg、伤口持续溢出淡红色液体、左上腹触痛、但无肌紧张及反跳痛;为明确诊断首选哪项检查:

- a b超检查 b 伤口溢出液淀粉酶测定 c 钡餐检查 d 钡剂灌肠 e 胃镜检查 答案: a

73、男性、25岁、左腰部刺伤入院;bp70/50mmhg、伤口持续溢出淡红色液体、左上腹触痛、但无肌紧张及反跳痛;该病例处理原则:

- a 非手术治疗 b 再次出现休克时手术探查 c 出现腹膜炎表现时探查
d 立即手术探查 e 出现肉眼血尿时探查

答案: d

74、题目选项 b1 型题

- a、p-r 间期不变、小于秒、无 qrs 群脱落 b、p-r 间期不变、可正常或延长、有 qrs 群脱落
c、p-r 间期大于、无 qrs 群脱落 d、p 波与 qprs 群无关系
e、p-r 间期逐渐延长直至 qrs 群脱落

第 i 度房室传导阻滞时: a b c d e

第 ii 度 i 型房室传导阻滞时: a b c d e

第 ii 度 ii 型房室传导阻滞时: a b c d e

第 iii 度房室传导阻滞时: a b c d e

答案: bced

75、题目选项 b1 型题

- a、1: 5000 高锰酸钾液坐浴 b、禁食、保持胃肠减压通畅 c、肛管排气

d、清洁灌肠、清除肠道粪便 e、洗胃

女性、肛周脓肿切开引流术后第一天：a b c d e

女性、结肠癌术后第一天：a b c d e

女性、结肠癌术前清洁肠道：a b c d e

答案：abd

76、题目选项 b1 型题

a、大网膜不易包裹、穿孔率高 b、麦氏点压痛位置高 c、压痛可以在任何部位

d、症状、体征与病理改变往往不一致 e、阵发性腹痛、间歇期不痛、无局部体征

妊娠中、后期合并阑尾炎时：a b c d e

小儿阑尾炎的特点：a b c d e

老年人阑尾炎：a b c d e

答案：abd

77、题目选项 b1 型题

a、硬肿症患儿体温过低 b、硬肿症患儿有感染危险 c、硬肿症患儿有潜在并发症：肺出血

d、硬肿症患儿营养失调 e、硬肿症患儿知识缺乏

与免疫功能低下有关：a b c d e

与早产寒冷有关：a b c d e

与严重微循环障碍有关：a b c d e

答案：abc

78、三腔二囊管的护理措施哪项是正确的：x 型题

a 插管前仔细检查、确保各管腔通畅 b 经鼻腔插管到胃里、先向食管囊注气、在相胃囊注气

c 出血停止后立即拔管 d 定时抽吸胃管、注意观察出血是否停止 e 气囊压迫一般 3-4 日为限

答案：ade

79、护士在协助医师为一位房颤病人进行电转复治疗时应采取的措施：

a 呼唤病人确定病人已入睡 b 术中用热水袋为病人保暖 c 固定病人四肢以防电极移位

d 放电时提醒医护人员离开病人 e 用干纱布包裹电极以防灼伤皮肤

答案: acde

80、恶性肿瘤 x 线片可见:

a 骨皮质完好 b 阴影清晰 c 无骨膜反应 d 轮廓欠明确 e 边界不明 答案: de

81、对脊柱骨折合并截瘫的病人护理重点:

a 提供心理社会支持 b 多给与生活照顾 c 预防三大并发症

d 满足营养需要、多进纤维多的食物 e 进行下肢被动活动

答案: abcde

82、甲状腺一侧切除后发生窒息的可能源有:

a 出血压迫气管 b 喉头水肿 c 气管塌陷 d 喉返神经损伤 e 喉上神经损伤 答案: ab

83、病人骨折后哪些功能锻炼是正确的:

a 骨折未愈合前不能活动 b 2 周后可扶持下地 c 上后 6-8 周开始全面锻炼

d 早期作患肢肌肉舒缩 e 伤后 2-3 周骨折近侧关节活动为主

答案: cde

84、腹膜炎的患者胃肠减压的目的:

a 减轻腹胀 b 可以从胃管内注入药物 c 有利于胃肠功能的恢复

d 可以从胃管内补充水、电解质 e 避免胃肠液继续外渗

答案: ace

85、围产期保健是指哪期保健:

a 孕期 b 分娩期 c 哺乳期 d 月经期 e 产褥期 答案: abe

86、关于产褥期中暑的治疗、下列哪项是不正确的:

a 立即放置凉爽通风处 b 及时饮大量冷饮 c 及时纠正酸中毒

d 发现瞳孔不等大或频繁抽搐时、应立即给与脱水疗法 e 物理降温、使体温降至肛温 38 度左右

答案: bc

87、孕妇腹部四步触诊可了解:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/23701206310006041>