

## 主治医师考试口腔正畸(习题卷14)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]在"身体发肤，受之父母，不可毁伤"的忠孝观念之下，古代中国人反对尸体解剖，把尸体解剖视为不孝、不仁、不义的不道德行为，甚至是戮尸之罪，要绳之以法。这说明中国传统医学伦理具有( )的局限性。

- A) 受道教天道承负，因果报应思想的影响
- B) 受佛教伦理思想的消极影响
- C) 受到封建伦理糟粕的影响
- D) 受到基督教伦理思想的影响

2. [单选题]去净龋坏组织的临床指标是

- A) 器械的硬度
- B) 洞底的颜色
- C) 窝洞的形状
- D) 洞壁的颜色
- E) 组织的硬度

3. [单选题]易恶变的肿瘤为

- A) 骨纤维结构不良
- B) 纤维骨瘤
- C) 牙骨质母细胞瘤
- D) 化牙骨质纤维瘤
- E) 骨化纤维瘤

4. [单选题]距中线最远的线角是

- A) 近

**殆**

线角

- B) 舌切线角
- C) 远唇线角
- D) 唇切线角
- E) 舌

**殆**

线角

5. [单选题]患者，男，45岁，因右上颌肿物行右上颌骨切除+植皮术，术后所植皮片大部分坏死，遗留较大肉芽创面，准备再行皮肤移植消灭创面。此病例植皮时最好采用

- A) 皮瓣
- B) 全厚皮片
- C) 带真皮下血管网的全厚皮片
- D) 表层皮片

E) 中厚皮片

6. [单选题] 患者，男，5岁，前牙反

𪙇

，后牙近中错

𪙇

，反覆

𪙇

深，反覆盖小，牙齿无松动，. 牙列整齐，不伴拥挤。斜面导板斜面与牙体长轴所呈的角度为

A) 60°

B) 30°

C) 70°

D) 15°

E) 45°

7. [单选题] 下颌运动异常、疼痛、弹响和杂音是

A) 颞下窝肿瘤的主要症状

B) 颞下颌关节紊乱病的主要症状

C) 颞下颌关节炎的主要症状

D) 颞下颌关节强直的主要症状

E) 髁突肿瘤的主要症状

8. [单选题] 牙与口腔颌面部创伤的关系哪种说法是不正确的 ( )

A) 咬合关系错乱是诊断骨折的指标之一

B) 增加感染机会

C) 可作为第二次弹片

D) 牙脱位一定有骨折发生

E) 可利用牙来固定骨折

9. [单选题] 以下哪个囊肿X线检查无改变 ( )



A) 根尖囊肿

B) 正中囊肿

C) 鼻唇囊肿

D) 球上颌囊肿

E) 鼻腭囊肿

10. [单选题] 牙菌斑与龋病的发生以下哪种说法较正确 ( )

A) 牙菌斑多患龋率低

B) 牙菌斑与患龋率无关

C) 牙菌斑少患龋率高

D) 有牙菌斑者就一定患龋

E) 牙菌斑多患龋率高

11. [单选题]与牙周病有关的特殊微生物，证据充分的致病菌是

- A) 齿垢密螺旋体
- B) 变形链球菌
- C) 中间普氏菌
- D) 具核梭杆菌
- E) 福赛坦菌

12. [单选题]提出龋病的酸原学说的学者是

- A) Keyes
- B) Gotfiieb
- C) Miller
- D) Weinn
- E) Sehatz

13. [单选题]患者女性，40岁。右面部开口痛伴开口受限15天，右面部肿胀2天，无牙痛史。检查：右颧弓上方中度压痛，开口度5mm。如下颌角区存在广泛凹陷性水肿，怀疑局部脓肿形成，此时最有效检查方法为

- A) 触诊
- B) X线检查
- C) 实验室检查
- D) 粗针头穿刺
- E) 观察体温变化

14. [单选题]青少年牙周炎临床表现不包括（ ）

- A) 牙石刺激及牙龈炎症明显
- B) 牙齿移位明显
- C) 邻面有较深的牙周袋
- D) 牙齿松动明显
- E) 发病年龄从青春期末至25岁多见

15. [单选题]患者，男，30岁。左颌下肿胀半年，有消长史。触及2cm×2cm大小囊性肿物，有波动感，用力时肿物突入口底，口底黏膜呈淡蓝色。该患者最有可能的诊断是

- A) 囊性水瘤
- B) 皮样囊肿
- C) 鳃裂囊肿
- D) 慢性颌下腺炎
- E) 舌下腺囊肿口外型

16. [单选题]一个生长发育高峰前期的儿童，下颌骨发育不足后缩，上颌发育正常，对该患者应采用下列哪种类型的矫治力

- A) 正畸力
- B) 肌力
- C) 轻度力
- D) 颌内力
- E) 机械力

17. [单选题]呈小管结构，内含造牙本质细胞芽突的为

- A) 牙髓
- B) 牙釉质
- C) 牙周膜

- D) 牙骨质
- E) 牙本质

18. [单选题]患者女性，40岁。右面部开口痛伴开口受限15天，右面部肿胀2天，无牙痛史。检查：右颞弓上方中度压痛，开口度5mm。此患者经治疗后，病情好转，仅有远中牙龈轻度压痛，此时应

- A) 龈切消除盲袋
- B) 局部冲洗上药
- C) 拔除患牙
- D) 口服抗生素继续消炎
- E) 锻炼身体提高抵抗力

19. [单选题]以下何者不是咀嚼周期正常的特征

- A) 自牙尖交错位开口时，运动速度较慢
- B) 轨迹图具有似滴泪水的形态
- C) 闭口运动近咬合接触时，运动速度缓慢
- D) 近最大开口位时运动速度缓慢
- E) 大张口后闭口运动开始，运动速度快

20. [单选题]确定颌位关系包括

- A) 下颌后退记录
- B) 垂直距离和正中关系记录
- C) 垂直距离和颌下前伸颌记录
- D) 定位平面记录
- E) 面下1/3高度记录

21. [单选题]患者因龋坏牙充填后五年出现冷热痛偶有自发钝痛，查：左上6近中邻面充填体，颊侧龈壁可探入，发黑，叩诊(±)，冷热测疼痛。其原因为( )

- A) 充填体的化学性刺激
- B) 充填时没热没垫底
- C) 继发龋
- D) 备洞时操作不当
- E) 充填物早接触

22. [单选题]上颌牙体长轴近远中向倾斜最大的是

- A) 上颌第一双尖牙
- B) 上颌中切牙
- C) 上颌第一磨牙
- D) 上颌侧切牙
- E) 上颌尖牙

23. [单选题]慢性盘状红斑狼疮内不存在

- A) 上皮下结缔组织内有淋巴细胞浸润
- B) 可形成上皮内疱
- C) 棘层萎缩，可见上皮钉突增生伸长
- D) 上皮可见过度角化或不全角化
- E) 胶原纤维可发生类纤维蛋白变性

24. [单选题]牙萌出的时间是指

- A) 切缘或

殆

- 面完全萌出的时间
- B) 牙冠达到咬合的时间
- C) 牙冠出龈的时间
- D) 牙冠完全萌出的时间
- E) 牙冠萌出2/3的时间

25. [单选题]下列不是牙源性角化囊肿易复发的原因 ( )

- A) 囊壁薄
- B) 可能存在子囊
- C) 囊肿内有角化物
- D) 可能存在多发病灶
- E) 同一病灶内有多个囊腔

26. [单选题]关于影响合金与烤瓷结合的因素的说法, 正确的是

- A) 贵金属合金上瓷前需预氧化
- B) 贵金属合金基底冠的厚度为0.2~0.3mm
- C) 机械性的结合力起最大的作用
- D) 金属的熔点要低于烤瓷材料的烧结温度
- E) 合金表面氧化膜的厚度一般小于0.2 μm

27. [单选题]女性, 36岁, 因口腔黏膜起疱、并反复复发一年就诊, 起疱与进食无关, 疱损可破溃形成溃疡。临床检查可见: 下唇内侧黏膜有直径5mm水疱, 探针无法探入疱损周围黏膜下, 涂片未见Tzanck细胞。患者不曾用过任何抗免疫治疗。本病病损的好发部位应是

- A) 颊黏膜
- B) 唇黏膜
- C) 舌黏膜
- D) 牙龈
- E) 口底黏膜

28. [单选题]有关不良习惯与牙周病的关系, 哪项是错误的 ( )

- A) 磨牙症可引起食物嵌塞
- B) 吸烟与牙周病无关
- C) 口呼吸与肥大性龈炎有关
- D) 紧咬牙可增加牙周组织的负荷
- E) 吐舌可致前牙开

## 殆

29. [单选题]改良Widman术的适应症是

- A) 需要牙槽骨成形术者
- B) 牙龈增生
- C) 不需修整牙槽骨者
- D) 需植骨术者
- E) 牙周袋深度超过膜龈联合

30. [单选题]无龋者为 ( )

- A) 30岁中年男性
- B) 出生4个月婴儿
- C) 6岁儿童
- D) 16岁少年
- E) 出生8个月婴儿

31. [单选题]带蒂皮瓣第二次断蒂术，一般应在第一次手术后

- A) 14~18天
- B) 21~30天
- C) 7~14天
- D) 18~21天
- E) 30~40天

32. [单选题]是常染色体显性遗传的疾病 ( )

- A) 青春期牙周炎
- B) 白斑
- C) 色盲
- D) 白皱病
- E) 血友病

33. [单选题]游走性舌炎病损区典型的临床体征是 ( )

- A) 假膜
- B) 水疱
- C) 光滑如镜
- D) 红色斑块
- E) 糜烂

34. [单选题]口腔科放射线检查时，所用的薛氏位X线片是用于

- A) 观察牙列情况的
- B) 观察牙齿根尖情况的
- C) 观察头颅正面情况的
- D) 观察TMJ情况的
- E) 观察头颅侧面情况的

35. [单选题]引起牙齿病理性移位的主要因素是 ( )

- A) 急性牙周膜炎
- B) 女性激素水平的变化
- C) 牙周支持组织的破坏与

## 殆

力的改变

- D) 急性根尖炎
- E) 牙周翻瓣手术

36. [单选题]最易发生恶变的色素痣(见图)是 ( )

- A) 交界痣
- B) 毛痣
- C) 皮内痣
- D) 雀斑样色素痣
- E) 复合痣

37. [单选题]对医师是"仁者"最准确的理解是

- A) 医师应该精通儒学
- B) 医师角色要求道德高尚
- C) 医师应该善于处理人际关系
- D) 仁者爱人，爱病人



E) 医师应该是伦理学家

38. [单选题]邻面去釉矫治一般单侧去除邻面釉质厚度为

- A) 0. 1mm
- B) 1. 5mm
- C) 0. 25mm
- D) 1. 0mm
- E) 0. 5mm

39. [单选题]口外弓每天戴用时间不能低于

- A) 6小时
- B) 12小时
- C) 10小时
- D) 4小时
- E) 8小时

40. [单选题]”医乃仁术”是指( )

- A) 道德是个别医务人员的追求
- B) 道德是医学的个别性质
- C) 道德是医学的非本质要求
- D) 道德是医学活动中的一般现象
- E) 道德是医学的本质特征

41. [单选题]某大医院一位眼科博士，因急于为两位病人进行角膜移植，而又一时找不到现成的供体角膜，所以在太平间“盗取”了一病死者的尸体角膜用于移植，获得成功。此事后被死者家属发现，以未经本人生前及死者家属知情同意，严重损害了死者及其家属的权益为由，将该医生告上了法庭。经调查得知：接受眼角膜移植手术的两位病人与该医师无特殊关系；死者生前与该医师无利害冲突；该医师也未由此谋取分文私利，只是不了解有关要求。该医师的行为出现了动机与目的、手段与效果严重背离的问题，其主观上的根本原因在于( )

- A) 想以此改变人们的陈旧观念
- B) 对医学创新的期望值很高
- C) 想为科室创收作贡献
- D) 对患者知情同意权的无知
- E) 以上都不对

42. [单选题]治疗牙龈炎首选方法 ( )

- A) 选用漱口水，保持口腔卫生

- B) A+B+D
- C) 牙龈切除
- D) 去除牙石
- E) 选用抗生素

43. [单选题]患者下颌6根尖部有一瘻孔，有少许脓汁，扣诊(-)，无龋坏，不松动。下颌8低位阻生，冠周组织轻度红赤不肿。诊断首先应考虑是（）

- A) 下颌6根尖周炎
- B) 下颌8根尖周炎
- C) 下颌7根尖周炎
- D) 下颌8冠周炎
- E) 以上全不是

44. [单选题]多生牙可暂不处理的适应证是

- A) 阻生的多生牙位置较高
- B) 外科手术拔除困难
- C) 不压迫恒牙牙根
- D) 不妨碍恒牙的移动
- E) 以上都包括

45. [单选题]疱疹样口炎的特征是（）



- A) 数目多少，直径大小变化很大，可见明显的局部刺激因素
- B) 多发溃疡可达几十个，直径1~2mm，亦可融合成片，多见于口底、舌腹粘膜
- C) 溃疡单发，病程长，呈潜掘状
- D) 一般1~5个溃疡，直径2~4mm，多发生于唇颊粘膜
- E) 多为单个大溃疡，直径超过1cm，多发于颊，软腭等处

46. [单选题]牙周溢脓首选的漱口水（）

- A) 朵贝氏液
- B) 1%~2%NaHCO

**3**

溶液

- C) 3%双氧水稀释2倍
- D) 金霉素漱口水
- E) 0.1%依沙吡啶液

47. [单选题]以下哪种物质不是成骨细胞合成

- A) 碱性磷酸酶
- B) 骨钙素
- C) I型胶原
- D) 骨桥蛋白



E) 以上都不是

48. [单选题] 患者，女性，30岁，左上后牙自发痛2天。检查左上5松动(+)，叩痛(+)，冷(++)，无龋，近中牙周袋7mm。最合理的治疗方案是 ( )

- A) 松牙固定
- B) 龈上洁治
- C) 根管治疗
- D) 牙髓牙周联合治疗
- E) 龈下刮治

49. [单选题] 患者，男性，39岁，主诉：刷牙出血2年，伴冷、热刺激酸痛，无自发痛，后牙咬合无力。检查：牙石指数为3，牙龈充血肿胀，上、下磨牙牙周袋4~5mm，牙松动I度。其治疗原则应为 ( )

- A) 药物治疗为主
- B) 局部治疗为主
- C) 全身治疗为主
- D) 调整机体防御功能为主
- E) 牙周手术为主

50. [单选题] 乳牙

**𪚩**

时期是指

- A) 4.0~6.0岁
- B) 2.5~6.0岁
- C) 0.5~1.0岁
- D) 2.0~4.0岁
- E) 1.0~2.0岁

51. [单选题] 唇腭裂患者可能的正畸治疗不包括

- A) 正畸正颌外科联合治疗
- B) 固定矫治器治疗
- C) 术前矫形治疗
- D) 前牵引矫形治疗
- E) 乳牙反

**𪚩**

矫治

52. [单选题] 属于舌下区境界的是

- A) 口底黏膜之上
- B) 下颌舌骨肌之上
- C) 颊舌骨肌之上
- D) 前界为颊结节
- E) 后以舌骨体为界

53. [单选题] 决定牙形状的重要牙因素是

- A) 牙囊
- B) 牙乳头
- C) 成釉器
- D) 萌出时间
- E) 牙板

54. [单选题]面神经主要经

- A) 圆孔出颅
- B) 破裂孔出颅
- C) 棘孔出颅
- D) 茎乳孔出颅
- E) 卵圆孔出颅

55. [单选题]最常见的牙龈病是 ( )

- A) 药物性牙龈增生
- B) 缘龈炎
- C) 肥大性龈炎
- D) 青春期龈炎
- E) 妊娠期龈炎

56. [单选题]患者因龋一次治疗后1年，现咬合痛，就诊。检查：右上6近中邻

**殆**

面充填体，近中舌尖劈裂，劈裂块松动，达龈下3mm，叩(+)，牙龈(-)。该牙处理应为 ( )

- A) 拔除患牙
- B) 拔除劈裂部分
- C) 牙髓治疗后全冠修复
- D) 拔除劈裂部分，重新充填
- E) 牙髓治疗

57. [单选题]不能用于鉴别白色水肿与白斑的特征是

- A) 白色水肿边界不清
- B) 白色水肿质地柔软
- C) 白色水肿无上皮角化
- D) 白色水肿棘层细胞肿胀
- E) 白色水肿表面光滑

58. [单选题]Begg矫正技术的原理是

- A) 通过唇档和颊屏改变口周肌肉的动力平衡而影响牙弓颌骨的发育
- B) 差动力和牙齿倾斜移动
- C) 所希望达到的牙齿位置，包括近远中的倾斜，唇舌向倾斜以及内外侧位置都已包含在托槽之内
- D) 使被弯曲矫治弓丝的形变复位
- E) 应用保持性弓丝作用为固定和引导

59. [单选题]对于青春期牙周炎，首先全身治疗药物 ( )

- A) 青霉素
- B) 甲硝唑
- C) 四环素
- D) 朵贝尔含漱液
- E) 牙周宁

60. [单选题]对于大多数II类错

**殆**

，矫正其前牙深覆盖远中磨牙关系的有效方法是

- A) 抑制上颌向前的发育
- B) 近中移动上颌，
- C) 远中移动上颌

- D) 抑制下颌过度发育
- E) 近中移动下颌

61. [单选题]在直丝弓矫正技术中，为防止前牙唇倾与覆

**殆**

加深，常采取的措施是

- A) 使用"丁"形钩
- B) 采取尖牙向后结扎和末端弓丝回弯
- C) 使用双曲唇弓
- D) 使用舌向转矩
- E) 使用口外弓

62. [单选题]口腔白色角化病与白斑最主要的区别是

- A) 前者损害呈灰白色，后者呈白色
- B) 前者病理变化为单纯性的上皮增生，后者则为上皮异常增生
- C) 前者损害大，后者小
- D) 前者病因多为机械性刺激因素，后者则为物理化学因素
- E) 前者质软，后者质硬

63. [单选题]患者，男，2006年大学毕业，同年5月右腿麻木，8月左腿也麻木，9月出现行走困难，11月在当地医院行手术探查为T2、3脊髓血管畸形后关闭。在手术探查伤口愈合期间病情加重，出现胸以下感觉异常，双下肢瘫痪，大小便失禁。2007年2月11号转某大医院诊疗，诊断为T2、3脊髓畸形，神经外科医生叫患者放弃，说做不做都会瘫痪。但患者家属执意要求医生为其孩子做手术。上述病例从伦理学上分析，下述哪一个说法是正确的（）

- A) 医生的做法是错误的，他应尽医生最大的责任给予治疗，将损害减少到最低限度
- B) 医生的说法是正确的
- C) 医生应耐心给家属解释此病的危害，叫患者家属接受事实
- D) 患者家属应听从医生的安排
- E) 以上都不对

64. [单选题]复发性口腔溃疡很少见于（）

- A) 唇
- B) 颊
- C) 舌尖、舌腹、舌缘
- D) 牙龈、硬腭
- E) 软腭、腭雍垂

65. [单选题]血管神经性水肿一般不发生在

- A) 唇
- B) 舌
- C) 上腭
- D) 眼睑
- E) 咽喉部

66. [单选题]口腔颌面部不易早期发现的肿瘤是（）

- A) 腮腺浅叶肿瘤
- B) 舌根部肿瘤
- C) 舌下腺肿瘤
- D) 硬腭肿瘤
- E) 下颌下腺肿瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237065052111006112>