

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能通关题库 (附答案)

单选题（共 40 题）

1、患者，女，27 岁，妊娠 4 个月，因肺结核给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合治疗。为避免胎儿神经毒性，患者应补充

- A. 维生素 C
- B. 维生素 K1
- C. 维生素 B6
- D. 维生素 D
- E. 烟酸

【答案】 C

2、可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

- A. 多沙唑嗪
- B. 奥昔布宁
- C. 非那雄胺
- D. 坦索罗辛
- E. 普适泰

【答案】 C

3、原发性蛛网膜下腔出血的常见病因为()

- A. 脑血管畸形
- B. 高血压性动脉硬化
- C. 颅内动脉瘤

- D. 动脉炎
- E. 颅内肿瘤

【答案】 C

4、患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol/L，餐后血糖11.2mmol/L，糖化血红蛋白8.7%。

- A. 瑞格列奈片
- B. 二甲双胍片
- C. 格列美脲片
- D. 阿卡波糖片
- E. 预混人胰岛素30R注射液

【答案】 D

5、碱化尿液，服药期间需监测尿pH以调整剂量，防止发生尿酸性肾结石的药物是

- A. 枸橼酸氢钾钠
- B. 非布司他
- C. 拉布立酶
- D. 苯溴马隆
- E. 秋水仙碱

【答案】 A

6、患者，女，35岁，因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A. 酚麻美敏片

- B. 萘甲唑啉滴鼻液
- C. 氯苯那敏片
- D. 对乙酰氨基酚片
- E. 奥司他韦胶囊

【答案】 A

7、治疗水疱型足癣宜选用的药物是

- A. 阿昔洛韦软膏
- B. 维 A 酸乳膏
- C. 氢化可的松软膏
- D. 复方苯甲酸酊
- E. 炉甘石洗剂

【答案】 D

8、患者，男，72岁。体重75kg，1小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体：血压210/90mmHg；检查结果示：糖化血红蛋白9.3%，血肌酐 $143.2\mu\text{mol/L}$ 。既往有高血压、糖尿病、心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

- A. 阿司匹林联合氯吡格雷
- B. 阿司匹林
- C. 阿替普酶
- D. 氯吡格雷
- E. 依诺肝素

【答案】 A

9、对中重度痤疮伴感染显著者推荐使用

- A. 0.03%维A酸乳膏剂
- B. 10%过氧苯甲酰凝胶
- C. 0.1%阿达帕林凝胶
- D. 红霉素-过氧苯甲酰凝胶
- E. 维胺酯胶囊

【答案】 C

10、有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

- A. 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据
- B. 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等
- C. 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果
- D. 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见
- E. 尿沉渣结晶检测结果的临床意义不大

【答案】 D

11、治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是：

- A. 有效性
- B. 安全性
- C. 经济型
- D. 依从性
- E. 药品质量

【答案】 D

12、（2019年真题）患者，女，72岁，有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频，尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml，诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A. 复方磺胺甲噁唑片
- B. 莫西沙星片
- C. 阿莫西林胶囊
- D. 阿奇霉素片
- E. 米诺环素片

【答案】 B

13、“根据用药顺序确定最可疑的致病药物，然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”，即可诊断药源性疾病

- A. 致病药物的确定
- B. 流行病学的调查
- C. 询问用药过敏史和家族史
- D. 排除药物以外的因素
- E. 确定用药时间、用药剂量和临床症状发生的关系

【答案】 A

14、用量化的方法表达治疗目的，不以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A. 最小成本分析
- B. 成本-效果分析
- C. 成本-效益分析
- D. 成本-效用分析

E. 最大成本分析

【答案】 B

15、 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括()

A. 严格审核处方

B. 仔细核对药品

C. 进行用药指导

D. 自行修改错误处方

E. 规范操作流程

【答案】 D

16、 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

A. 红霉素

B. 异维 A 酸

C. 克林霉素

D. 过氧甲苯酰

E. 米诺环素

【答案】 B

17、 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

A. 缬沙坦

B. 美托洛尔

C. 非洛地平

- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡维地洛

【答案】 B

18、查询妊娠及哺乳期用药可首选的书籍是

- A. 《新编药理学》
- B. 《药物治疗学》
- C. 《中华人民共和国药典》
- D. 《药物流行病学》
- E. 《注射药物手册》

【答案】 B

19、患者男 50 岁临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是（ ）

- A. 不得随意自行调整氟西汀剂量
- B. 氟西汀应于睡前服用
- C. 不能突然停止服用氟西汀
- D. 服用氟西汀期间不能饮酒
- E. 氟西汀可能引起性功能障碍

【答案】 B

20、若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

- A. 清晨服用

- B. 餐前服用
- C. 餐中服用
- D. 餐后服用
- E. 睡前服用

【答案】 D

21、良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是()

- A. 体位性低血压
- B. 尿潴留
- C. 干咳
- D. 乳腺增生
- E. 前列腺特异性抗原(PSA)水平升高

【答案】 A

22、适用于重症或伴有喉头水肿的荨麻疹患者的治疗药物是

- A. 第一代抗组胺药
- B. 第二代非镇静抗组胺药
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 1: 1000 肾上腺素注射液
- E. 奥马珠单抗

【答案】 C

23、患者，男，26岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A. 1 次
- B. 2 次
- C. 3 次
- D. 4 次
- E. 5 次

【答案】 D

24、可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A. 异丙托溴铵
- B. 孟鲁司特
- C. 沙美特罗
- D. 噻托溴铵
- E. 沙丁胺醇

【答案】 C

25、各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

- A. 稀糊状或水样粪便
- B. 米泔水样便
- C. 黏液便
- D. 冻状便
- E. 细条便

【答案】 A

26、患者，男，70岁，2周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A. 肝素
- B. 氯吡格雷
- C. 阿司匹林
- D. 利伐沙班
- E. 噻氯匹定

【答案】 C

27、慢性肾小球肾炎常见

- A. 白细胞管型
- B. 颗粒管型、透明管型
- C. 细胞管型
- D. 蜡样管型
- E. 脂肪管型

【答案】 B

28、下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

- A. 苯妥英钠
- B. 阿托品
- C. 普鲁卡因胺
- D. 普萘洛尔
- E. 奎尼丁

【答案】 A

29、（2015年真题）患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L（参考范围<7.8mmol/L），甘油三酯1.52mmol/L（参考范围0.56~1.70mmol/L），总胆固醇6.26mmol/L（参考范围<5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L（参考范围2.1~3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇1.20mmol/L（参考范围1.2~1.65mmol/L），肌酐60μmol/L（参考范围45~84μmol/L），蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A. 氢氯噻嗪
- B. 复方利血平
- C. 依那普利
- D. 特拉唑嗪
- E. 螺内酯

【答案】 C

30、以下治疗哮喘疾患的中成药中，不含有麻黄碱成分的是

- A. 止咳定喘膏
- B. 防风通圣丸
- C. 通宣理肺丸
- D. 蛇胆川贝液
- E. 消咳宁片

【答案】 D

31、应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

- A. 卡培他滨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238013031031006064>