

口腔正畸学试题库含参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、方丝弓矫治技术中，上颌中切牙托槽位置的高度为 45mm，其上颌侧切牙托槽的高度应为：

- A、4.5mm
- B、5mm
- C、4mm
- D、5.5mm
- E、3.5mm

正确答案：C

2、标准方丝弓矫正器关闭间隙采用

- A、小圈曲
- B、连续垂直曲
- C、滑动法
- D、弹力结扎
- E、闭合曲

正确答案：E

3、邻面去釉矫治一般去除邻面釉质厚度为：

- A、1mm
- B、0.25mm
- C、1.5mm
- D、0.1mm
- E、0.5mm

正确答案：B

4、可摘局部义齿基托伸展的范围，下列哪项是错误的

- A、上颌远中游离缺失者应伸至翼颌切迹，远中颊角应覆盖上颌结节
- B、缺牙区若骨质缺损应当扩大，若有骨突应适当缩小或作缓冲
- C、下颌远中游离者应覆盖磨牙后垫 $1/3 \sim 1/2$
- D、应与天然牙轴面的倒凹区轻轻接触
- E、缺牙多应适当大些，反之应小些

正确答案：D

5、使用固定矫治器后，牙齿的唇面发现的不规则白斑块，其病理表现不会出现的结构是

- A、透明层

- B、表层
- C、病损体层
- D、细菌倾入层
- E、暗层

正确答案：D

6、下列不属于生物矿化机制的是

- A、集聚
- B、晶核的成长
- C、附着
- D、固相转换
- E、成核

正确答案：C

7、一般在拔牙多久后可制作全口义齿

- A、4个月
- B、一个月
- C、2到3个月
- D、2个月
- E、3到4个月

正确答案：C

8、替牙期暂时性错（牙合）是

- A、多生牙导致上颌左右中切牙萌出早期出现间隙
- B、所有选项都是
- C、恒切牙萌出初期出现轻度拥挤
- D、上侧切牙萌出早期，牙冠近中倾斜
- E、上、下恒切牙萌出早期可出现前牙反（牙合）

正确答案：C

9、前方牵引的力值一般是

- A、500~1000g
- B、300~500g
- C、1200~2000g
- D、150~250g
- E、70~100g

正确答案：A

10、下列哪一项决定牙移动的方式

- A、力偶矩 X 力
- B、力偶矩+力
- C、力
- D、力偶矩/力
- E、力偶矩

正确答案：D

11、颊兜适用于下列哪种情况的保持

- A、深覆牙合
- B、上颌后缩
- C、上颌前突
- D、成年骨性III类患者
- E、严重开牙合及下颌前突矫治后的保持

正确答案：E

12、儿童吮指习惯的诊断性标志是

- A、上颌前突
- B、牙弓狭窄
- C、手指上有胼胝
- D、开唇露齿
- E、后牙反（牙合）

正确答案：C

13、邻面去釉矫治去釉的牙齿一般为：

- A、切牙
- B、切牙+尖牙
- C、切牙+尖牙+前磨牙
- D、切牙+磨牙
- E、切牙+前磨牙+磨牙

正确答案：C

14、乳前牙反殆最佳矫治年龄为

- A、8~9岁
- B、无需矫治，待恒牙期再作矫治
- C、1~2岁
- D、6~7岁
- E、3~5岁

正确答案：E

15、下列哪项分析法是对牙颌面形态结构深度及高度的测量

- A、Wylie 分析法
- B、Steiner 分析法
- C、Downs 分析法
- D、Wits 分析法
- E、Tweed 分析法

正确答案：A

16、安氏Ⅱ类 2 分类错（牙合）下颔的运动方式

- A、自由运动
- B、滑动
- C、滑动加转动
- D、转动
- E、所有选项都不是

正确答案：D

17、多数前牙反牙合指的是

- A、2 个以上前牙反牙合
- B、3 个以上前牙反牙合
- C、5 个以上前牙反牙合
- D、4 个以上前牙反牙合

正确答案：B

18、乳牙期前牙反牙合，下颔前突的矫正年龄一般为

- A、6 岁以上
- B、3-6 岁
- C、0-1 岁
- D、1-2 岁
- E、2-3 岁

正确答案：B

19、乳尖牙的近中和远中出现间隙称

- A、生长间隙
- B、替牙间隙
- C、灵长间隙
- D、必须间隙
- E、可用间隙

正确答案：C

20、如果要求上颌骨逆时针旋转,上牙弓顺时针旋转,下列哪一项是正确的

- A、牵引线需经过上颌骨和上牙弓阻抗中心的同侧
- B、牵引线需经过上颌骨和上牙弓阻抗中心的之间
- C、牵引线斜向上一 37° 牵引
- D、牵引线斜向下一 37° 牵引
- E、牵引线需同时经过上颌骨和上牙弓阻抗中心

正确答案: B

21、确定下颌平面的方法有? 除了

- A、下颌角点与颏顶点间的连线 ($G_0 \sim G_n$)
- B、通过颏下点与下颌角下缘相切的点
- C、所有选项都不对
- D、下颌下缘最低部的切线
- E、下颌角点与颏前点间的连线

正确答案: E

22、前牙反牙合骨骼 I 型其诊断标准是

- A、ANB 角 -5°
- B、ANB 角 2°
- C、ANB 角 5°
- D、ANB 角 $\geq 0^\circ$
- E、ANB 角 0°

正确答案: D

23、1 度深覆牙合是指:

- A、上前牙牙冠覆盖下前牙不足冠 $1/3$ 者
- B、上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠 $1/3$ 而不足 $1/2$ 者
- C、上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠 $1/2$ 而不足 $2/3$ 者
- D、上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠 $2/3$ 者
- E、所有选项都不是

正确答案: B

24、关于正畸牙根吸收,叙述正确的是

- A、成年患者很少发生牙根吸收
- B、下颌牙齿比上颌牙易发生根吸收
- C、牙根吸收与性别无关
- D、儿童患者易发生牙根吸收

E、前牙比后牙更易受累

正确答案：E

25、暂时性错牙合的临床表现是

A、后牙反牙殆

B、上颌侧切牙初萌出时，牙冠向远中倾斜

C、II度深覆牙合，I度深覆盖

D、I度牙列拥挤

E、个别前牙反牙合

正确答案：B

26、牙齿阻萌器去除的标准是

A、牙根形成 1/3

B、所有选项都不对

C、牙根形成 1/2

D、牙冠萌出 1/2

E、牙根形成 2/3

正确答案：C

27、口呼吸会出现的错（牙合），不正确的是

A、下颌后缩

B、牙弓狭窄

C、前牙拥挤

D、腭盖降低

E、前牙前突

正确答案：D

28、下列各项测量属于人体测量法的是

A、将金属钉植入颌骨内，然后结合系列 X 线头颅定位片来研究颌骨生长量和方向

B、在组织切片上观察胚胎颅面部的生长发育特点

C、在 X 线头影侧位片上测量上颌骨的大小和位置

D、利用分规、尺等工具度量面部宽度

E、利用放射性核素作为体内标记物，再用放射线自显影方式显微照相分析骨的生长发育情况

正确答案：D

29、乳牙期矫治适应症

A、上颌左右中切牙萌出早期即出现间隙

- B、恒切牙萌出初期，出现轻度拥挤现象
- C、上下颌第一恒磨牙建牙合初期，可能为尖叉
- D、上颌侧切牙初萌时，牙冠向远中倾斜
- E、前牙反牙合，下颌前突

正确答案：E

30、适用于破除口呼吸、咬唇、允指等不良习惯的矫治器：

- A、Twinblock 矫治器
- B、上颌斜面导板
- C、头帽口外弓肌激动器
- D、Frankel 矫治器
- E、前庭盾

正确答案：E

31、使用口外弓推磨牙向远中时，使用的牵引力每侧

- A、>1000g
- B、120~150g
- C、60~70g
- D、300~500g
- E、600~1000g

正确答案：D

32、面部肌肉建牙合的动力平衡中，与向后的动力有关的肌肉是

- A、上下唇方肌
- B、所有选项都不是
- C、咬肌
- D、颞肌
- E、翼内肌

正确答案：A

33、牙列 I 度拥挤是指牙冠宽度总和与牙弓现有弧形长度之间相差：

- A、4~8mm
- B、所有选项都不是
- C、1.5mm 以上
- D、2~4mm
- E、8mm 以上

正确答案：D

34、何时需要戴用牙齿阻萌器

- A、牙冠萌出不足
- B、正畸治疗需要压低牙齿者
- C、牙冠萌出牙根形成不足 1 / 3 者
- D、牙冠萌出牙根形成不足 1 / 2 者
- E、牙冠未萌出牙根形成不足 1 / 3 者

正确答案：C

35、功能性矫治器，可矫治错牙合类型

- A、替牙期的安氏Ⅲ类错胎
- B、拔牙病例
- C、牙列拥挤
- D、所有选项都不是
- E、个别牙严重错位

正确答案：B

36、牵张成骨术中结束牵张后，在矫正位固定期为

- A、半年
- B、9-12 周
- C、6-8 周
- D、4-5 周
- E、2-3 周

正确答案：C

37、你认为该患者的矫治方案首选的矫治方法为

- A、FRⅢ型功能矫治器矫治
- B、正颌外科
- C、手术矫治
- D、肌激动器功能矫治
- E、方丝弓矫治器固定矫治

正确答案：A

38、下列哪项不是骨性前牙反牙合的临床诊断标准

- A、NB 角 $> 5^\circ$
- B、ANB 角 $< 0^\circ$ (恒牙期)
- C、伴有不同程度的颌骨大小、形态、和位置异常
- D、近中磨牙关系，下颌不能后退至前牙对刃
- E、ANB 角 $< 2^\circ$ (替牙期)

正确答案：A

39、对牙周病破坏最大的不良生活习惯是

- A、酗酒
- B、口呼吸
- C、吸烟
- D、不正确的剔牙
- E、咬硬物

正确答案：C

40、口外矫形力下颌可接受的力值是

- A、800~1100g
- B、500~1000g
- C、1200~1700g
- D、600~700g
- E、340~450g

正确答案：A

41、正畸应用弱支抗时，磨牙前移占去的间隙至少为拔牙间隙的

- A、四分之一
- B、三分之一
- C、二分之一
- D、四分之三
- E、三分之二

正确答案：A

42、方丝弓矫治器最主要的特点是

- A、能有效地控制矫治牙各个方向的移动
- B、价格低易于推广
- C、体积小戴用舒适
- D、操作简单工作效率高
- E、支抗力大

正确答案：A

43、关于开牙合 I 度正确的是：

- A、I 度是上下切牙垂直分开 4cm 以内
- B、I 度是上下切牙垂直分开 5cm 以内
- C、I 度是上下切牙垂直分开 3cm 以内
- D、所有选项都不是
- E、I 度是上下切牙垂直分开 2cm 以内

正确答案：C

44、正畸患者发生附着丧失的几率

- A、10%
- B、30%
- C、40%
- D、50%
- E、20%

正确答案：A

45、上下前牙切端的前后距离超过 3mm 以上者，称为深覆盖，分为三度，III度深覆盖

- A、1~2mm
- B、8mm
- C、0~1mm
- D、3~5mm
- E、5~8mm

正确答案：B

46、II 度深覆牙合是指

- A、上前牙牙冠完全覆盖下前牙牙冠
- B、上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠 2/3 者
- C、上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠 1/2 或 2/3 者
- D、上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠 1/3 而不足 1/2 者
- E、上前牙牙冠覆盖下前牙不足冠 1/3 者

正确答案：C

47、慢性唇炎的临床表现不包括

- A、结痂
- B、水肿
- C、皲裂
- D、脱屑
- E、水疱

正确答案：E

48、乳前牙反（牙合）最佳矫治年龄为

- A、3~5 岁
- B、8~9 岁
- C、无需矫治，待恒牙期再作矫治

D、6~7岁

E、1~2岁

正确答案：A

49、减数矫治前牙拥挤最先不考虑拔除的是

A、尖牙

B、第三磨牙

C、侧切牙

D、第二双尖牙

E、第一双尖牙

正确答案：A

50、颌骨发育正常。该症状是哪个疾病的表现之一

A、中度力

B、间歇力

C、重度力

D、轻力

E、矫形力

正确答案：C

51、用软橡胶或弹性塑料制成，戴在上下颌所有牙齿的冠部，此种保持器是下列哪一种

A、改良 Hawley 保持器 II 型

B、黏固式下前牙固定舌侧保持器

C、颏兜

D、标准的 Hawley 保持器

E、牙齿正位器

正确答案：E

52、在错牙合畸形的检查诊断中，下列哪项不符合

A、要检查上下中切牙间的中线关系

B、无需询问有无全身性疾病及鼻咽部疾病

C、对牙弓检查时要进行牙列拥挤度测定

D、需要进行牙，颌，面的一般检查

E、询问幼年时有无口腔不良习惯

正确答案：B

53、暂时性错（牙合）的临床表现是

A、III度深覆（牙合）、III度深覆盖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238101143060006035>