

2024 年执业药师之西药学综合知识与技能题库与答案

单选题（共 45 题）

1、铁剂在胃肠道吸收的主要特点是

- A. 有自限现象
- B. 黏膜吸收
- C. 与储存量成正比
- D. 有黏膜自限现象
- E. 与摄入量成正比

【答案】 D

2、下列抗感冒药中，归属于处方药的是

- A. 奥司他韦片
- B. 对乙酰氨基酚片
- C. 含伪麻黄碱的复方制剂
- D. 含金刚烷胺的复方制剂
- E. 含右美沙芬的复方制剂

【答案】 A

3、（2017 年真题）治疗水疱型脚癣宜选用（ ）

- A. 阿昔洛韦软膏
- B. 维 A 酸乳膏
- C. 氢化可的松软膏
- D. 复方苯甲酸酞

E. 炉甘石洗剂

【答案】 D

4、“沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

A. 用药监督作用

B. 药物警戒作用

C. 双向交流作用

D. 应对投诉作用

E. 促进自主学习作用

【答案】 C

5、加速已经进入肠道的毒物排泄的方法不包括

A. 洗胃

B. 导泻

C. 洗肠

D. 利尿

E. 血液净化

【答案】 A

6、属于蛋白酶抑制剂的是（ ）

A. 齐多夫定

B. 依非韦伦

C. 利托那韦

D. 利巴韦林

E. 多替拉韦

【答案】 C

7、因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

A. 合并轻度高血压的患者

B. 合并高胆固醇血症的患者

C. 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者

D. 甲状腺切除后的患者

E. 合并骨质疏松症的患者

【答案】 C

8、严重烧伤患者尿常规检查可发现

A. 尿葡萄糖阳性

B. 尿胆红素阳性

C. 尿血红蛋白阳性

D. 尿淀粉酶增高

E. 尿尿酸升高

【答案】 C

9、“简化治疗方案”是提高患者依从性的有效方法，以下方案中最符合此原则的是

A. 少用药的方案

B. 短疗程的方案

C. 注射给药方案

- D. 使用半衰期较长的药物或缓、控释制剂，每日 1 次给药
- E. 给予单剂量的普通包装或一日量的特殊包装的药品

【答案】 D

10、冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林进行治疗，最佳剂量范围是（ ）

- A. 25~50mg / d
- B. 25~75mg / d
- C. 75~150mg / d
- D. 150~300mg / d
- E. 300~500mg / d

【答案】 C

11、能诱导肝药酶 CYP2C19 的药物是

- A. 西咪替丁
- B. 苯妥英钠
- C. 地塞米松
- D. 卡马西平
- E. 奥美拉唑

【答案】 C

12、减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻的是（ ）

- A. 索利那新
- B. 哌唑嗪

C. 特拉唑嗪

D. 度他雄胺

E. 哌仑西平

【答案】 C

13、应用麻醉药利多卡因时宜

A. 不饮酒

B. 少食盐

C. 少食醋

D. 不吸烟

E. 适当多食脂肪类

【答案】 D

14、以下药物中，适宜处置蛇类咬伤的是

A. 凝血酶

B. 糜蛋白酶

C. 胃蛋白酶

D. 胰蛋白酶

E. 菠萝蛋白酶

【答案】 D

15、 $90\text{g/L} \leq \text{Hb}$ 量

A. 基本正常

B. 轻度贫血

- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

【答案】 B

16、某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A. 格列齐特
- B. 阿卡波糖
- C. 二甲双胍
- D. 胰岛素
- E. 西格列汀

【答案】 C

17、患者，女，65岁，52岁绝经，自诉腰痛半年，加重2月，腰椎影像学检查提示腰2和腰3椎体压缩性骨折，骨密度检查提示重度骨质疏松，既往有高血压、高脂血症和系统性红斑狼疮，长期口服缬沙坦80mg aqd，阿托伐他汀20mg qn，阿司匹林10mg qd和泼尼松7.5mg qd。1个月前因反流性食管炎加用奥美拉唑20mg qd。否认不良嗜好，否认食物药物过敏史。

- A. 缬沙坦
- B. 阿司匹林
- C. 阿托伐他汀
- D. 泼尼松
- E. 奥美拉唑

【答案】 D

18、根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性以保证正常起居(避免夜尿过多)的是

- A. 清晨服利尿药
- B. 清晨服抗抑郁药
- C. 清晨服糖皮质激素
- D. 清晨服氨基糖苷类
- E. 清晨服驱虫药

【答案】 A

19、主要降低 TG 兼降低 TC 的药物首选

- A. 氯贝丁酯
- B. 阿昔莫司
- C. 氟伐他汀
- D. 考来烯胺
- E. 海鱼油

【答案】 A

20、春季卡他性结膜炎严重者可选用

- A. 杆菌肽眼膏
- B. 硫酸锌滴眼液
- C. 碘苷滴眼液
- D. 1%泼尼松龙滴眼液
- E. 醋酸可的松

【答案】 D

21、上市前药物临床评价阶段的临床试验分为

A. 1 期

B. 2 期

C. 3 期

D. 4 期

E. 5 期

【答案】 C

22、发热的程度按体温状况分级。“低热”者的体温是

A. 7℃ 以上

B. 1℃ 以上

C. 37.4℃ ~ 38℃

D. 38.1℃ ~ 39℃

E. 39.1℃ ~ 41℃

【答案】 C

23、早期 AD 患者选用

A. 司来吉兰

B. 金刚烷胺

C. 加兰他敏

D. 普拉克索

E. 复方左旋多巴

【答案】 C

24、（2018年真题）过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用（ ）

- A. 色甘酸钠滴眼液
- B. 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C. 玻璃酸钠滴眼液
- D. 氧氟沙星滴眼液
- E. 碘苷滴眼液

【答案】 A

25、苯二氮

- A. 艾司唑仑
- B. 唑吡坦
- C. 阿戈美拉汀
- D. 米氮平
- E. 帕罗西汀

【答案】 A

26、患者，女，60岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已L1~L4椎体T值-2.7SD，BMD749(mg/cm²)；股骨颈T值-2.2SD，BMD602(mg/cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

- A. 钙制剂
- B. 氟制剂
- C. 双膦酸盐

D. 甲状旁腺素

E. 维生素 D

【答案】 C

27、 慢性沙眼患者禁用的药品是

A. 酞丁安滴眼剂

B. 硫酸锌滴眼剂

C. 利福平滴眼剂

D. 醋酸可的松滴眼剂

E. 磺胺醋酰钠滴眼剂

【答案】 D

28、 奥昔布宁用于治疗急迫性尿失禁，其主要不良反应是

A. 眼内压升高

B. 体位性低血压

C. 性功能减退、乳房增大

D. Q-T 间期延长

E. 骨骼肌震颤

【答案】 A

29、 可提示急性肝炎的是

A. A/G 值低于 1

B. γ -谷氨酰转移酶升高

C. 血清碱性磷酸酶升高

- D. 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- E. 天门冬氨酸氨基转移酶升高

【答案】 D

30、药品中的危险品应存放于()，

- A. 专用仓库
- B. 低温库
- C. 常温库
- D. 凉暗库
- E. 阴凉库

【答案】 A

31、心力衰竭的常用药方案是

- A. 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+ACEI
- B. 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+B受体阻断剂
- C. 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+钙通道阻滞剂
- D. 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+强心苷类
- E. 醛固酮受体阻断剂+钙通道阻滞剂+ACEI

【答案】 A

32、某男性，53岁，参加婚礼后5小时突发左脚第一跖趾关节剧痛。3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500\mu\text{mol/L}$ ；足部X线示非特征性软组织肿胀。

- A. 痛风
- B. 假性痛风

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246125213113011004>