

颈动脉内膜剥脱术概述

颈动脉内膜剥脱术是一种常见的外科手术,用于治疗严重的颈动脉狭窄,以减少卒中的风险。该手术涉及去除堆积在动脉内壁的斑块,以改善血液流动。手术后需要密切监测和专业的护理,以确保患者安全恢复。

 by BD RR



手术适应症



症状性颈动脉狭窄

当患者出现短暂性脑缺血发作、脑梗死或眩晕等症状时,颈动脉内膜剥脱术可以有效预防进一步的脑卒中发生。



无症状性颈动脉狭窄

即使患者暂时没有明显症状,如果颈动脉内膜狭窄程度达到一定程度,也可以考虑手术干预,预防未来发生脑卒中。



颈动脉狭窄程度

通常当颈动脉内膜狭窄程度超过70%时,医生会建议患者进行颈动脉内膜剥脱术。

手术禁忌症

1 严重心脑血管疾病

如严重冠心病、心肌梗死、重度高血压、严重心律失常等,可能增加手术并发症风险。

2 不稳定的神经系统疾病

如脑梗死、脑出血等急性期或恶化期的患者,手术时可能诱发神经系统并发症。

3 凝血功能障碍

如血小板减少症、凝血因子缺乏等,增加术中出血及术后并发症的风险。

4 严重肝肾功能障碍

这些患者代谢功能低下,不能良好耐受手术创伤,容易出现并发症。

手术前评估



病史评估

全面了解患者既往病史、手术史、用药情况等,做好手术的风险评估。



体格检查

仔细检查患者的颈动脉状态、心肺功能、四肢血管等,判断手术的可行性。



实验室检查

检查凝血功能、肝肾功能等指标,为手术做好充分准备。

手术前准备

建立病历

详细记录患者的病史、检查结果、诊断依据等信息,为手术前全面评估提供依据。

评估身体状况

评估患者的心肺功能、凝血功能等,并进行相关检查,以确保身体状况适合手术。

做好必要检查

包括血常规、凝血功能、肝肾功能等常规检查,必要时进行心电图、超声等专项检查。

患者教育指导

向患者和家属详细解释手术的目的、过程、并发症等,获得患者的知情同意并做好相关准备。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255310340234011230>