

2023 年-2024 年主治医师之消化内科主治 306 题库 练习试卷 A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、患儿，男性，11 岁。在一次考试中突然将手中钢笔掉在地上，两眼向前瞪视，呼之不应，持续数秒钟。过后对上述情况全无记忆，以后反复有类似发作，有时一日甚至犯数十次。

- A. 癔症
- B. 失神发作
- C. 局限性癫痫
- D. 复杂部分性发作
- E. 肌阵挛发作

【答案】 B

2、类风湿关节炎病情活动相关的辅助检查是()

- A. 类风湿因子
- B. ESR 和 CRP
- C. 抗核抗体
- D. X 线
- E. 血清免疫球蛋白

【答案】 B

3、男性，20 岁。上腹痛 6 个月就诊。与饮食无明显关系，吐酸水，常腹泻，曾有黑粪 2 次，制酸药效果不佳。X 线胃肠钡剂造影(GI)发现胃及十二指肠球部、降部均有溃疡，基础排酸量(BAO)25mmol/L，该病例的诊断为

- A. 多发性溃疡

- B. 复合性溃疡
- C. 胰腺非 B 细胞瘤
- D. 胰腺 B 细胞腺瘤
- E. 复合性溃疡恶变

【答案】 C

4、男性，40 岁。有肝硬化史 4 年，近 2d 来昏睡，但可唤醒，语无伦次，扑翼样震颤(+)，有肝臭。

- A. 继发性醛固酮增多症
- B. 大脑基底节受假性神经递质的干扰
- C. 雌激素增多
- D. 甲基硫醇、二甲基硫化物增多
- E. 黑色素细胞刺激素作用增加

【答案】 D

5、引起肠道缺血的原因一般不包括

- A. 肠道炎症病变
- B. 静脉阻塞
- C. 肠腔内压力增高
- D. 动脉梗死
- E. 低血流状态

【答案】 A

6、原发性肝癌的发生与下列哪种因素最有关

- A. 肠道戊型肝炎病毒感染
- B. 酒精中毒
- C. 肠道细菌感染
- D. 黄曲霉毒素污染
- E. 肠道寄生虫感染

【答案】 D

7、影响慢性肾炎预后最主要的临床因素是

- A. 盐摄入量
- B. 尿蛋白量
- C. 血尿的程度
- D. 水肿的程度
- E. 尿量

【答案】 B

8、青年女性，突然呼吸困难。查体：端坐呼吸，频出冷汗，胸廓饱满，呼吸运动减弱，叩诊过清音，两肺呼吸和吸气双相干鸣音，最可能的诊断为

- A. 肺结核
- B. 肺气肿
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核
- E. 慢性支气管炎并感染

【答案】 C

9、患者男性，58岁，因慢性胃痛10余年而做胃镜检查并取胃黏膜组织送病理，下面哪项病理变化对萎缩性胃炎的诊断最有价值()

- A. 肠上皮化生
- B. 胃腺体减少
- C. 非典型增生
- D. 中性粒细胞浸润
- E. 淋巴细胞浸润

【答案】 B

10、肝性脑病的处理，哪项措施无效

- A. 静滴多巴胺
- B. 醋酸灌肠
- C. 口服新霉素
- D. 限制蛋白质类食物的摄入
- E. 口服乳果糖

【答案】 A

11、上消化道出血伴肝掌、蜘蛛痣、腹水，其出血原因为

- A. 消化性溃疡
- B. 食管胃底静脉曲张破裂
- C. 急性胃黏膜病变
- D. Mallory-weiss 综合征
- E. 胃癌

【答案】 B

12、肝硬化最常见的并发症

- A. 上消化道出血
- B. 肝性脑病
- C. 肝肾综合征
- D. 肝肺综合征
- E. 腹水

【答案】 A

13、Felty 综合征的主要表现是

- A. 过敏性哮喘、嗜酸性粒细胞增多、肉芽肿性血管炎等
- B. 溶血性贫血、血小板减少及急性肾衰竭
- C. 动静脉血栓形成、血小板减少、习惯性流产、血清抗磷脂抗体阳性
- D. 类风湿关节炎伴有脾大、中性粒细胞减少，甚至贫血及血小板减少
- E. 反复口腔溃疡、外阴溃疡、眼虹膜炎、皮肤结节红斑等

【答案】 D

14、属于反射性呕吐的疾病有

- A. 脑出血
- B. 青光眼
- C. 神经性厌食
- D. 癫痫
- E. 高血压脑病

【答案】 B

15、女性，48岁，双腕肿痛1个月，伴晨僵大于5小时，发热半个月。

- A. 类风湿因子(RF)
- B. 抗核抗体谱
- C. C-反应蛋白(CRP)
- D. ESR
- E. C3 和 CH50

【答案】 B

16、男性，28岁。一天前出现发热，恶心呕吐，腹泻7次，伴里急后重。便培养示志贺痢疾杆菌生长。其腹泻的发生机制是

- A. 肠黏膜的吸收面积减少或吸收障碍
- B. 黏膜炎症、溃疡等致血浆、黏液、脓血渗出
- C. 肠蠕动亢进致肠内食糜停留时间少
- D. 胃肠黏膜分泌过多的液体
- E. 肠内容物渗透压增高

【答案】 B

17、穿透性溃疡()

- A. 上腹疼痛多在餐后发生，呕吐多见
- B. 右上腹节律性疼痛，夜间痛和背部痛多见且突出
- C. 多为上腹正中或偏右节律性疼痛
- D. 上腹持续性剧烈疼痛，放射至背部
- E. 多为剑突下正中或偏左节律性疼痛

【答案】 D

18、支原体肺炎特点是

- A. 长期咳嗽，咳大量脓痰，反复出现大咯血
- B. 45 岁以上伴大量长期吸烟史，持续痰中带血
- C. 咳嗽剧烈时，痰中带血
- D. 低热、盗汗、咳鲜血痰
- E. 夜间阵发性呼吸困难伴咳粉红泡沫样痰

【答案】 C

19、女性，45 岁，间歇性发作咽下困难 3 个月，可因情绪波动诱发。食管造影未见异常。

- A. III 级
- B. IV 级
- C. I 级
- D. V 级
- E. II 级

【答案】 A

20、消化性溃疡用质子泵抑制剂治疗，其作用在壁细胞哪一环节

- A. 组胺 H
- B. 胃泌素受体
- C. 泌酸终末步骤关键酶 H
- D. 环氧合酶

【答案】 C

21、胃黏膜分泌盐酸的壁细胞主要分布于

- A. 胃底和贲门
- B. 胃体和胃窦
- C. 胃底和胃体
- D. 胃窦和幽门
- E. 胃底和胃窦

【答案】 C

22、男性，36岁，昨夜饮白酒500ml后出现呕血而来急诊。查体：血压100/60mmHg(13.3/8kPa)，脉搏90次/分，肝脾未及。

- A. 急诊胃镜检查
- B. 血常规
- C. 大便潜血试验
- D. B超检查
- E. 肝功能检查

【答案】 A

23、贫血时病人皮肤及黏膜苍白，较为可靠的检查部位是()

- A. 面颊、皮肤和上腭黏膜
- B. 睑结合膜、指甲及口唇
- C. 耳廓皮肤
- D. 颈部皮肤和舌面

E. 手背皮肤和口腔黏膜

【答案】 B

24、系统性红斑狼疮典型的皮疹是

A. 颊部蝶形红斑

B. 口、眼干燥，猖獗龋齿

C. 雷诺现象

D. Gottron 皮疹

E. 关节肿痛

【答案】 A

25、确定幽门螺杆菌根除的试验应在抗幽门螺杆菌治疗后何时进行

A. 2 周

B. 治疗完成时

C. 6 个月

D. 4 周

E. 3 个月

【答案】 D

26、对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是

A. 血沉及 C 反应蛋白

B. 腹腔镜检查+腹膜活检

C. 结肠镜检查

D. PPD 试验

E. 腹水常规

【答案】 B

27、肝细胞摄取游离胆红素障碍及线粒体内葡萄糖醛酸转移酶不足多见于

A. Gilbert 综合征

B. Dubin-Johnson 综合征

C. Crigler-Najjar

D. Rotor 综合征

E. 无效造血

【答案】 A

28、Crohn 病是()

A. 病因未明的末段回肠和邻近结肠慢性炎症性疾病

B. 病因未明的胃肠道慢性炎症性疾病

C. 病因未明的胃肠道慢性炎性肉芽肿性疾病

D. 末段回肠和结肠慢性炎症性疾病

E. 病因未明的末段回肠慢性炎症性疾病

【答案】 C

29、男性，66岁，反复咳嗽、咳痰30余年，进行性呼吸困难10余年，反复双下肢水肿2年。因咳嗽、咳痰加重3天入院。查体：口唇发绀，颈静脉怒张，球结膜充血水肿，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，呼吸30次/分，双下肺可闻及细湿啰音，双下肢呈可凹性水肿。病理反射未引出。X线胸片示：两肺纹理增重、紊乱，两肺透亮度增高

A. B超示肝被膜不光滑、脾大

- B. 门脉内径增宽
- C. 肝内胆管扩张
- D. 肝内静脉扩张
- E. 肝左叶增生

【答案】 D

30、女性，48岁。1年来反复于进食后上腹部不适，无明显腹痛，无厌油。查体：消瘦，贫血貌，舌炎。化验：HP（+）。

- A. 胃癌的发生率高
- B. 极少数慢性浅表性胃炎可发展为慢性萎缩性胃炎
- C. 可并发消化性溃疡
- D. 一定会癌变
- E. 常合并肠化生

【答案】 D

31、梨形心（ ）

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄

【答案】 D

32、II型呼吸衰竭的诊断，下列正确的是

- A. PaO
- B. PaO
- C. PaO
- D. PaO
- E. PaO

【答案】 B

33、对于结核菌感染腹腔的主要途径下列说法正确的是

- A. 腹腔内的结核病灶直接蔓延
- B. 肺结核血行播散
- C. 肠结核蔓延至腹膜
- D. 腹腔内干酪坏死病灶破溃
- E. 肝结核蔓延至腹膜

【答案】 A

34、工地工人，大约 25 人中午在食堂吃完饭后，发生了头晕、头痛、乏力，口唇青紫，部分人员呼吸困难，到医院就诊，请问最可能的诊断是

- A. CO 中毒
- B. 亚硝酸盐中毒
- C. 酒精中毒
- D. 有机磷中毒
- E. 氨基甲酸酯杀虫剂中毒

【答案】 B

35、关于食管的描述正确的是

- A. 正常吞咽时食管下括约肌松弛时间少于 8 秒
- B. 食管下括约肌长约 4~5cm
- C. 胆囊收缩素(缩胆囊素)可使食管下括约肌压力升高
- D. 食管继发性推进蠕动由吞咽动作引发
- E. 食管下括约肌静息压为 15~35mmHg

【答案】 A

36、有关间质性肺炎的临床特点，以下不正确的是

- A. 有肺泡壁增生和间质水肿
- B. 病变主要在肺间质，可累及支气管壁和周围组织
- C. X 线表现为双下肺条索状阴影，可呈网状
- D. 呼吸道症状重
- E. 可由细菌、病毒、支原体、衣原体及卡氏肺囊虫等引起

【答案】 D

37、肝硬化病人引起肝肾综合征的因素中，下列哪项不正确

- A. 去甲肾上腺素分泌增加
- B. 肾前列腺素合成增加
- C. 白三烯产生增加
- D. 血栓素 A2 增加
- E. 肾素-血管紧张素 II 系统活性增强

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/257035040010010010>