

## 病理学(医学高级)《诊断学基础必看考点》模拟考试卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、多项选择题:溶血性贫血共有的临床表现为( )。A.肝、脾肿大  
B.腰背疼痛  
C.尿胆红素阳性  
D.黄疸  
E.贫血
- 2、多项选择题:右心房肥大的心电图诊断包括( )。A.P波高尖  
B.P波时限0.11s  
C.电轴右偏  
D.P波电压0.25mV  
E.P波电压0.25mV
- 3、单项选择题:过敏性紫癜关节痛描述有误的是( )。A.关节痛伴皮肤紫癜  
B.可伴有消化道出血  
C.可伴有血尿、蛋白尿  
D.血小板计数正常  
E.食物是唯一过敏原
- 4、多项选择题:送检粪便标本下列哪些是正确的( )。A.寄生虫检查应连续3d取标本送检  
B.检查阿米巴滋养体标本应保温送检  
C.无粪便时可灌肠取标本  
D.血吸虫孵化毛蚴标本应不少于10g粪便  
E.隐血试验素食3d后取标本
- 5、单项选择题:精子数量减少一般不见于( )。A.附睾炎  
B.尿道炎  
C.精索静脉曲张  
D.放射线损伤  
E.应用抗肿瘤药物
- 6、单项选择题:某患者腹部局限性膨隆,可因腹内原因(如脏器肿大、腹内肿瘤、炎性包块、胃或肠胀气)和腹壁上肿物等原因,为了进行鉴别.医生常采用下列哪一种方法( )。A.局限性膨隆有无随呼吸而移动  
B.局限性膨隆有无搏动  
C.局限性膨隆有无随体位而移动

- D. 仰卧作屈颈抬肩动作看局限性膨隆变得明显或消失
- E. 尺压试验有无有节奏的跳动
- 7、单项选择题：关于肾功能检测的叙述，下列哪项是正确的（ ）。A. 氯化铵试验检测远端肾单位浓缩功能
- B. 尿 2-MG 是检测近端肾小管受损的灵敏指标
- C. 血清 pH 可准确反映肾小管酸碱平衡功能
- D. 对氨马尿酸盐清除试验反映近端肾小管的排泄功能
- E. 尿比重比尿渗量更能反映肾浓缩功能
- 8、单项选择题：TXB2 减少见于（ ）。
- A. 血栓前状态
- B. 糖尿病
- C. 心肌梗死
- D. 脑血栓形成
- E. 服用阿司匹林类药物
- 9、单项选择题：关于阻塞性脂蛋白 X 的描述错误的是（ ）。A. 正常人血清中也可出现
- B. 存在于 LDL 部分
- C. 其中 40%为白蛋白，60%为载脂蛋白
- D. 在琼脂糖电泳上移向阳极
- E. 阻塞性黄疸患者中出现
- 10、单项选择题：根据中国高血压防治指南的标准，正常血压是指（ ）。A. 血压 120/80mmHg
- B. 血压 130/80mmHg
- C. 血压 130/85mmHg
- D. 血压 135/85mmHg
- E. 血压 140/90mmHg
- 11、单项选择题：不能引起血糖升高的疾病是（ ）。A. 糖尿病
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 肢端肥大症
- D. Cushing 综合征
- E. 胰腺 B 细胞瘤
- 12、单项选择题：夜间咳嗽最常见于（ ）。A. 百日咳
- B. 左心衰竭
- C. 支气管扩张
- D. 支气管肺癌
- E. 支气管结核
- 13、单项选择题：女性患者 38 岁，近 5 年多次于情绪激动或生气后出现四肢抽搐，伴颈后仰，两眼紧闭，过度换气，每次抽搐发作持续数分钟至数小时不等。患者无头外伤史，抽搐发作时未出现过舌咬伤和大小便失禁。神经系统检查无异常，头颅 CT 及脑电图正常。该患者在抽搐发作时不会出现的情况是（ ）。
- A. 双侧瞳孔扩大
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 意识丧失
- D. 手足麻木

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258041104003006066>