

# 2023 年执业药师之西药学专业二通关题库(附带答案)

## 单选题（共 50 题）

1、下列哪项不能提高镇静催眠药用药安全性

- A. 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- B. 镇静催眠药可交替使用
- C. 服用后应避免高速高空作业
- D. 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- E. 使用镇静催眠药后不要饮酒

【答案】 D

2、下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A. 普萘洛尔
- B. 胺碘酮
- C. 美西律
- D. 地尔硫革
- E. 奎尼丁

【答案】 A

3、阿哌沙班属于

- A. 凝血因子 Xa 抑制剂
- B. 维生素 K 拮抗剂
- C. 直接凝血酶抑制剂

- D. 促凝血因子合成药
- E. 磷酸二酯酶抑制剂

【答案】 A

4、（2015年真题）使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（ ）。

- A. 果糖
- B. 氯化钾
- C. 氯化钙
- D. 硫酸镁
- E. 葡萄糖

【答案】 C

5、铜绿假单胞菌性结膜炎常用

- A. 金霉素眼膏
- B. 夫西地酸滴眼剂
- C. 多黏菌素 B 滴眼液
- D. 1%泼尼松滴眼液
- E. 两性霉素 B 滴眼剂

【答案】 C

6、5岁以下儿童首选的散瞳剂是

- A. 10%去氧肾上腺素滴眼剂
- B. 1%硫酸阿托品眼膏剂

- C. 2%后马托品眼膏剂
- D. 四环素可的松眼膏剂
- E. 3%氧氟沙星眼膏剂

【答案】 B

7、用于较严重的频繁干咳，极量一次 100mg 的药物是

- A. 苯丙哌林
- B. 右美沙芬
- C. 可待因
- D. 地塞米松
- E. 溴己新

【答案】 C

8、可诱发和加重哮喘的是

- A. 硝酸甘油
- B. 硝苯地平
- C. 普萘洛尔
- D. 胍乙啶
- E. 洛伐他汀

【答案】 C

9、螺内酯临床常用于( )

- A. 脑水肿
- B. 急性肾衰竭

C. 醛固酮升高引起的水肿

D. 尿崩症

E. 高血压

【答案】 C

10、分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

A. 酚磺乙胺

B. 氨甲环酸

C. 维生素 K1

D. 鱼精蛋白

E. 依达肝素

【答案】 D

11、餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A. 枸橼酸铋钾

B. 米索前列醇

C. 兰索拉唑

D. 铝碳酸镁

E. 泮托拉唑

【答案】 D

12、以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A. 红叶苋菜

- B. 菠菜叶
- C. 洋葱
- D. 脱皮黄瓜
- E. 黄豆

【答案】 D

13、心律失常者慎用的治疗浅表真菌感染的药物是

- A. 制霉菌素
- B. 两性霉素 B
- C. 咪康唑
- D. 益康唑
- E. 克霉唑

【答案】 C

14、患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A. 心律失常
- B. 支气管痉挛
- C. 惊厥
- D. 血压下降
- E. 血糖升高

【答案】 A

15、患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝

肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是( )

- A. 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物
- B. 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- C. 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍
- D. 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- E. 典型不良反应是骨髓功能抑制、脱发、过敏反应

【答案】 D

16、卡托普利的主要降压机制是

- A. 抑制血管紧张素转化酶
- B. 促进前列腺素 I<sub>2</sub> 的合成
- C. 抑制缓激肽的水解
- D. 抑制醛固酮的释放
- E. 抑制内源性阿片肽的水解

【答案】 A

17、患者,男,63岁,2型糖尿病病史20年,现服用二甲双胍0.5g,一日3次,阿卡波糖0.19g,一日3次。罗格列酮4mg,一日1次既往高血压病史5年,冠心病病史5年,心功能I级,轻度肾功能不全,长期服用贝那普利、阿司匹林。患者用药一段时间后出现冠心病加重,夜间憋喘,活动困难,诊断为“冠心病,心功能III级”。此时应停用的药物是( )

- A. 二甲双胍
- B. 阿卡波糖
- C. 贝那普利
- D. 罗格列酮

E. 阿司匹林

【答案】 D

18、小剂量雌激素用于

A. 绝经期综合征

B. 痛经

C. 回奶

D. 再生障碍性贫血

E. 子宫内膜腺癌

【答案】 A

19、复方炔诺酮片的主要避孕作用机制是( )

A. 通过反馈机制抑制排卵

B. 抑制子宫内膜正常增殖，不利于受精卵着床

C. 使宫颈黏液变稠，精子不易进入宫腔

D. 抑制子宫和输卵管活动，改变受精卵的运行速度

E. 抑制卵巢黄体分泌激素

【答案】 A

20、属于长效糖皮质激素的药物是

A. 氢化可的松

B. 醋酸可的松

C. 曲安西龙

D. 地塞米松

E. 泼尼松龙

【答案】 D

21、关于维生素用药时间的说法正确的是

A. 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用

B. 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用

C. 水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用

D. 水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用

E. 无论是水溶性维生素还是脂溶性维生素，餐前、餐后服用都可以

【答案】 D

22、下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是( )

A. 链霉素

B. 异烟肼

C. 利福平

D. 吡嗪酰胺

E. 乙胺丁醇

【答案】 C

23、大剂量使用维生素 K

A. 肝素

B. 维生素

C. 氨甲苯酸

D. 双香豆素

E. 氨甲环酸

【答案】 A

24、不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是( )

A. 氟康唑

B. 卡泊芬净

C. 伏立康唑

D. 两性霉素 B

E. 伊曲康唑

【答案】 A

25、磷霉素最常见的不良反应是

A. 腹部不适

B. 静脉炎

C. 血小板减少

D. 黄疸

E. 发热、寒战

【答案】 A

26、茚地那韦的作用靶点是

A. 神经氨酸酶

B. HIV-1 反转录酶

C. 脱氧核糖核酸聚合酶

D. HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

E. 整合酶

【答案】 D

27、用药过程中需要监护迟发性腹泻的是( )

A. 伊立替康

B. 多柔比星

C. 长春碱类

D. 紫杉醇

E. 他莫昔芬

【答案】 A

28、为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是( )

A. 美司钠

B. 二甲双肌

C. 氯化钾

D. 螺内酯

E. 碳酸氢钠

【答案】 A

29、可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是

A. 西司他丁

B. 亚胺培南

C. 厄他培南

D. 美罗培南

E. 克拉维酸

【答案】 C

30、葡萄球菌引起的感染应选用

A. 夫西地酸

B. 头孢他啶

C. 阿昔洛韦

D. 利福平

E. 妥布霉素

【答案】 A

31、全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是( )

A. 碘苷

B. 金刚烷胺

C. 阿昔洛韦

D. 阿糖腺苷

E. 利巴韦林

【答案】 A

32、可减少神经元囊泡释放乙酰胆碱，使平滑肌或横纹肌暂时麻痹，改善膀胱储尿功能的药物是

A. 奥昔布宁

B. A型肉毒毒素

C. 西地那非

D. 睾酮

E. 普适泰

**【答案】 B**

33、广谱调血脂药物是

A. 烟酸

B. 吉非罗齐

C. 考来烯胺

D. 氯贝丁酯

E. 洛伐他汀

**【答案】 A**

34、（2016年真题）长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是

A. 苯巴比妥

B. 地西洋

C. 唑吡坦

D. 佐匹克隆

E. 阿普唑仑

**【答案】 A**

35、小细胞肺癌化疗首选药是

A. 羟喜树碱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258107103041006055>