



急性脑梗死的护理

急性脑梗死的护理



一.概念

指脑部血液供血障碍、
缺血、缺血引起的脑组织坏
死、软化。

二.症状

1.言语不清

2.肢体功能障碍

3.饮水呛

4.失语

三.病因

1.动脉粥样硬化

2.高血压

3.高血脂

四.各类型脑梗死特殊治疗方法

1.血栓形成性脑梗死:

治疗首选溶栓治疗（发病3—6小时内，无溶栓禁忌症的），首选抗血小板制剂（包括拜阿司匹林肠溶阿司匹林、氯吡格雷）。

四.各类型脑梗死特殊治疗方法

2.栓塞性梗死:

治疗首选抗凝治疗

3.腔隙性梗死:

治疗首选改善红细胞变形能力的药物

五.溶栓治疗

1.静脉溶栓:

对于急性缺血性梗死发病3小时内，无溶栓禁忌者可静脉内使用组织型纤溶酶泵激活剂，0.9%氯化钠100ml+尿激酶100万^u，1小时内滴完。

五.溶栓治疗

治疗后，等一个**24**小时内不得使用抗凝药物或阿司匹林，**24**小时后（**CT**）无显示出血，可行抗血小板和抗凝治疗。

五.溶栓治疗

适应症：

- 1.急性缺血卒中；
- 2.发病3小时内，MRI指导下延长至6小时；
- 3.年龄大于等于18岁。

五.溶栓治疗

禁忌症：

1.绝对禁忌症：

①.迅速好转的卒中以及症状轻微者，

②.病史和体征符合蛛网膜下腔出血，

五.溶栓治疗

③.在过去14天内有大手术、创伤，

④.7天内进行过动脉穿刺，

⑤.治疗前CT检查发现有出血、占位、
肿瘤水肿。

五.溶栓治疗

2.相对禁忌症:

- ①.意识障碍,
- ②.CT显示早期大面积病灶者,
- ③.过去3个月患有卒中或头部外伤,
- ④.血糖小于2.7mmol/L或大于22.2mmol/L,

五.溶栓治疗

- ⑤.卒中发作时有癫痫
- ⑥.以往有脑出血病史
- ⑦.妊娠
- ⑧.心内膜炎、急性心包炎
- ⑨.严重肝肾功能衰竭

五.溶栓治疗

2.溶栓的护理:

- ①.观察言语，肢体功能障碍的恢复情况；
- ②.观察神智：血压、学氧饱和度（观察患者意识情况有无加深有无肢体功能障碍加重，有无血压下降，如果有，提示有出血）；

五.溶栓治疗

- ③.监测神经功能变化和出血征象;
- ④.观察病人用药反应,如患者出现严重的头痛、急性血压增高、恶心、呕吐。应立即停用药物并报告主治医师协助头颅CT检查;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266212035020010134>