

2024年福建宁德市儿童福利院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、G蛋白是（ ）。

- A. 一种钙离子结合蛋白的简称
- B. 一种腺嘌呤核苷酸结合蛋白的简称
- C. 一种鸟嘌呤核苷酸结合蛋白的简称
- D. 一种二酰基甘油结合蛋白的简称
- E. 一种磷脂酶C结合蛋白的简称

【正确答案】

C

【答案解析】

G蛋白是鸟苷酸结合蛋白(guanylatebindingprotein)的简称。

2、下列由T₃、T₄分泌增多直接引起的是（ ）。

- A. 浸润性突眼
- B. 甲状腺肿大
- C. 心率增快
- D. 胫前黏液性水肿
- E. 甲状腺血管杂音

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、脑复苏治疗重点是（ ）。

- A. 促进脑细胞功能恢复
- B. 防治脑水肿
- C. 降低大脑耗氧量
- D. 降低脑细胞能量消耗
- E. 颅内减压

【正确答案】

B

【答案解析】

脑复苏是心肺复苏最后成功的关键。在缺氧状态下，脑血流的自主调节功能丧失，脑血流的维持主要依赖脑灌注压，任何导致颅内压升高或体循环平均动脉压降低的因素均可减低脑灌注压，从而进一步减少脑血流。对昏迷患者应维持正常的或轻微增高的平均动脉压，降低增高的颅内压，以保证良好的脑灌注。

4、母乳中糖、脂肪、蛋白质的比例是（ ）。

- A. 6:3:1
- B. 4:2:1
- C. 2:1:1
- D. 3:2:1
- E. 8:6:2

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、铁剂治疗缺铁性贫血应服用至（ ）。

- A. Hb正常后
- B. 网织红细胞计数达高峰即可
- C. 网织红细胞和Hb达正常水平
- D. Hb达正常水平后2个月左右
- E. 总疗程达1个月时

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、不符合急性脑血管病的病因的是（ ）。

- A. 短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化
- B. 脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化
- C. 脑血栓形成最常见病因是动脉炎
- D. 蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤
- E. 脑栓塞最常见的病因是风湿性心脏病合并房颤的心源性栓子脱落

『正确答案』

C

『答案解析』

脑血栓形成最常见的病因为动脉粥样硬化，如合并糖尿病则更增加了脑血栓形成的危险因素。少见原因是脑血管炎。

7、反复肺部感染造成肺气肿的主要机制是（ ）。

- A. 使 α_1 -抗胰蛋白酶的活性降低
- B. 破坏小支气管壁软骨而失去支架作用
- C. 使细支气管管腔狭窄而形成不完全阻塞
- D. 肺组织供血减少致营养障碍而使肺泡壁弹性减退
- E. 使白细胞和巨噬细胞释放的蛋白分解酶增加而形成肺大疱

『正确答案』

C

『答案解析』

A项，吸入有害气体和有害物质可以导致蛋白酶产生增多或活性增强，而抗蛋白酶产生减少或灭活加快；同时氧化应激、吸烟等危险因素也可以降低抗蛋白酶的活性。先天性 α_1 -抗胰蛋白酶缺乏多见北欧血统的个体。B项，破坏小支气管壁软骨而失去支架作用是形成肺不张的机制。D项，肺泡壁毛细血管受压，肺组织供血减少致营养障碍而使肺泡壁弹性减退是肺气肿病理机制之一，而不是主要机制。E项，白细胞和巨噬细胞释放的蛋白分解酶增加导致组织结构破坏，产生肺气肿，但不是主要机制。主要机制是反复肺部感染多种通过多种机制使细支气管管腔狭窄形成不完全阻塞，气体吸入相对容易，但呼出困难，则造成肺气肿。

8、治疗立克次体感染宜选（ ）。

- A. 磺胺嘧啶
- B. 四环素
- C. 链霉素
- D. 阿奇霉素
- E. 多黏菌素

『正确答案』

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266214110214010052>