

# 公共卫生与预防医学考试题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、损伤性废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：A

2、外科刷手时间每次【单选题】——

- A. 3分钟以上
- B. 1分钟以上
- C. 2分钟以上
- D. 5分钟以上      4分钟以上

【答案】：A

3、手术间通常保持的湿度【单选题】——

- A. 40~60%
- B. 30~50%
- C. 30~40%
- D. 50~60%      40~50%

【答案】：D

4、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
- B. 练习操作,以便从原处倒出
- C. 减少瓶内溶液
- D. 检查液体是否清亮      检查瓶口是否有裂缝

【答案】：A

5、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

- A. 条件致病菌
- B. 细菌
- C. 弓形体
- D. 衣原体 真菌

【答案】：A

6、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员  
300-500 张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】：B

7、根据我国卫生标准回答以下问题:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

8、拟定各级医院感染管理政策【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科

临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：A

9、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

- A. 进行消毒、毁形、进行无害化处理
- B. 经消毒灭菌后重复使用
- C. 集中管理,统一交废品公司回收利用
- D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡,再清洗,然后再进行灭菌处理

【答案】：A

10、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医院填报病例
- C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中查找病例

【答案】：C

11、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

12、下列概念中不正确的是:【单选题】——

- A. 医院感染散发是指医院感染在某医院或某地区住院患者中历年的一般发病率水平
- B. 医院感染的流行趋势是指医院感染持续流行
- C.

医院感染发病率是指一定时间内住院患者中发生医院感染新发病例的频率

D. 医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中,短时间内、突然发生许多医院感染病例的现象

【答案】： B

13、一般病室、办公室、治疗室、换药室、走廊等使用的拖把【单选题】——

- A. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
- B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

【答案】： E

14、根据我国卫生标准回答以下问题:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： B

15、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】——

- A. 全身预防性抗生素的使用
- B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗

- C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流
- D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管

每天灭菌剂清洁会阴

【答案】：C

16、层流洁净室【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：A

17、烧伤病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

18、组织实施国家有关政策法规【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：B

19、医院感染监测系统必须符合的标准不正确的是【单选题】——

- A. 将成本和工作量减到最低程度,通过及时反馈促进各科室参与监测
- B. 灵活,按条件允许适时改变
- C.

易于接受

D. 采用统一的诊断标准和监测方法 普遍适应

【答案】：E

20、需要采取严密隔离的疾病是【单选题】——

A. 乙型肝炎

B. 艾滋病

C. 鼠咬热

D. 肺鼠疫

【答案】：D

21、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离

B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计

C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房

D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离  
患者禁止走出病房

【答案】：A

22、根据我国卫生标准回答以下问题:对医院发生的医院内感染流行、  
暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】  
——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

23、血液-体液隔离应用的标志是【单选题】——

A. 红色标志

B. 棕色标志

C. 黄色标志

D. 绿色标志 灰色标志

**【答案】**： A

24、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

【答案】：E

25、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 3 倍
- D. 4 倍 5 倍

【答案】：B

26、下列概念中哪项是错误的【单选题】——

- A. 全面综合性监测可获得医院感染本底感染率
- B. 目标性监测是将有限的人力、财力用于解决医院感染的关键问题
- C. 医院感染与传染病相同的是培养出细菌即能确诊
- D. 医院感染的现患率高于同期的感染发生率 医院感染漏报率的调查目的是对感染率监测质量的评估

【答案】：C

27、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

- A. 脑室镜
- B. 胸腔镜
- C. 腹腔镜
- D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】：E

28、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

29、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器,盛用消毒液
- B. 大口容器,底部垫纱布
- C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】：A

30、治疗室的管理中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶不能超过24小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在4小时内使用
- D. 碘酒、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并灭菌容器1~2次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不能超过48小时

【答案】：E

31、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B. 辐射灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

32、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A.

把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用

- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】： B

33、生活垃圾【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： D

34、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

- A. 病原携带者
- B. 血液制品
- C. 食品
- D. 动物 各种病人

【答案】： E

35、三级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$
- B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： B

36、传染病房每间病室的病人数不应超过【单选题】——

- A. 6人
- B. 5人
- C. 4人

D. 3人 2人

【答案】：C

37、MRSA 感染的最佳选药【单选题】——

- A. 去甲万古霉素、万古霉素
- B. 头孢唑林
- C. 氧氟沙星
- D. 磷霉素 阿米卡星

【答案】：A

38、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒
- C. 戊型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

39、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

40、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊
- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】：C

41、合胞体病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C.

两者均是

D. 两者均不是

【答案】：B

42、ICU 的医院感染管理措施错误的是【单选题】——

A. 探视者进入 ICU 应更衣、换鞋

B. 工作人员进入 ICU 要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手

C. ICU 应布局合理,分治疗室(区)和监护区

D. 病人的安置应感染病人与非感染病人分开,特殊感染病人单独安置 监护区每床使用面积不少于 9.5m<sup>2</sup>

【答案】：A

43、护理传染病病人,在离开传染病房时要按照要求刷手。正确的刷手顺序是【单选题】——

A. 手掌.腕部.手指.指甲.指缝.手背

B. 腕部.前臂.手掌.手背.手指.指甲

C. 前臂.腕部.指甲.指缝.手指.手背.手掌

D. 手指.指甲.指缝.手背.手掌.腕部.前臂 前臂.腕部.手背.手掌.手指.指缝.指甲

【答案】：E

44、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行

B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送

C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度

D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗 对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】：E

45、同一病房内住有伤寒与痢疾患者,3 周后伤寒患者的大便培养出痢疾杆菌,其属【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B.

病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病

- C. 病原体来源于病人本身的感染
- D. 病人之间引起的交叉感染 同时患伤寒和痢疾

【答案】：D

46、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

47、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过24小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要4小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌1~2次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过48小时

【答案】：E

48、对芽孢无效的化学消毒剂是【单选题】——

- A. 0.5%过氧乙酸溶液
- B. 环氧乙烷
- C. 40%甲醛溶液
- D. 2%戊二醛溶液 70%乙醇溶液

【答案】：E

49、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区
- B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV等标记物检查
- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D.

每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】： C

50、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B. 48h
- C. 24h
- D. 12h 4h

【答案】： D

51、病室内住有百日咳病人,已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

- A. 7ml
- B. 6ml
- C. 12ml
- D. 15ml 5ml

【答案】： A

52、根据我国卫生标准回答以下问题:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： A

53、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B.

保护性隔离

- C. 全身使用广谱抗生素
- D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】：C

54、消毒药械管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 根据消毒的目的选用消毒药械
- B. 同一消毒剂消毒不同物品应有同一浓度
- C. 加强消毒效能监测
- D. 防止使用中的消毒剂再污染 注意影响消毒效果的因素

【答案】：B

55、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

- A. 更改浸泡用药液
- B. 重新洗手
- C. 延长浸泡时间
- D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】：B

56、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是

【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间 抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】：E

57、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌

细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

【答案】：C

58、下述不符合环境卫生学标准的是【单选题】——

- A. 层流洁净手术室物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 普通手术室空气细菌数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$
- C. 治疗室医务人员手细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 传染病房物体表面细菌数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  婴儿室空气细菌数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$

【答案】：B

59、和破损皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌的组织内的器材适用于下列哪种方式消毒【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用物理灭菌方法

【答案】：C

60、下述不属于灭菌剂是【单选题】——

- A. 20%戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 环氧乙烷
- D. 甲醛 含氯消毒剂

【答案】：E

61、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：D

62、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是【单选题】

——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸气灭菌法

【答案】：E

63、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

- A. 部分医院感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 滥用抗感染药物可致二重感染

【答案】：C

64、医院内感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院内感染高危科室高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院内感染高危因素监测
- D. 医院内感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

65、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

66、关于输血科预防医院内感染的措施,下列哪项是错误的【单选题】

- A. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
- D. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】: B

67、关于医院感染的概念正确的是【单选题】

- A. 与上次住院有关的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染
- D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】: B

68、WHO认为医院监测的最终目标是【单选题】

- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
- B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
- C. 建立医院的医院感染发病率基线
- D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】: A

69、下述各项中错误的是【单选题】

- A. 小儿呼吸道感染不需要隔离
- B. 医院污物应分类收集、分别处理,以防止污染扩散
- C. 大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离
- D. 洗手是预防医院感染的重要措施 传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

【答案】: A

70、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——  
A.

35 分钟

- B. 25 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟 20 分钟

【答案】：D

71、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

- A. 制定本科室医院感染管理规章制度
- B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施
- C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告
- D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验 监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

72、脱隔离衣的正确步骤是【单选题】——

- A. 解腰带.刷手.解领扣.解袖扣.脱去隔离衣
- B. 松腰带.解袖扣.刷手.解领扣.系腰带.脱去隔离衣
- C. 松腰带.系腰带.解袖扣.刷手.解领扣.脱去隔离衣
- D. 解袖扣.刷手.解领扣.解腰带.脱去隔离衣 刷手.解腰带.解袖扣.解领扣.脱去隔离衣

【答案】：C

73、支气管镜采用 2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

- A. 120min
- B. 60min
- C. 30min
- D. 20min 10min

【答案】：D

74、手术部位感染的常见诱因【单选题】——

A. 留置导尿管

B.

气管切开

- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

75、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

76、下述哪项不属于微生物【单选题】——

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 细菌
- D. 衣原体 钩虫

【答案】：E

77、需要采取肠道隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B. 艾滋病
- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：E

78、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

- A. 寄居部位的改变
- B. 宿主的局部或全身免疫功能下降
- C. 菌群失调和二重感染
- D. 通过空气或水源的感染

潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】: D

79、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是【单选题】——

- A. 环氧乙烷
- B. 70%乙醇溶液
- C. 0.2%过氧乙酸溶液
- D. 2%戊二醛溶液 0.5%碘伏

【答案】: D

80、输液反应中属于医院内感染的是【单选题】——

- A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- B. 由于液体被细菌污染引起的发热
- C. 由于输注液体中的药物引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输注的液体中含有热源物质引起的发热

【答案】: B

81、根据我国卫生标准回答以下问题:监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: E

82、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低

在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

83、下列监测的控制指标中,哪项是错误的【单选题】——

- A. 凡经消毒的物品不能检出任何微生物
- B. 手术室医务人员手上带菌数应少于 5 个/cm<sup>2</sup>
- C. 新生儿室、儿科病室的物体表面不得检出沙门菌
- D. 手术室、产房、新生儿室空气中含菌量应少于 200 个/m<sup>3</sup> 紫外线消毒灯管在使用中的功率应大于 70 μW/cm<sup>2</sup>

【答案】：A

84、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋
- D. 病室每天消毒 1 次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】：A

85、下列情况不是医院感染【单选题】——

- A. 病人发生的感染是上次住院期间获得的
- B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生的感染
- C. 在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)
- D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院 48 小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】：E

86、传染病房两病床之间的距离应【单选题】——

- A.  $\geq 2.0\text{m}$
- B.  $\geq 1.5\text{m}$
- C.

≥1.2m

D.        ≥1.1m        ≥1.0m

【答案】：D

87、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

A. 4h

B. 6h

C. 8h

D. 5h 7h

【答案】：A

88、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

A. 手

B. 饮水

C. 食品

D. 医疗器械 衣物

【答案】：A

89、生活垃圾为【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

90、李某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。他要将自己的病情告知外地的家人,他的信件应该怎样处理后方可寄出【单选题】——

A. 含氯消毒液喷雾

B. 甲醛熏蒸柜熏蒸

C. 紫外线照射

D. 过氧乙酸擦拭 高压蒸汽灭菌

【答案】：B

91、高效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

92、根据我国卫生标准回答以下问题：根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求，对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

93、轮状病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：A

94、外科刷手法刷手顺序【单选题】——

- A. 手掌，指尖，甲缘，指间，腕部，前臂，肘部刷手至肘上
- B. 甲缘，指尖，指间，手掌，腕部，前臂，肘部，刷手至肘上
- C. 指间，指尖，甲缘，手掌，腕部，前臂，肘部刷手至肘上
- D. 指尖，甲缘，指间，手掌，腕部，前臂，肘部，刷手至肘上 腕部，前臂，肘部，肘上，指间，指尖，甲缘，刷手至肘上

【答案】：D

95、我国艾滋病最常见的传播途径是【单选题】——

- A.

输血和血制品

- B. 静脉注射毒品
- C. 母婴垂直传播
- D. 性传播 儿童疫苗注射

【答案】： B

96、下列哪项不属医院感染【单选题】——

- A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎
- B. 入院 72 小时后发生的肺炎
- C. 无症状导管菌尿症
- D. 烧伤 6 小时入院的创面感染 产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】： A

97、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

- A. 血液
- B. 体液
- C. 汗液
- D. 排泄物 分泌物

【答案】： C

98、下列内镜需灭菌,但除外【单选题】——

- A. 纤维支气管镜
- B. 腹腔镜
- C. 脑室镜
- D. 关节镜 胸腔镜

【答案】： A

99、医院内尿路感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：A

100、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

- A. 经消化道传播
- B. 接触传播
- C. 经呼吸道飞沫传播
- D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】：C

101、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理.化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中.低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

102、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A.  $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- B.  $\leq 10\text{cfu/cm}^2$
- C.  $\leq 15\text{cfu/cm}^2$
- D.  $\leq 200\text{cfu/cm}^2$   $\leq 500\text{cfu/cm}^2$

【答案】：A

103、发生医院内尿路感染最常见的诱因是【单选题】——

- A. 长期卧床
- B. 留置导尿管
- C. 膀胱冲洗
- D. 膀胱内注药 膀胱镜检查

【答案】：B

104、《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》是卫生部于哪年制定的【单选题】——

- A.

2002 年

- B. 2003 年
- C. 2004 年
- D. 2005 年 2001 年

【答案】： C

105、腹部手术铺单原则【单选题】——

- A. 先上后下,先远后近
- B. 以上都不是
- C. 先上后下,先近后远
- D. 先下后上,先远后近 先下后上,先近后远

【答案】： D

106、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
- B. 工作人员装束和手术室的无菌操作
- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】： E

107、不属于高度危险物品的是【单选题】——

- A. 腹腔镜
- B. 导尿管
- C. 体温表
- D. 穿刺针 手术器材

【答案】： C

108、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C.

氯己定

D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

109、低效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：C

110、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

A. 消毒温度为  $65\sim 75^{\circ}\text{C}$ ,作用时间  $10\sim 15\text{min}$

B. 消毒温度为  $70\sim 80^{\circ}\text{C}$ ,作用时间  $5\sim 8\text{min}$

C. 消毒温度为  $45\sim 55^{\circ}\text{C}$ ,作用时间  $20\sim 25\text{min}$

D. 消毒温度为  $85\sim 95^{\circ}\text{C}$ ,作用时间  $10\sim 15\text{min}$

消毒温度为

$62^{\circ}\text{C}$ ,作用时间  $30\text{min}$

【答案】：E

111、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

A. 过氧乙酸

B. 乙醇

C. 苯扎溴铵

D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

112、紫外线辐射强度为多少时更换紫外线灯管【单选题】——

A.  $\approx 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

B.  $= 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

C.  $< 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

D.  $\geq 70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

【答案】：C

113、抗菌药物应用中,下列哪项属错误【单选题】——

- A. 病毒感染不用抗菌药物
- B. 疑为细菌感染,应先送培养标本而后经验性选药
- C. 培养结果出来,根据其药敏结果调整药物
- D. 当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物 一般感染抗菌药物用至症状体征消失后 3~4 天

【答案】： D

114、根据我国卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： A

115、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染 以上都不是

【答案】： D

116、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

【答案】： D

117、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定
- B. 挂号、候诊与普通门诊分开
- C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离
- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】：C

118、根据我国卫生标准回答：监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程，合理应用抗感染药，实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

119、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C. 磺胺嘧啶
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：B

120、一次性使用的注射器使用后正确的做法是【单选题】——

- A. 直接放入耐刺、防渗漏的利器盒
- B. 使用后的一次性针头应重新套上针头套
- C. 使用用手直接分离针头
- D. 使用后先浸泡再用手直接分离针头 使用后的针头连同注射器丢入医用垃圾桶内处理

【答案】：A

121、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

122、关于医院感染的概念错误的是：【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

123、III类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 200$ cfu/m<sup>3</sup>,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 10$ cfu/m<sup>3</sup>,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 500$ cfu/m<sup>3</sup>,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 400$ cfu/m<sup>3</sup>,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 300$ cfu/m<sup>3</sup>,未检出致病菌

【答案】：C

124、传染科病房属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：D

125、SARS 最主要的传染源是【单选题】——

- A. SARS 患者
- B.

SARS 病毒携带者

- C. SARS 感染的动物
- D. 携带 SARS 的动物 污染的环境

【答案】：A

126、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

127、超广谱酶(ESBLs)菌株所致感染的最佳选药是【单选题】——

- A. 头孢西丁
- B. 阿莫西林
- C. 哌拉西林
- D. 头孢噻肟 氨曲南

【答案】：A

128、下列情况属于医院感染【单选题】——

- A. 住院中由于治疗措施而激活的感染
- B. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者
- D. 由于输注苏打外渗引起的局部炎症 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症

【答案】：A

129、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

- A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

C.

先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净

D. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用  
拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】： A

130、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 讲究个人卫生
- B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者
- C. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩
- D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】： E

131、铺好的无菌盘,在无污染情况下的有效时间是【单选题】——

- A. 6h
- B. 24h
- C. 4h
- D. 12h 2h

【答案】： C

132、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

133、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/267036153201006105>