

外科护理模拟考试题库含答案

1. 当病人输入大量库存血后容易出现 ()
 - A. 低血钾
 - B. 低血钙(正确答案)
 - C. 低血钠
 - D. 高血钠
 - E. 高血钾
2. 对高渗性脱水病人执行输液治疗时，应首先输入 ()
 - A. 等渗盐水
 - B. 平衡盐溶液(正确答案)
 - C. 5%葡萄糖溶液
 - D. 右旋糖酐
 - E. 林格液
3. 鲁先生，急性肾衰竭。测定其血清钾为 6. 5mmol / L，出现心律不齐，应首先采取的措施是 ()
 - A. 乳酸钠静脉滴注
 - B. 苯丙酸诺龙肌内注射
 - C. 高渗葡萄糖及胰岛素静脉滴注
 - D. 50g，碳酸氢钠静脉滴注
 - E. 10%葡萄糖酸钙静脉滴注(正确答案)
4. 某男性患者，53岁，体重 65kg。平素身体健康，因反复呕吐 3d 入院。测得血钠 129mmol / L，血钾 3. 2mmol / L. 影响该患者体液失衡类型最重要的因素是 ()
 - A. 呕吐间歇时间
 - B. 呕吐 液体总量(正确答案)
 - C. 本病发病以来个人饮水及是否治疗的情况

D. 血钾

E. 心脏功能状况及心电图表现

5. 王先生，55岁，全麻术后未清醒，突然出现鼾声，是何问题

A. 呼吸道被痰堵塞(正确答案)

B. 舌后坠

C. 喉痉挛

D. 即将醒来

E. 以上都不是

6. 某男，45岁，开车上班突遇车祸，心跳停止。现场有目击者对此患者进行心肺复苏，人工呼吸与心脏按压的比例应为

A. 2: 5~2: 7(正确答案)

B. 2: 15

C. 1: 5

D 2: 30

E 30: 2

7. 患者，男性，30岁。应车祸致“脾破裂”急诊手术。入手术室时，神志清，T 37.2'12, ' 94 / min, BP 96 / 60mmHg，硬膜外麻醉成功后，突然出现意识丧失，面色苍白，口唇四肢严重发绀，脉搏、心音、血压均测不出，血氧饱和度下降至20%。该患者可能发生了以下哪种情况（）

A. 心脏骤停(正确答案)

B. 面色苍白

C. 心源性休克

D. 呼吸衰竭

E. 窒息

8. 软组织化脓性感染，下列哪一种有接触性传染，应隔离

A. 疥(正确答案)

B. 痰

C. 急性蜂窝织炎

D. 丹毒

E. 急性淋巴管炎和淋巴结炎

9. 男性，23岁，右足被铁打扎伤20d，10d前开始出现牙关紧闭，苦笑面容，角弓反张，但神志清楚，3d前开始出现高热39.5℃，考虑患者并发了

A. 脓毒症(正确答案)

B. 破伤风

C. 腹膜炎

D. 胸膜炎

E. 肺结核

10. 某男性患者，34岁，劳动时不慎刺破左手中指，未引起重视，3d后出现患肢肿胀、发红，剧痛，手下垂时疼痛加剧，今天出现发热、全身不适。血常规检查，白细胞计数增高。该患者可能是()

A. 蜂窝组织炎

B. 淋巴管炎

C. 脓性指头炎(正确答案)

D. 脓肿

E. 静脉炎

11. 某男性患者，34岁，劳动时不慎刺破左手中指，未引起重视，3d后出现患肢肿胀、发红，剧痛，手下垂时疼痛加剧，今天出现发热、全身不适。血常规检查，白细胞计数增高最佳护理措施是()

A. 局部热敷

B. 切开引流(正确答案)

C. 服抗生素

D. 静脉输注抗生素

E. 理疗

12. 王某，严重挤压伤患者，护理时除严密观察生命体征外，还应特别注意()

A. 意识状态

- B. 肢端温度
- C. 局部疼痛情况
- D. 尿量(正确答案)
- E. 末梢循环情况

13. 王某，男性，28岁。跑步时不慎将右踝关节扭伤，2h来医院就诊，局部青紫、肿胀明显。此时你该如何处理（）

- A. 局部用热水湿敷
- B. 局部用冷水湿敷(正确答案)
- C. 给予红外理疗薯
- D. 局部按摩
- E. 冷热交替湿敷

14. 王某，56岁，患晚期肝癌，近来病情发展迅速，肝区剧烈疼痛，腹水，呼吸困难。患者感到痛苦、悲哀，有轻生念头，此心理反应属于

- A. 否认期(正确答案)
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接受期

15. 患者，女性，36岁。甲亢术后24h，出现体温39.5℃，脉搏120/mJn，烦躁、大汗、呕吐、心悸、水泻，诊断为甲状腺危象。其发生的主要原因是（）

- A. 手术时过多挤压甲状腺
- B. 术前准备未达要求(正确答案)
- C. 切除腺体过多
- D. 切除腺体不足
- E. 手术中过度紧张

16. 孟女士，32岁，近期出现食欲亢进，每餐进食4~5两，餐后不久又感饥饿，伴体重下降、睡眠差、情绪易激动等。体检：颈部增粗，双侧甲状腺弥漫性肿

大，质软、无结节、无压痛，脉搏 100 次/min，体温 37.5°C，BMR+46%，甲状腺摄碘 I 率，2h，40%，诊断为甲状腺功能亢进症。诊断甲亢，下列哪项最有意义

A. 甲状腺肿大程度(正确答案)

B. 眼球突出

C. 心率增快

D. 基础代谢率增高

E 血清 T₃ 值增高

17. 乳腺癌常常发生于乳腺的哪个部位（）

A. 乳腺外上象限(正确答案)

B. 乳腺内上象限

C. 乳腺外下象限

D. 乳晕内

E. 乳腺内下象限

18. 乳腺癌局部皮肤凹陷，其机制是（）

A. 乳房皮下淋巴管被癌细胞堵塞

B. 癌肿侵及乳管使其堵塞

C. 乳腺癌合并周围组织炎性水肿

D. 癌肿及皮肤浸润

E. 乳腺癌侵及皮下 Cooper 韧带，使其收缩(正确答案)

19. 女性，30岁，产后3周，以急性乳房炎入院。下列哪项是急性乳房炎的主要病因（）

A. 乳头破损

B. 乳头内陷

C. 乳汁淤积(正确答案)

D. 首次哺乳

E. 乳管堵塞

20. 女性，44岁，右侧乳腺癌准备行乳癌根治性手术，术前患者最关心的健康宣教内容是

A. 手术方式和手术效果(正确答案)

B. 术前备皮. 用药的重要性

C. 手术室的环境和设备

D. 术后疼痛和不适的处理

E. 术后上肢功能锻炼的方法

21. 瘘内容物被嵌顿时间较久，发生血循环障碍而坏死称为（）

A. 难复性疝

B. 嵌顿性疝

C. 绞窄性疝(正确答案)

D. 易复性疝

E. 滑动性疝

22. 斜疝与直疝术前最重要的鉴别方法是（）

A. 疝块形态

B. 发病年龄差异

C. 压迫内环后疝块是否再突出(正确答案)

D. 嵌顿机会

E. 疝囊颈与腹壁下动脉的关系

23. 腹股沟斜疝术后伤口压沙袋和用丁字带托起阴囊的目的是（）

A. 防止切口裂开

B. 防止阴囊水肿(正确答案)

C. 防止切口感染

D. 防止术后复发

E. 防止切口水肿

24. 女性，50.岁，腹部手术后4d切口感染，经换药2周后伤口愈合。患者站立时切口瘢痕处出现一肿块，卧位时消失，诊断为切口疝。发生切口疝的主要原因是（）

A. 腹壁肌被切断

B. 缝线滑脱

C. 切口感染(正确答案)

D. 切口过长

E. 缝合时强行拉拢创缘

25. 下列哪项不是腹膜炎病人采用半卧位的目的()

A. 利于渗液积聚于盆腔

B. 利于腹肌松弛，以减轻疼痛

C. 防止下肢静脉血栓形成(正确答案)

D. 利于炎症局限及引流

E. 利于呼吸及循环

26. 下列哪组症状应怀疑膈下脓肿()

A. 腹腔手术后恶心、呕吐，伴高热、寒战

B. 腹腔手术后膀胱刺激征，伴高热、寒战

C. 腹腔手术后咳嗽、咳痰，伴高热、寒战

D. 腹腔手术后顽固性呃逆，伴高热、寒战(正确答案)

E. 腹腔手术后直肠刺激征，伴高热、寒战

27. 患者，男性，30岁。急性阑尾炎穿孔，行阑尾切除术后第6天，体温39℃，大便次数增多，伴里急后重。直肠指检时直肠前壁有触痛，并有波动感。目前最主要的处理措施是()

A. 禁食. 胃肠减压

B. 脓肿切开引流(正确答案)

C. 大量应用抗生素

D. 物理降温

E. 灌肠

28. 赵女士，35岁，腹部被车撞伤2d，由当地卫生院转来医院。腹痛，恶心呕吐，发热，尿少，体温38.8℃，血压80 / 60mmHG，心率120 / min，腹胀，全腹压痛及反跳痛，以右下腹最明显，伴肌紧张，移动性浊音(+)。考虑引起该患者休克的主要原因是()

A. 感染中毒

- B. 失血失液
- C. 疼痛
- D. 液体量不足
- E. 创伤(正确答案)

29. 男性，40岁，多年胃.十二指肠溃疡病，近半月来胃病发作，饮食后突然全腹疼痛剧烈，刀割样，血压 $100 / 70\text{mmHg}$ ($13.3 / 9.3\text{kPa}$)，脉搏 $100 / \text{min}$ ，全腹压痛，反跳痛，肌紧张。初步诊断是

- A. 急性阑尾炎(正确答案)
- B. 急性阑尾炎穿孔腹膜炎
- C. 胃.十二指肠溃疡
- D. 胃.十二指肠溃疡穿孔腹膜炎
- E. 胆囊炎

30. 瘢痕性幽门梗阻最突出的临床表现是

- A. 上腹部胀痛(正确答案)
- B. 上腹部膨胀
- C. 营养不良
- D. 大量呕吐宿食
- E. 便秘

31. 季先生，因十二指肠溃疡并发瘢痕性幽门梗阻，反复呕吐宿食，消瘦，皮肤干燥，弹性消失，入院后经充分术前准备，在硬膜外麻醉下行胃大部切除术。该患者入院时的护理诊断是

- A. 心输出量减少(正确答案)
- B. 体液不足
- C. 组织灌注量改变
- D. 活动无耐力
- E. 知识缺乏

32. 男性，60岁。以上腹部疼痛.食欲不振.体重减轻主诉就诊。胃镜检查示胃窦部小弯侧可见一直径约 3cm 肿块。该患者诊断，考虑最可能是()

A. 胃癌(正确答案)

B. 胃息肉

C. 胃溃疡

D. 萎缩性胃炎

E. 胃平滑肌瘤

33. 急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是()

A. 阑尾开口小

B. 阑尾淋巴丰富

C. 阑尾蠕动慢而弱

D. 阑尾动脉为终末动脉(正确答案)

E. 阑尾系膜短

34. 小肠扭转多见于()

A. 长期负重者

B. 习惯性便秘者

C. 排尿困难者

D. 晚期妊娠者

E. 饱餐后剧烈运动者(正确答案)

35. 男性，54岁，外伤性肠穿孔修补术后第2天，肠蠕动未恢复，腹胀明显，其护理哪项措施最重要()

A. 半卧位

B. 禁食，输液

C. 胃肠减压(正确答案)

D. 肛管排气

E. 针刺穴位

36. 某患者，急性阑尾炎穿孔并腹膜炎，手术后第5天，体温升高达39%1，伴大便次数增多，里急后重，黏液便，伤口不痛，无咳嗽。考虑哪项可能性最大()

A. 切口感染

- B. 菌痢
- C. 肠炎
- D. 盆腔脓肿(正确答案)

E 肺炎.肺不张

37. 患者，男性。58岁，经常大便带血，排便习惯改变，应首先进行的检查是

()

- A. 纤维结肠镜检
- B. 钡灌肠
- C. 直肠镜检
- D. 直肠指检(正确答案)

E. 大便常规

38. 患者，男性，58岁，患结肠癌，拟行左结肠癌根治术，术前需几日开始服用肠道消炎药 ()

- A. 1d
- B. 2d
- C. 3d(正确答案)
- D. 4d
- E. 5d

39. 患者，男性，48岁，腹痛腹胀，呕吐胃内容物及胆汁4h。近半年时有腹胀，大便带黏液，次数增加，每日3~4次，无排便不尽及里急后重感。体查：T36°C，P 96 / min，血压 110 / 70mmHg；腹部膨隆，未见肠型，腹部柔软，右下腹可触及一肿块，质地柔韧有压痛，腹部平片见一气液平面。发病以来。患者体重减轻5kg，睡眠欠佳。根据该患者的症状，初步考虑()

- A. 幽门梗阻
- B. 胆道梗阻
- C. 急性胃肠炎
- D. 肠梗阻(正确答案)

E. 急性胰腺炎

40. 患者，男性，48岁，腹痛腹胀，呕吐胃内容物及胆汁4h。近半年时有腹胀，大便带黏液，次数增加，每日3~4次，无排便不尽及里急后重感。体查：T36°C，P 96 / min，血压 110 / 70mmHg；腹部膨隆，未见肠型，腹部柔软，右下腹可触及一肿块，质地柔韧有压痛，腹部平片见一气液平面。发病以来。患者体重减轻5kg，睡眠欠佳。根据该患者的症状，该患者的症状最可能是由于下列哪种原因引起()

- A. 阑尾周围脓肿
- B. 结肠结核
- C. 结肠肿瘤(正确答案)
- D. 回盲部肠套叠
- E. 肠扭转

41. 若在手术后8d拔除腹腔引流管，2d后患者出现腹部持续性疼痛，体温升高达39°C，肠鸣音减弱。应考虑该患者并发了()

- A. 肠麻痹
- B. 肠痉挛
- C. 吻合口瘘(正确答案)
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 肿瘤破裂

42. 内痔早期常见症状是()

- A. 肛门疼痛
- B. 痔核脱出
- C. 便血(正确答案)
- D. 便秘
- E. 腹泻

43. 李先生，32岁，肛门周围不断有少量脓性分泌物溢出，甚至有大便和气体排出1周，肛周皮肤瘙痒。肛门检查：肛门周围皮肤有一乳头状隆起的开口，挤压可见少量脓性分泌物。根据患者上述症状，你考虑为()

- A. 肛瘘

B. 肛门周围脓肿(正确答案)

C. 肛裂

D. 内痔

E. 外痔

44. 李先生，32岁，肛门周围不断有少量脓性分泌物溢出，甚至有大便和气体排出1周，肛周皮肤瘙痒。肛门检查：肛门周围皮肤有一乳头状隆起的开口，挤压可见少量脓性分泌物。根据患者上述症状，下列哪一种检查可以确诊（）

A. 直肠指诊

B. 从皮肤开口插入探针(正确答案)

C. 肛门镜检查

D. X线钡剂灌肠

E. 局部穿刺

45. 门静脉高压症病人在手术前不放置胃管，主要原因是（）

A. 影响病人休息

B. 容易丢失消化液

C. 容易引起呕吐

D. 易损伤食管曲张静脉(正确答案)

E. 影响胃肠功能

46. 急性梗阻性化脓性胆管炎最关键的治疗是（）

A. 及时使用抗生素

B. 应用肾上腺皮质激素

C. 及时用升压药

D. 紧急胆道减压术(正确答案)

E. 纠正电解质酸碱平

47. 关于急性胆囊炎的临床特点描述错误的是（）

A. 进油腻饮食后，容易发病

B. 右上腹持续性疼痛，阵发性加重

C. 疼痛常放射至右肩或右背部

D. 墨菲征阳性

E. 多数病人伴黄疸(正确答案)

48. 雷诺(Reynold)五联征是指()

A. 胆绞痛、高热、黄疸、呕吐、腹泻

B. 胆绞痛、高热、黄疸、休克、神志不清(正确答案)

C. 高热、黄疸、呕吐、腹泻、寒战

D. 休克、神志不清、黄疸、呕吐、发热

E. 都不是

49. 胆总管引流术后，T管引流胆汁过多常提示

A. 肝细胞分泌亢进(正确答案)

B. 胆管分泌胆汁过多

C. 胆囊浓缩功能减退

D. 胆道下端梗阻

E. 十二指肠反流

50. 胆道术后病人在T管拔管前，下列护理措施必不可少的是

A. 无菌冲洗(正确答案)

B. B超

C. 抗生素

D. 试验性夹管1~2d

E. 检查血胆红素

51. 男性，40岁，因肝外胆管结石导致梗阻性黄疸，伴皮肤瘙痒难忍，对其皮肤瘙痒的护理不正确的是

A. 用手抓挠止痒(正确答案)

B. 温水擦洗皮肤

C. 外用止痒药物

D. 告知患者相关知识

E. 应用炉甘石洗剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267162165144006040>