

65例胸腺瘤患者术后 放疗疗效及预后相关 因素分析

汇报人：

2024-01-15



CATALOGUE

目录

- 引言
- 临床资料与方法
- 放疗疗效分析
- 预后相关因素分析
- 并发症与生活质量评价
- 讨论与结论





PART 01

引言



REPORTING




CATALOGUE

研究背景与意义

胸腺瘤是一种较为常见的纵隔肿瘤，手术是治疗的主要手段。然而，术后放疗在胸腺瘤治疗中的地位及作用一直存在争议。

探讨术后放疗对胸腺瘤患者的疗效及预后影响因素，对于指导临床治疗、改善患者预后具有重要意义。





国内外研究现状及发展趋势



国内外对于胸腺瘤术后放疗的研究主要集中在放疗剂量、放疗技术、放疗时机等方面。

目前，关于胸腺瘤术后放疗的疗效及预后影响因素的研究结果尚不一致，需要进一步探讨。



随着放疗技术的不断发展和进步，精准放疗、质子重离子放疗等新技术逐渐应用于胸腺瘤的治疗，为胸腺瘤术后放疗提供了新的治疗选择。



研究目的和意义



1

本研究旨在分析65例胸腺瘤患者术后放疗的疗效及预后相关因素，为临床治疗提供指导。

2

通过探讨胸腺瘤术后放疗的疗效及预后影响因素，可以为患者提供更加个性化的治疗方案，提高治疗效果和患者生活质量。

3

此外，本研究还可以为胸腺瘤术后放疗的研究提供新的思路和方法，推动相关领域的发展。





PART 02

临床资料与方法



REPORTING



CATALOGUE



病例选择与分组



病例来源

收集65例胸腺瘤患者的临床资料，所有患者均经病理证实为胸腺瘤，并接受手术治疗。

分组情况

根据患者是否接受术后放疗，将患者分为放疗组（ $n=35$ ）和非放疗组（ $n=30$ ）。





治疗方法及放疗方案



治疗方法

所有患者均接受手术治疗，其中部分患者术后接受放疗。

放疗方案

采用三维适形放疗技术，靶区包括瘤床及周围淋巴结引流区，总剂量为50-60Gy，分次照射，每周5次，共5-6周。



随访与评估指标



随访情况

所有患者均接受定期随访，中位随访时间为24个月（范围6-48个月）。

评估指标

主要评估指标为无进展生存期（PFS）和总生存期（OS），次要评估指标包括局部复发率、远处转移率和毒副反应发生率。



PART 03

放疗疗效分析





总体疗效评估



01

完全缓解率

在65例胸腺瘤患者中，经过放疗后，完全缓解的患者比例。

02

部分缓解率

放疗后，肿瘤缩小但未达到完全缓解标准的患者比例。



无变化率

放疗后，肿瘤大小无明显变化的患者比例。

进展率


放疗后，肿瘤出现进展或复发的患者比例。

03

04



不同病理类型胸腺瘤的疗效比较



A型胸腺瘤放疗疗效

A型胸腺瘤对放疗的敏感性、放疗后的生存率、复发率等。

AB型胸腺瘤放疗疗效

AB型胸腺瘤对放疗的反应及放疗后的预后情况。

B型胸腺瘤放疗疗效

B型胸腺瘤放疗后的疗效评估，包括生存率、局部控制率等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/268026037054006106>