

## 儿科题库及答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 5 岁小儿平均体重约为

- A、. 20kg
- B、. 16kg
- C、. 14kg
- D、. 12kg
- E、. 18kg

正确答案：E

2. 胎龄 39 周, 日龄 14 天的新生儿。出生时体重为 2400g, 生后 8 天皮肤黄染, 反应差, 食欲不振, 体格检查: 体温 32°C, 黄染明显, 小腿外侧及臀部发。血白细胞  $25 \times 10^9$  g/L, 中性粒细胞 75%, 血清胆红素 221  $\mu$ mol/L (13mg/dl), 其余无异常。最可能的情况是

- A、. 过期产儿. 新生儿败血症. 新生儿肝炎
- B、. 足月儿. 新生儿硬肿症
- C、. 早产儿. 新生儿败血症. 新生儿硬肿症
- D、. 足月小样儿. 新生儿败血症. 新生儿硬肿症
- E、. 新生儿败血症. 新生儿硬肿症. 新生儿肝炎

正确答案：D

3. 腹泻脱水患儿经补液治疗后已排尿, 按医嘱继续补液 400mL 溶液中加入 10%氯化钾的量不应超过

- A、. 14mL
- B、. 8mL
- C、. 10mL
- D、. 6mL
- E、. 12mL

正确答案：E

4. 下列哪项不是小儿体液平衡的特点

- A、. 水的交换率显著高于成人
- B、. 不显性失水量容易增加
- C、. 年龄越小, 体液所占的比例越大
- D、. 体液调节功能较差

E、. 年龄越小, 需水量相对越小

正确答案: E

5. 10 个月小儿, 面黄来诊, 诊断为营养性小细胞性贫血, 下述处理哪项是不必要的

A、. 设法增进食欲

B、. 口服铁剂

C、. 口服维生素 C

D、. 肌注维生素 B12

E、. 预防发生心功能不全

正确答案: D

6. 儿童开始模仿成人活动的年龄是

A、. 2 岁

B、. 1 岁

C、. 4 岁

D、. 3 岁

E、. 5 岁

正确答案: A

7. 接触隔离用

A、. 棕色标志

B、. 蓝色标志

C、. 绿色标志

D、. 黄色标志

E、. 橙色标志

正确答案: E

8. 2 岁小儿, 多汗、烦躁、前囟未闭、方颅、鸡胸、“O”形腿, 血清钙、磷均低于正常。考虑为

A、. 佝偻病恢复期

B、. 软骨营养障碍

C、. 佝偻病初期

D、. 佝偻病后遗症期

E、. 佝偻病激期

正确答案: E

9. 小儿最常见的心律失常为

- A、. 传导阻滞
- B、. 心动过缓
- C、. 过早搏动
- D、. 室上性心动过速
- E、. 室性心动过速

正确答案：C

10. 患儿 4 岁，患室间隔缺损，病情较重，平时需用地高辛维持心功能。现患儿因上感后诱发急性心力衰竭，按医嘱用西地兰，患儿出现恶心、呕吐、视力模糊。42. 要确定上述判断还应做的检查是

- A、. 粪便检查
- B、. 心脏 B 超检查
- C、. X 线检查
- D、. 心电图检查
- E、. 心导管检查

正确答案：D

11. 苯丙酮尿症的治疗原则下列正确的一项是

- A、. 力求早期诊断
- B、. 立即给予低盐饮食
- C、. 给予激素类相关药物治疗
- D、. 避免循环系统的损害
- E、. 通过自限性转归

正确答案：A

12. 6 个月~6 岁小儿血红蛋白正常值的底线是

- A、. 120g/L
- B、. 110g/L
- C、. 100g/L
- D、. 90g/L
- E、. 其余选项都是

正确答案：B

13. 儿科病房管理特点以下哪项正确

- A、. 环境管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/275242132340012010>