

CDFI 彩超上岗证《历年彩超上岗题在线测试》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 超声反复扫查可见肝脓肿腔, 却难以全面显示卷曲在脓腔内留置的塑料管, 更不易找到导管末端注药(喷射)具体部位, 这主要是因为

- A、塑料导管引起内部混响伪像
- B、注入微气泡引起多次反射伪像
- C、塑料导管密度较高, 超声穿透力差
- D、折射伪像或侧边声像伪像
- E、声衰减伪像

2、单项选择题: 一阵发性高血压患者, 右侧肾上腺区发现一 4cm×5cm 椭圆形肿块, 边界清楚, 呈中等不均匀回声, 内见不规则小透声区, 最可能诊断是:A. 嗜铬细胞瘤

- B. 皮质腺瘤
- C. 皮质增生
- D. 皮质腺癌
- E. 转移癌

3、单项选择题: 鉴别胰腺癌与慢性胰腺炎, 不支持前者的表现是:A. 胰腺局部肿大

- B. 低回声病灶
- C. 边界不清
- D. 腹膜后淋巴结肿大
- E. 胰管呈不均匀串珠状扩张

4、单项选择题: 侧边声影及“回声失落”伪像, 是由于入射超声与界面

- A、90 度
- B、90 度
- C、入射角大于临界角
- D、入射角等于临界角
- E、入射角小于临界角

5、单项选择题: 超声造影回声强度减低的原因是

- A、微颗粒减小
- B、发射超声强度增大
- C、检测深度增大
- D、微气泡截面积增大
- E、发射超声频率减低

6、单项选择题: 超声剂量是指 A. 超声频率的高低 (MHz)

- B. 超声功率的大小 (W 或 mW)
 - C. 超声的大小 (W / cm² 或 mW/cm²))
 - D. 功率时间
 - E. 声强时间
- 7、单项选择题：在声像图上, 正常卵黄囊测值范围为: A. 2mm---5. 6mm
- B. 10. 6mm---11. 6mm
 - C. 12mm---13mm
 - D. 13mm---14mm
 - E. 14mm---16mm
- 8、单项选择题：下列液体回声何项描述不妥()
- A、胆汁是无回声
 - B、尿液是无回声
 - C、血液是无回声
 - D、新鲜的出血和新鲜血肿是无回声
 - E、发生纤维化钙化的陈旧性血块回声增多
- 9、单项选择题：避免超声入射角对彩色多普勒血流成像影响的方法是
- A、用高频超声
 - B、减低检测深度
 - C、用低频超声
 - D、用能量多普勒成像
 - E、用高脉冲重复频率技术
- 10、单项选择题：多普勒超声原理可用以说明
- A、振动源频率的变化与传播速度的关系
 - B、接收体频率的变化与传播速度的关系
 - C、超声波长的变化与超声频率的关系
 - D、振动源与接收体运动时接收频率的变化
 - E、超声传播速度的变化与波长的关系
- 11、单项选择题：超声测距是按 1540m / s 平均速度设置电子尺的, 下列测量中哪项是错误的
- A、测量肝、胆、脾、胰误差小
 - B、测量脂肪组织大于真实值(偏大)
 - C、测量胎儿股骨长径时小于真实值(偏小)
 - D、测量颅骨钙化病灶时测值偏小
 - E、测量眼组织晶状体、角膜、测值无偏差
- 12、单项选择题：右上腹探及一肿块, 与肝右叶脏面相贴, 深呼吸时, 肝脏在肿瘤表面上下移动, 下腔静脉向前内侧推移, 此肿物可能来源于: A. 腹膜后间隙
- B. 肝右叶
 - C. 胆囊
 - D. 胰头
 - E. 胃
- 13、单项选择题：原发孔房间隔缺损在二维超声检查时有什么所见: A. 显示房间隔最低位处(房室间隔连接处)缺损
- B. 显示左心室扩大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/276042112144010122>