

神经外科第一季度理论考试

神经外科第一季度

1.不能用于诊断垂体瘤的临床表现是 [单选题] *

- A、头痛
- B、视野缺损
- C、内分泌紊乱
- D、蝶鞍扩大
- E、单侧耳聋(正确答案)

2.颅内压持续增高可导致下列病理生理变化，其中哪项是错误的[单选题] *

- A、脑血管自动调节功能失效
- B、脑水肿
- C、胃及十二指肠出血，溃疡穿孔
- D、脑疝形成
- E、早期血压降低，脉搏变快，脉压变小，呼吸增快(正确答案)

3.头皮撕脱伤时哪项处理最常用 [单选题] *

- A、将撕脱头皮还回缝合
- B、做成全厚皮片重新植回
- C、做成中厚皮片重新植回(正确答案)
- D、头皮小血管吻合再植
- E、待肉芽生长后再植皮

4.目前动脉瘤开颅手术中较理想的方法是 [单选题] *

- A、动脉瘤包裹术
- B、动脉瘤孤立术
- C、载瘤动脉夹闭术
- D、动脉瘤颈夹闭术
- E、动脉瘤颈夹闭术+动脉瘤切除术(正确答案)

5.关于头皮裂伤，下列哪项是错误的 [单选题] *

- A、创口有脑组织外溢，须立即缝合头皮，变开放为闭合损伤(正确答案)
- B、处置时着重检查有无颅骨和脑损伤
- C、尽早清创缝合
- D、清创时限放宽至 24 小时
- E、即使创口不大，出血也较多

6.婴幼儿颅内压增高的可靠依据是 [单选题] *

- A、躁动不安与呕吐
- B、意识障碍与躁动
- C、头痛、呕吐、视乳头水肿
- D、嗜睡与惊厥
- E、前囟门张力增高或和头围增大(正确答案)

7.诊断颈动脉海绵窦漏，最有用特征为 [单选题] *

- A、突眼伴颅内杂音(正确答案)
- B、突眼伴眼结膜充血水肿

- C、突眼伴视力障碍
- D、突眼伴眼球运动障碍
- E、突眼伴鼻出血

8.有一名蛛网膜下腔出血病人，哪项处置是错误的 [单选题] *

- A、绝对卧床休息
- B、给镇静药物
- C、给予止血药物
- D、给予抗生素预防感染
- E、便秘者给予肥皂水灌肠(正确答案)

9.枕骨大孔疝病人的诊断要点是 [单选题] *

- A、昏迷，患侧瞳孔散大
- B、四肢共济障碍
- C、大脑强直发作
- D、呼吸功能障碍早于意识障碍(正确答案)
- E、四肢瘫痪，并感觉障碍

10.外伤性急性颅内血肿，右侧瞳孔散大，紧急处置首选 [单选题] *

- A、头颅 CT 扫描，明确血肿部位
- B、20%甘露醇 250ml，快速静脉滴入
- C、尽快钻孔探查，寻找并清除血肿(正确答案)
- D、气管切开，防止脑缺氧
- E、脑室穿刺放脑脊液

11.急性小脑幕切迹疝时，瞳孔扩大的机理是 [单选题] *

- A、视神经受损伤
- B、脑干受压迫
- C、动眼神经核损伤
- D、交感神经受刺激
- E、动眼神经受压迫(正确答案)

12.女性，50岁，突发头痛呕吐2周，癫痫发作3次，5年前行右乳癌根治术，头颅CT示左额部大片低密度影，有占位效应，据此诊断为 [单选题] *

- A、脑梗死
- B、脑炎
- C、脑膜瘤
- D、脑转移瘤(正确答案)
- E、脑膜炎

13.一患者头部外伤轻微，无昏迷史，无颅骨骨折，2个月后出现颅内压增高，该患者最可能为 [单选题] *

- A、慢性硬脑膜外血肿
- B、脑内血肿
- C、多发性颅内血肿
- D、严重脑挫裂伤
- E、慢性硬脑膜下血肿(正确答案)

答案解析：暂无解析

14.诊断颅内占位性病变依据常用的是 [单选题] *

A、头颅 X 线片(正确答案)

B、头颅 CT

C、脑电地形图

D、脑血管造影

E、脑电图

15.有一名枕骨大孔疝病人，其诊断要点是 [单选题] *

A、昏迷、患侧瞳孔散大，对侧肢体偏瘫

B、四肢共济障碍

C、四肢瘫痪

D、去大脑强直发作

E、呼吸功能障碍早于意识障碍(正确答案)

16.脊髓病变时，所谓的马鞍回避是指 [单选题] *

A、是脊髓髓内病变的表现(正确答案)

B、是马尾病变的表现

C、是脊髓髓外病变的表现

D、是脊髓髓外硬膜外病变的表现

E、是腰麻的并发症

17.常引起颅内压增高的颅内肿瘤是 [单选题] *

A、脑干肿瘤

B、额部肿瘤

C、垂体肿瘤

D、侧脑室肿瘤

E、第三、四脑室及其附近的肿瘤(正确答案)

18.关于脑转移瘤，瘤周围水肿系 [单选题] *

- A、细胞性
- B、渗透性
- C、脑积水性
- D、血管源性(正确答案)
- E、脑缺血性

19.硬膜外血肿的好发部位在 [单选题] *

- A、额部
- B、颞部(正确答案)
- C、顶枕部
- D、顶部
- E、矢状窦旁

20.头皮血肿的处理原则。正确的是 [单选题] *

- A、均需用切开引流
- B、均需用穿刺抽除积血加压包扎
- C、采用局部适当加压包扎(正确答案)
- D、巨大头皮血肿易引起中线移位故脱水治疗
- E、均需静脉输血抢救休克

21.有一病人，确诊为脑挫裂伤，哪项不是诊断脑挫伤依据 [单选题] *

- A、脑脊液含红细胞

- B、意识障碍超过 30 分钟
- C、可表现局灶脑损伤体征
- D、脑脊液鼻漏(正确答案)
- E、CT 有额部点状高密度灶

22.外伤性颅内血肿形成后，其严重性在于 [单选题] *

- A、由对冲性脑挫伤所致，广泛的额颞部受累
- B、血肿位于白质深部
- C、脑膜中动脉受损，出血速度快
- D、引起颅内压增高而导致脑疝(正确答案)
- E、伴发脑水肿程度

23.颅内压增高病人，病情有加剧表现，处理的关键措施是 [单选题] *

- A、头颅 CT，明确病变的性质和部位(正确答案)
- B、安静卧床，头高 30 度
- C、保持大便通畅
- D、20%甘露醇 250ml，一日二次.静点
- E、限制水、盐入量

24.外伤后急性硬脑膜外血肿者，最典型的意识障碍是 [单选题] *

- A、持续性昏迷加深
- B、迟发性昏迷
- C、昏迷→清醒→昏迷(正确答案)
- D、早期清醒→昏迷
- E、清醒与朦胧状态交替出现

25.有一颅底骨折病人，哪项是正确的 [单选题] *

- A、血性脑脊液病人，腰穿放脑脊液
- B、脑脊液耳漏，需尽早修补硬膜漏口
- C、伤后视力减退，超过一个月可手术减压
- D、颅底骨折需手术治疗以便神经减压
- E、着重观察有无脑损伤，并处理脑脊液漏、脑神经损伤等(正确答案)

26.处理颅内压增高，以下哪一项是错误的 [单选题] *

- A、频繁呕吐时宜禁食
- B、限制输液量及速度
- C、便秘 4 天以上给予高位灌肠(正确答案)
- D、静点地塞米松
- E、早期行病因治疗

27.脑损伤后 6 小时，意识清，轻度头痛，下述哪项处理原则不可取 [单选题] *

- A、意识清楚，故回家观察(正确答案)
- B、观察意识、瞳孔、生命体征及神经系统体征变化
- C、作头颅 CT 检查
- D、对症处置
- E、向家属交待有迟发性颅内血肿可能

28.脑出血与蛛网膜下腔出血鉴别要点是 [单选题] *

- A、脑脊液有无血液
- B、有无昏迷
- C、有无脑膜刺激征

- D、有无高血压
- E、有无定位体征(正确答案)

29.关于慢性硬脑膜下血肿，下列哪种说法是不正确的 [单选题] *

- A、可有精神症状
- B、可有肢体偏瘫
- C、一定有外伤史(正确答案)
- D、中老年多见
- E、可有颅内压增高症状

30.关于原发性脑干损伤的治疗不适宜的方法是 [单选题] *

- A、激素
- B、气管切开
- C、开颅手术(正确答案)
- D、颅内压监测
- E、亚低温治疗

31.颅盖骨折通常诊断依据是 [单选题] *

- A、头颅 X 线片(正确答案)
- B、头痛伴呕吐
- C、脑定位体征
- D、局部骨擦音
- E、头部外伤史

32.外伤后幕上急性硬脑膜外血肿的临床表现中，下列哪种情况是很少见的 [单选题]

*

- A、意识变化常在瞳孔变化之前
- B、血压升高脉搏变慢，可随意识障碍同时出现
- C、呼吸不规则常在意识变化之前出现(正确答案)
- D、血压下降，脉搏细数常在双侧瞳孔散大之后出现
- E、瞳孔先散大的一侧常常与血肿同侧

33.后颅凹占位病变脑危象时，最快而有效的急救措施是 [单选题] *

- A、静脉快速滴注甘露醇
- B、行枕下减压术
- C、尽快切除后颅凹占位性病变
- D、行脑室穿刺及脑脊液外引流术(正确答案)
- E、脑室膀胱内引流术

34.侧卧位腰穿测量的正常颅压是 [单选题] *

- A、80 ~ 180mmH₂O(正确答案)
- B、80 ~ 180mmHg
- C、40 ~ 80mmH₂O
- D、40 ~ 80mmHg
- E、180 ~ 240mmH₂O

35.颅内压增高的诊断依据是 [单选题] *

- A、剧烈头痛
- B、喷射性呕吐
- C、视乳头水肿(正确答案)
- D、癫痫发作

E、X线片显示脑回压迹加深

36.慢性颅内压增高的主要临床表现是 [单选题] *

- A、头痛，呕吐，肢体运动障碍
- B、头痛，瞳孔异常和肢体运动障碍
- C、血压，呼吸和脉搏改变
- D、头痛，呕吐，视乳头水肿(正确答案)
- E、进行性意识障碍

37.确定 AVM 治疗方法及大小、部位。最有用方法是 [单选题] *

- A、腰穿为血性脑脊液
- B、CT 扫描示高密度畸形血管团
- C、MRI 示 T1，T2 加权像均呈黑影
- D、全脑血管造影显示(正确答案)
- E、 γ 刀

38.颅脑外伤后病人烦躁不安，血压偏低，下列哪种药不应该使用 [单选题] *

- A、水合氯醛
- B、安定
- C、苯巴比妥钠
- D、度冷丁(正确答案)
- E、冬眠灵

39.帽状腱膜下血肿正确处理方法是 [单选题] *

- A、切开缝合止血

- B、穿刺抽血
- C、切开填塞引流
- D、血肿自行吸收
- E、穿刺抽血加压包扎(正确答案)

40.外伤后急性脑受压，最可靠的早期临床表现是 [单选题] *

- A、血压升高，呼吸脉搏变慢
- B、头痛，呕吐，视乳头水肿
- C、头痛，呕吐，进行性意识障碍(正确答案)
- D、Cushing 反应
- E、瞳孔由正常变为不等大

41. [单选题] *

颅前窝骨折伴脑脊液漏时为促进漏口愈合应取何体位：

(1分)

- A、平卧位
- B、头高 30°
- C、(正确答案)半卧位
- D、坐位
- E、去枕平卧

答案解析：暂无解析

42.蛛网膜下腔出血常见的原因是 [单选题] *

- A、颅内动脉瘤(正确答案)
- B、脑动脉炎
- C、高血压
- D、颅脑外伤
- E、颅内肿瘤

43. [单选题] *

抢救枕骨大孔疝(脑室系统扩大者)最有效的急救措施首选

(1分)

- A、
20%甘露醇 250mL 快速静滴
- B、
尽快行去骨瓣减压术
- C、(正确答案)
快速颅骨钻孔穿刺侧脑室行脑脊液外引流术
- D、
快速静滴地塞米松 20mg
- E、气管切开保持呼吸道通畅

答案解析：暂无解析

44.有一名男性患者右顶枕部着地，伤后2小时，左侧瞳孔散大，钻孔探查部位应首选 [单选题] *

- A、右顶枕部
- B、右额颞部

- C、左顶枕部
- D、左额颞部(正确答案)
- E、后颅凹

45.有一名脑外伤病人，CT示右额颞顶部新月状高密度影像，其诊断为 [单选题] *

- A、急性硬膜外血肿
- B、急性硬膜下血肿(正确答案)
- C、慢性硬膜下血肿
- D、脑内血肿
- E、高血压脑出血

46.脑震荡主要临床特点为 [单选题] *

- A、头痛、头晕、恶心、呕吐
- B、短暂意识丧失和逆行性健忘(正确答案)
- C、意识障碍超过 30 分钟
- D、生命体征改变
- E、脑膜刺激征

47.诊断颅内占位病变无痛、安全、准确的方法是 [单选题] *

- A、头颅 CT(正确答案)
- B、头颅 X 线平片
- C、脑电图
- D、脑血管造影
- E、气脑造影

48.小脑幕切迹疝典型瞳孔改变为 [单选题] *

- A、双侧瞳孔散大
- B、同侧瞳孔散大(正确答案)
- C、对侧瞳孔散大
- D、对侧瞳孔缩小
- E、双侧瞳孔缩小

49.最多见的颅内肿瘤是 [单选题] *

- A、神经胶质瘤(正确答案)
- B、垂体腺瘤
- C、脑膜瘤
- D、脑血管瘤
- E、脑转移瘤

50.颅内压增高昏迷病人，治疗呼吸道梗阻最有效的措施是 [单选题] *

- A、通过鼻腔，口腔吸痰
- B、气管切开(正确答案)
- C、鼻腔置管，氧气吸入
- D、从口腔行气管插管
- E、用开口器侧外位引流

51.头皮损伤的处理下列不正确的是 [单选题] *

- A、头皮下血肿一般不需特殊处理
- B、帽状腱膜下血肿穿刺抽血加压包扎
- C、骨膜下血肿通常不必处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/276151225112010043>