

康复医学技术中级《相关专业知知识》预测试卷一

[单选题]1. 患者，男，20岁，网球运动员，右（江南博哥）肘关节外侧疼痛半月，持物无力，右肘关节外侧局限性压痛。最有助于诊断的是（）。

- A. Tinel 征
- B. Finkelstein 征
- C. Dugas 征
- D. Hoffmann 征
- E. Mills 征

参考答案：E

[单选题]2. 引起癌痛的原因是（）。

- A. 肿瘤刺激骨膜，破坏骨质
- B. 肿瘤直接浸润，侵犯神经
- C. 肿瘤压迫周围脏器引起缺血等
- D. 患者的心理性原因
- E. 以上都是

参考答案：E

[单选题]3. 脊髓损伤患者出现损伤平面以下一侧肢体浅感觉障碍，对侧肢体运动障碍，应该属于（）。

- A. 中央束综合征
- B. 半切综合征
- C. 前索综合征
- D. 后索综合征
- E. 马尾综合征

参考答案：B

参考解析：半切综合征的特点是损伤平面以下一侧肢体浅感觉障碍，对侧肢体运动障碍，即感觉与运动障碍分离，机制在于传导浅感觉的纤维在脊髓相应的水平上升1~2个阶段交叉至对侧后上行，而传导运动的纤维则在延髓锥体交叉水平交叉后下行。

[单选题]4. 最常见的人格障碍类型是（）。

- A. 偏执型人格障碍
- B. 强迫型人格障碍
- C. 分裂型人格障碍
- D. 反社会型人格障碍
- E. 依赖型人格障碍

参考答案：E

参考解析：人格障碍包括偏执型人格障碍、强迫型人格障碍、分裂型人格障碍、反社会型人格障碍、依赖型人格障碍。其中依赖型人格障碍的特征是一贯广泛地被动依赖他人，依赖他人替自己作出生活上的大小决定，特别怕被抛弃，

感到无助和无能为力，被动依从他人，尤其是长者的意愿。是一种最常见的人格障碍，它是一切人格障碍的基础和雏形。故正确答案为 E 项。

[单选题]5. 下列关于玫瑰糠疹的描述，正确的是()。

- A. 玫瑰糠疹是一种常见的化学性损伤皮肤病
- B. 病程有自限性，甚少复发
- C. 多见于婴幼儿
- D. 皮疹好发于四肢远端
- E. 发病前多有明确的皮肤损伤病史

参考答案：B

参考解析：玫瑰糠疹是一种常见的炎症性皮肤病，病程有自限性，甚少复发。病因不明，可能与病毒、真菌、细菌感染有关。多见于青壮年。皮疹好发于躯干及四肢近心端。发病前可有头痛、咽痛等轻度全身不适。题中各选项关于玫瑰糠疹的描述正确的是病程有自限性，甚少复发。故正确答案为 B 项。

[单选题]6. 约 60% 足月儿和 80% 以上的早产儿可于()。

- A. 生后 1~2 天出现黄疸
- B. 生后 2~3 天出现黄疸
- C. 生后 2~4 天出现黄疸
- D. 生后 2~5 天出现黄疸
- E. 生后 2~6 天出现黄疸

参考答案：D

[单选题]7. 急性期通常伴有剧烈头痛呕吐的脑卒中最常见的是()。

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 小脑梗死

参考答案：C

参考解析：剧烈头痛和呕吐是颅内高压的典型症状，脑卒中的脑出血患者短期内因占位效应而会出现颅内高压，因此最为常见。

[单选题]8. 盆腔炎不包括下列哪项炎症性疾病？()

- A. 子宫内膜炎
- B. 子宫肌炎
- C. 子宫颈炎
- D. 输卵管炎
- E. 子宫周围炎

参考答案：C

参考解析：盆腔炎其炎症可局限于一个部位或波及多个部位，如：子宫内膜炎、子宫肌炎、子宫周围炎、输卵管炎、输卵管卵巢炎（常称附件炎），有时

炎症波及整个盆腔，发生盆腔结缔组织炎、盆腔腹膜炎。但子宫颈炎不属于盆腔炎，故正确答案为 C 项。

[单选题]9. 下列哪项不属于常见的心身疾病？()

- A. 消化性溃疡
- B. 类风湿关节炎
- C. 冠心病
- D. 高血压
- E. 脑出血

参考答案：E

参考解析：常见心身疾病有消化性溃疡、类风湿关节炎、甲状腺毒症、支气管哮喘、冠心病、高血压病等。患者的情绪及性格特征等对起病有重要影响。而脑出血的病因主要是血管病变，故正确答案为 E 项。

[单选题]10. 患者，女，50 岁。左拇指掌指关节处疼痛，压痛半年。查体：左拇指掌指关节处掌侧可扪及一小结节，光滑、压痛，活动时有关响。其诊断为 ()。

- A. 神经纤维瘤
- B. 血管瘤
- C. 脂肪瘤
- D. 腱鞘囊肿
- E. 狭窄性腱鞘炎

参考答案：E

[单选题]11. 下列关于萎缩性胃炎的描述，不正确的是 ()。

- A. 病因和发病机制尚未完全阐明
- B. 病变深入黏膜固有膜时影响胃腺体，使之萎缩
- C. 病变可见于胃窦，也可见于胃体
- D. 不同部位的萎缩性胃炎其症状亦不相同
- E. 胃窦胃炎消化道症状较少

参考答案：E

参考解析：慢性胃炎的病因和发病机制尚未完全阐明，可能与急性胃炎的遗留、刺激性食物和药物、十二指肠液的反流、免疫因素和感染等因素有关。按组织学变化分为浅表性胃炎和萎缩性胃炎。病理改变方面，萎缩性胃炎病变深入黏膜固有膜时影响胃腺体，使之萎缩。病变可见于胃窦，也可见于胃体，不同部位的萎缩性胃炎其症状亦不相同。胃体胃炎消化道症状较少；胃窦胃炎有胆汁反流时，常表现为持续性上、中腹部疼痛，进食后即吐，呕吐物含胆汁，伴胸骨后疼痛及烧灼感。选项中，E 的描述与萎缩性胃炎不相符合。故正确答案为 E 项。

[单选题]12. 小儿 10 个月，方颅，多汗，胸骨肋膈沟，血钙正常，血磷低，X 线可见骨骺软骨增宽，干骺端临时钙化带模糊，并呈毛刷状改变，诊断为 ()。

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 先天性佝偻病

参考答案：B

[单选题]13. 以下哪项不是小儿肺炎应用糖皮质激素的指征？()

- A. 出现脑水肿
- B. 全身中毒症状明显
- C. 动脉血  $\text{PaCO}_2 70\text{mmHg}$   $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$
- D. 合并感染中毒性休克
- E. 出现心力衰竭

参考答案：E

参考解析：肺炎应用糖皮质激素有：中毒症状明显；严重喘憋；伴脑水肿，合并感染性中毒性休克等，E项不对。

[单选题]14. 咽部黏膜层充血、黏膜下结缔组织及淋巴组织增生，黏液腺肥大，分泌亢进等病理改变可见于()。

- A. 急性咽炎
- B. 急性喉炎
- C. 慢性单纯性咽炎
- D. 慢性肥厚性咽炎
- E. 萎缩或干燥性咽炎

参考答案：C

参考解析：急性咽炎为咽黏膜，黏膜下充血肿胀及淋巴组织的炎性浸润。急性喉炎是喉黏膜的急性卡他性炎症。慢性单纯性咽炎为咽部黏膜层慢性充血、黏膜下结缔组织及淋巴组织增生，黏液腺肥大，分泌亢进。慢性肥厚性咽炎为黏膜充血肥厚，黏膜下有广泛的结缔组织及淋巴组织增生，围绕咽后壁黏液腺的淋巴组织多形成颗粒状隆起。萎缩或干燥性咽炎多由萎缩性鼻炎蔓延所致，主要为腺体退变和黏膜萎缩。故正确答案为C项。

[单选题]15. 直接兴奋呼吸中枢的药物是()。

- A. 吡拉西坦（脑复康）
- B. 苯巴比妥（鲁米那）
- C. 山梗菜碱（洛贝林）
- D. 尼可刹米（可拉明）
- E. 水合氯醛

参考答案：D

参考解析：中枢兴奋的药物有咖啡因；吡拉西坦（脑复康）；山梗菜碱（洛贝林）；尼可刹米（可拉明）。其中直接兴奋呼吸中枢，使呼吸加深加快，临床

主要用于各种原因所致呼吸抑制（或衰竭）为尼可刹米（可拉明）。

[单选题]16. 足月儿生后第7天出现黄疸，下列哪项诊断不可能？（）

- A. 母乳性黄疸
- B. 胆道闭锁
- C. 新生儿肺炎
- D. ABG溶血病
- E. 败血症

参考答案：D

[单选题]17. 下列关于泪囊炎的叙述，不正确的是（）。

- A. 由于鼻泪管的阻塞或狭窄继发感染所致
- B. 病原菌包括肺炎球菌、葡萄球菌、链球菌等
- C. 可表现为卡他性或化脓性炎症
- D. 临床表现为结膜干燥，无泪
- E. 可应用有效抗生素治疗

参考答案：D

参考解析：泪囊炎是由于鼻泪管的阻塞或狭窄，泪液不能排出，泪液中的细菌，如肺炎球菌、葡萄球菌、链球菌等在此滋生，刺激泪囊壁，引起泪囊黏膜慢性炎症，产生卡他性或化脓性炎症。慢性炎症时表现经常流泪，炎症急性发作时睑缘红肿、内眦部结膜充血，冲洗泪道时有黏性分泌物逆流。重者泪囊表面皮肤发红，泪囊隆起，压迫泪囊时有脓性分泌物从泪点逆流进入结膜囊内。治疗要点包括应用有效抗生素、物理治疗消炎、抗感染、促进炎性物质吸收等。故正确答案D项。

[单选题]18. 颅内高压“三主征”是指（）。

- A. 昏迷、高热、瞳孔散大
- B. 头痛、呕吐、视乳头水肿
- C. 血压升高、高热、呼吸不规则
- D. 头痛、高热、血压升高
- E. 昏迷、血压升高、呕吐

参考答案：B

参考解析：头痛、呕吐、视乳头水肿是颅内压增高的主要症状和体征。

[单选题]19. MRI 不注入对比剂便能帮助识别血管的存在及血管内的血液是否流动或已形成栓塞，主要是利用了MRI的哪个特性？（）

- A. 多参数成像
- B. 多方位成像
- C. 流动效应
- D. 多层螺旋
- E. 对比增强

参考答案：C

参考解析：流动效应是指磁共振信号的产生，从开始激励到信号采集有一段时间间隔，由于血液在流动，所以采集信号时，受激励的血流已流出了切面，流入切面的是未受激励的血流，所以在图像中血流是没有信号的，称为流动效应或流空效应。利用MRI流动效应可以通过不注入对比剂即可帮助识别血管的存在及血管内的血液是否流动或已形成血栓。

[单选题]20. 病人割伤手腕部，伤口二期愈合。以后手指呈爪状畸形。手部肌肉明显萎缩，手指感觉丧失，对指功能丧失。最可能的诊断是()。

- A. 尺神经损伤
- B. 正中神经损伤
- C. 桡神经损伤
- D. 尺神经、正中神经联合损伤
- E. 桡神经、正中神经联合损伤

参考答案：D

[单选题]21. 下列关于带状疱疹的治疗措施，不正确的是()。

- A. 紫外线照射患处
- B. 消炎镇痛药
- C. 抗病毒药物
- D. 抗感染
- E. 抗过敏治疗

参考答案：E

参考解析：带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒感染，累及局部神经节和后根以及相应神经节段所致的病毒性皮肤病。可因免疫功能低下等诱发。治疗包括药物治疗：抗病毒感染，镇痛剂；物理治疗：缓解疼痛，促进疱疹干燥吸收，抗感染。故答案选E项。

[单选题]22. 颞下颌关节紊乱综合征的治疗措施正确的是()。

- A. 抗病毒治疗
- B. 矫正咬合关系
- C. 使用抗生素
- D. 最大幅度张口训练
- E. 手术治疗

参考答案：B

参考解析：颞下颌关节紊乱综合征的治疗措施包括：①针对病因予以治疗。如纠正不良咀嚼习惯（如单侧咀嚼），并防止张口过大。②矫正咬合关系。③局部物理治疗：消炎、镇痛，改善张口范围。故正确答案为B项。

[单选题]23. 鉴别起病几小时的卒中病人是脑出血还是脑梗死的最肯定证据是()。

- A. 瘫痪的程度
- B. 昏迷程度

- C. 血压高低
- D. 脑脊液检查
- E. 头颅 CT

参考答案：E

[单选题]24. 下列关于透视的说法错误的是()。

- A. 操作方便，费用低
- B. 可多位置观察
- C. 能观察器官的动态情况
- D. 图像的对比度及清晰度高
- E. 马上有结果

参考答案：D

参考解析：荧光透视为普通 X 线检查方法，其优势主要有可动态观察，通过转动患者的体位进行多方向的观察，可实时了解器官的动态变化，如心脏的搏动、膈肌的运动、胃肠蠕动等；操作简单，费用低廉等。不足之处主要有图像的对比度及清晰度较差，难于观察密度与厚度差别小的器官以及密度与厚度较大的部位；同时 X 线剂量也相对较大。

[单选题]25. 产妇产后排尿不畅或完全不能排尿的原因不包括()。

- A. 膀胱尿道水肿
- B. 疼痛
- C. 不习惯卧床排尿
- D. 膀胱尿道撕裂伤
- E. 膀胱尿道收缩无力

参考答案：D

参考解析：产后排尿无力的病因包括胎头过大或产妇宫缩无力致使第二产程延长胎头压迫膀胱尿道时间过长，致使膀胱尿道水肿收缩无力，尿液潴留于膀胱内。有的产妇因会阴侧切伤后疼痛或不习惯卧床排尿以致加重排尿不畅。产程中可并发会阴撕裂伤。故正确答案为 D 项。

[单选题]26. 患者，男，10 岁，体检发现心脏杂音，首选的影像学检查为()。

- A. X 线片
- B. CT 扫描
- C. MRI 检查
- D. 超声检查
- E. ECT 检查

参考答案：D

参考解析：临床上对于怀疑先天性心脏病患者，首选的影像学检查方法为超声心动图检查，因为它能够清楚地观察心脏内部结构的器质性及功能性病变，能够观察血流动情况，同时能够定量的测量心脏多种参数，同时可测量心脏的功能。

[单选题]27. 下列哪项检查不属于 X 线检查中的特殊检查? ()

- A. 体层摄影
- B. 软 X 线摄影
- C. 高千伏摄影
- D. 放大摄影
- E. 透视

参考答案: E

参考解析: X 线检查分为普通检查及特殊检查, 普通检查包括荧光透视及 X 线摄影, 特殊检查包括体层摄影、软 X 线摄影、放大摄影及高电压摄影等。

[单选题]28. 某患者突然发生右侧额纹消失, 右侧眼裂较左侧大, 露齿口角偏向左侧, 可能是()。

- A. 右侧中枢性面瘫
- B. 左侧中枢性面瘫
- C. 右侧周围性面瘫
- D. 左侧周围性面瘫
- E. 双侧周围性面瘫

参考答案: C

参考解析: 中枢性和周围性面瘫主要区别在于后者整个半侧面部表情肌瘫痪, 而前者只有下半面部表情肌瘫痪。

[单选题]29. 非药物状态下二次或二次以上非同日多次重复测量血压高于以下哪项时, 可诊断为高血压? ()

- A. 135/85mmHg
- B. 125/80mmHg
- C. 140/90mmHg
- D. 120/70mmHg
- E. 130/80mmHg

参考答案: C

[单选题]30. 葡萄球菌侵入睑板腺所致的急性化脓性炎症称为()。

- A. 鳞屑性睑缘炎
- B. 溃疡性睑缘炎
- C. 眦性睑缘炎
- D. 外睑腺炎
- E. 内睑腺炎

参考答案: E

参考解析: 睑腺炎又称为麦粒肿, 睑缘疔。为葡萄球菌侵入睫毛根部皮脂或睑板腺而致的急性化脓性炎症。前者为外睑腺炎, 后者为内睑腺炎。葡萄球菌侵入睑板腺而致的急性化脓性炎症为内睑腺炎。故正确答案为 E 项。

[单选题]31. 普通 CT 的检查技术不包括()。

- A. 平扫
- B. 冠状动脉造影检查
- C. 增强扫描
- D. 高分辨率扫描
- E. 动态扫描

参考答案：B

参考解析：普通CT，又称常规CT，能做平扫、增强扫描、高分辨率CT扫描、动态扫描等，也能做多幅重建和三维重建等，但是由于不能克服心脏的搏动所致的运动伪影，因此普通CT不能进行心脏冠状动脉造影检查。

[单选题]32. 视神经炎的视野改变表现为()。

- A. 有中央暗点或傍中央暗点
- B. 生理盲点扩大
- C. 周边视野无明显改变
- D. 可表现同向偏盲
- E. 可表现象限盲

参考答案：A

参考解析：视神经炎视野改变表现为：多数患者有中央暗点或傍中央暗点，生理盲点不扩大，周边视野呈向心性缩小或楔形缺损。同向偏盲及象限盲为视束或视辐射病变所致。故正确答案为A项。

[单选题]33. 支气管哮喘发作时以下描述错误的是()。

- A. 一秒钟用力呼气量上升
- B. 一秒钟用力呼气量占用力肺活量比值下降
- C. 最大呼气中期流速值下降
- D. 呼气流速峰值下降
- E. 残气占肺总量百分比上升

参考答案：A

参考解析：支气管哮喘发作时，表现为呼气性通气功能障碍。有关呼气流速的全部指标均下降，包括一秒钟用力呼气量、一秒钟用力呼气量占用力肺活量比值、最大呼气中期流速值、呼气流速峰值。另可有肺活量减少、残气容积增加、功能残气量和肺总量增加，残气占肺总量百分比增高。故本题的正确答案是A项。

[单选题]34. 小儿8个月，突然抽搐，发作时神志不清，持续2分钟后自行缓解，无发热，3天内发作4次，血钙 $1.73\mu\text{mol/L}$ ，血糖 $4\text{mmol/L}$ 。诊断为()。

- A. 低血糖
- B. 维生素D缺乏性手足搐搦症
- C. 化脓性脑炎
- D. 婴儿痉挛症
- E. 低镁血症

参考答案：B

参考解析：患儿表现为无热抽搐，血糖正常，故A项不是，醒后活泼如常，C项也可排除，醒后活泼如常，血钙 $1.73\mu\text{mol/L}$ ，降低，选B项。

[单选题]35. 关节脱位的特有体征是()。

- A. 肿胀、畸形、功能障碍
- B. 压痛、肿胀、瘀斑
- C. 畸形、反常活动、关节空虚
- D. 畸形、反常活动、弹性固定
- E. 畸形、弹性固定、关节空虚

参考答案：E

[单选题]36. 脊髓型颈椎间盘突出症的诊断依据是()。

- A. 颈肩痛、手麻
- B. 一侧或双侧上肢麻，持物不稳
- C. 头痛、眼痛，吞咽困难，面部出汗异常
- D. 四肢麻或四肢瘫、病理反射、脊髓造影有梗阻，MRI示有椎间盘后突，硬膜囊受压
- E. 痛觉、触觉。温度觉分离、肌萎缩或挛缩

参考答案：D

[单选题]37. 临床上常用的甘露醇为()。

- A. 20%的高渗溶液
- B. 25%的高渗溶液
- C. 30%的高渗溶液
- D. 35%的高渗溶液
- E. 40%的高渗溶液

参考答案：A

参考解析：甘露醇，临床主要用20%的高渗溶液。①特点：静脉注射有组织脱水作用和利尿作用，可降低颅内压和眼内压；血液水分的增多而使循环血容量及。肾小球滤过率增加，并减少对NaCl和水的再吸收。同时还能扩张肾小管、增加肾髓质血流量；使髓质间液Na和尿素易随血流移走。②临床应用：用于脑外伤、脑瘤、脑膜炎等的脑水肿和青光眼的治疗。还用于急性肾衰竭的预防，改善急性肾衰竭早期的血流动力学，保护肾小管免于坏死。

[单选题]38. 慢性支气管炎患者发作期，未得到病原体及药物敏感试验结果前，首选的抗生素为()。

- A. 头孢曲松
- B. 甲硝唑
- C. 利福平
- D. 庆大霉素
- E. 异烟肼

参考答案：A

参考解析：慢性支气管炎发作期，未得到病原体及药物敏感试验结果前，首先应选择广谱抗生素或针对革兰阳性球菌的抗生素抗感染，包括大环内酯类、青霉素类、喹诺酮类、头孢菌素类。头孢曲松是一个三代头孢菌素类抗生素，故应选择。而其他选项均不属于上述各类，甲硝唑主要针对厌氧菌；利福平、异烟肼主要针对结核杆菌；庆大霉素主要针对革兰阴性杆菌。

[单选题]39. 9个月男孩，咳嗽，喘息3天，呼吸增快，心率150次/分，喘憋，两肺可闻及广泛哮鸣音，诊断：毛细支气管炎，该患儿的治疗加用何种药物对缓解喘憋效果最好？()

- A.  $\alpha$ -糜蛋白酶雾化吸入
- B. 氨茶碱
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 异丙肾上腺素
- E. 肾上腺素

参考答案：C

参考解析：糖皮质激素可减少炎性渗出物，解除支气管痉挛，改善血管通透性，对缓解喘憋效果最好。

[单选题]40. 关于银屑病的概念描述最准确的是()。

- A. 俗称“手足癣”
- B. 急性炎症渗出性皮肤病
- C. 呈单次发作性病程
- D. 表皮细胞过度增殖性慢性炎症性皮肤病
- E. 为皮肤渗出性炎症与增殖性炎症交替的皮肤病变

参考答案：D

参考解析：备选答案是关于银屑病的概念描述，属于记忆题，银屑病是一种复发性的表皮细胞过度增殖性慢性炎症性皮肤病，俗称“牛皮癣”。考生应当掌握银屑病的定义，选项中描述最准确的是表皮细胞过度增殖性慢性炎症性皮肤病。这就是正确答案D项。

[单选题]41. 抗菌活性是指()。

- A. 抗菌药物的抗菌范围
- B. 药物抑制或杀灭微生物的能力
- C. 抑制培养基内细菌生长的最低药物浓度
- D. 杀灭培养基内细菌的最低药物浓度
- E. 影响细菌胞浆膜的通透性

参考答案：B

参考解析：抗菌活性是指药物抑制或杀灭微生物的能力。能够抑制培养基内细菌生长的最低浓度称之为最低抑菌浓度(MIC)；能够杀灭培养基内细菌的最低浓度称之为最低杀菌浓度(MBC)。

单选题]42. 心身疾病与神经症的区别在于()。

- A.以心理、社会因素为重要病因
- B.病因由多种因素联合作用所致
- C.躯体不适有一定病理生理和病理形态学改变
- D.有一定的人格特征
- E.具有自知力

参考答案：C

参考解析：心身疾病与神经症的起病均以心理、社会因素多种因素为重要病因，患者有一定的人格特征，自知力均相对保持完整。神经症患者虽然主诉繁多，但却没有相应的躯体疾病与之相联系，躯体不适有一定病理生理和病理形态学改变是两者的重要区别。故正确答案为C项。

[单选题]43. 患者，男性，45岁，1月来逐渐感到乏力，面色苍白，一周前无特殊原因突然寒战，高热，全身皮下及口腔黏膜出血，头痛，乏力，心悸进行性加重，血红蛋白下降至60g/L，RBC $2.10 \times 10^{12}/L$ ，WBC $10.8 \times 10^9/L$ ，分类：中性粒细胞25%，淋巴细胞74%，单核细胞1%，PLT $15 \times 10^9/L$ ，网织红细胞0.3%。骨髓增生减低，粒系，红系及巨核系均明显减少，成熟淋巴细胞占68%，组织嗜碱细胞易见，本病最可能诊断为()。

- A.粒细胞缺乏症
- B.再生障碍性贫血（急性型）
- C.急性感染
- D.急性型ITP
- E.MDS

参考答案：B

参考解析：本例知识点为再生障碍性贫血（简称再障）的诊断。再障是一种多能干细胞疾病，分急性型和慢性型。急性型再障：多数起病急，症状较重，早期突出的症状是感染和出血。高热、畏寒、出汗、口腔或咽部溃疡、皮肤感染、肺炎均较多见，重者可因败血症而死亡，皮肤瘀点、瘀斑、鼻出血、齿龈出血、消化道出血、女性月经过多等出血症状较多见。这类病例病情险恶、病程短促。外周血象：全血细胞减少为最主要的特点，但红细胞、粒细胞和血小板的减少程度不等，网织红细胞减低。骨髓象：急性病例的骨髓穿刺物中骨髓小粒很少，脂肪滴显然增多，镜下，骨髓增生减低或重度减低，有核细胞显著减少，主要是粒及红系细胞减少，巨核细胞减少或消失。淋巴细胞比例增多，非造血细胞如浆细胞、组织细胞和组织嗜碱细胞增多。骨髓活检：骨髓活检病理切片上造血组织显著减少，代替以脂肪组织，其间有淋巴细胞、浆细胞和组织细胞分布在疏松的间质中。

[单选题]44. 合理用药原则包括()。

- A.明确诊断；根据药理学特点选药；掌握各种影响药效的因素；祛邪扶正并举；对患者始终负责

- 明确诊断；根据药理学特点选药；掌握各种影响药效的因素
- C.根据药理学特点选药；掌握各种影响药效的因素；祛邪扶正并举；对患者始终负责
- D.掌握各种影响药效的因素；祛邪扶正并举；对患者始终负责
- E.根据药理学特点选药；掌握各种影响药效的因素；祛邪扶正并举

参考答案：A

参考解析：合理用药原则包括下列五个方面。①明确诊断：选药不仅要针对适应证还要排除禁忌证。②根据药理学特点选药：尽量少用所谓的“撒网疗法”，这样不仅浪费而且容易发生相互作用。③掌握各种影响药效的因素：用药必须个体化，不能单纯公式化。④祛邪扶正并举：在采用对因治疗的同时要采用对症支持疗法。⑤对患者始终负责：需严密观察病情反应，及时调整剂量或更换治疗药物。题中只有A项叙述全面。故选A项。

[单选题]45. 下列关于复发性口疮的描述，不正确的是()。

- A.以小型口疮最多见
- B.小型口疮溃疡常有多个，7~10天后自愈，不留瘢痕
- C.口炎性口疮溃疡数目多，可达数十甚至上百个
- D.小型口疮溃疡以舌腹、口底多见
- E.口炎性口疮可有头痛发烧等全身症状

参考答案：D

参考解析：轻型（小型）口疮最多见，好发唇、颊、舌、口底等非角化黏膜区，溃疡常有多个7~10天后自愈，不留瘢痕，但间隔一段时间又复发；疱疹样口炎亦称口炎性口疮，疱疹样口疮，此型特点为溃疡数目多，可达数十甚至上百个，散在分布于口腔黏膜的任何部位，较轻型口疮疼痛剧烈，个别患者有头痛、发热等全身症状。以舌腹、口底多见。故正确答案为D项。

[单选题]46. 下列哪项属于化疗引起的远期不良反应?()

- A.骨髓抑制
- B.神经毒性
- C.胃肠道反应
- D.第二肿瘤
- E.肾功能损害

参考答案：D

[单选题]47.PET 应用的是下列哪个粒子来成像?()

- A.正电子
- B.单光子
- C.X射线
- D.α粒子
- E.β粒子

参考答案：A

PET) 是指利用正电子衰变核素标记的放射性药物在人体内放出的正电子与组织相互作用, 发生正电子湮灭向相反的方向发射两个能量为  $511\text{keV}$  光子, 将这两个呈相反方向的光子所产生的电脉冲记录下来, 送入显像系统, 计算机以此闪烁数据为基础, 即生成 PET 显像。

[单选题]48. 属于继发性痛经的病因是 ()。

- A. 内生殖器炎症
- B. 精神紧张
- C. 体质虚弱
- D. 经血流出不畅
- E. 子宫过度倾屈

参考答案: A

参考解析: 原发性痛经与精神紧张、体质虚弱有关, 或因经血流出不畅所致。原发性痛经者常有子宫发育不良、宫颈口或宫颈管狭窄、子宫过度倾屈。继发性痛经多由内生殖器炎症, 盆腔充血所致。故正确答案为 A 项。

[单选题]49. 伴有糖尿病或肾脏病的高血压患者降压目标值为 ()。

- A.  $135/85\text{mmHg}$  以下
- B.  $125/80\text{mmHg}$  以下
- C.  $140/90\text{mmHg}$  以下
- D.  $120/70\text{mmHg}$  以下
- E.  $130/85\text{mmHg}$  以下

参考答案: E

[单选题]50. 关于骨折的治疗原则, 下列哪项是正确的? ()

- A. 复位、固定及内外用药
- B. 复位、功能锻炼及内外用药
- C. 复位、固定及功能锻炼
- D. 复位、固定
- E. 固定、功能锻炼及内外用药

参考答案: C

[单选题]51. 决定出血时间长短的因素是下列哪一项? ()

- A. 因子 VIII 和 XII 减少
- B. 血小板数量和功能异常
- C. 因子 V 和 II 减少
- D. 因子 XII 和 XII 减少
- E. 因子 V 和 VII 减少

参考答案: B

参考解析: 出血时间是指皮肤微血管经人工刺破后, 血液流出到自行停止的时间。BT 异常原因: ①血小板大量减少或血小板功能缺陷为主要原因: 如血小板减少性紫癜、急性白血病、再生障碍性贫血、肝硬化、脾功能亢进造成的血小

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277064146005006026>