

护理技能理论知识考核试题

一、选择题

(1 题共用题干) 患者, 女, 46 岁, 外伤致右侧肋骨骨折, 出现皮下气肿, 且越来越重, 呼吸困难, 咳血痰, 脉搏细数, 指端发凉, 右侧胸部呼吸音消失, 胸部 X 线检查可见液平面。

1. 现患者行胸腔闭式引流护士鼓励其咳嗽和深呼吸, 目的是 () [单选题] *

- A. 增加氧供
- B. 防止液体回流
- C. 保持引流通畅
- D. 促进液体、气体排出及肺复张 ✓
- E. 呼吸功能锻炼

2. 护理中保证水封瓶长管没入水中 3-4cm 的目的是 () [单选题] *

- A. 保持一定的压力
- B. 防止逆行感染
- C. 保持管道密闭性 ✓
- D. 有助于观察水柱波动情况
- E. 液体量少, 便于更换装置

3. 该患者的胸腔闭式引流管长管中水柱波动范围为 15-20cm 提示 () [单选题] *

- A. 可能存在肺不张 ✓
- B. 肺已完全复张

- C.引流不通畅
- D.患者肺活量增大
- E.液体引流效果好

(4 题共用题干) 患者, 女, 30 岁, 颈部增粗, 伴食欲亢进、消瘦、手颤、怕热、多汗半年, 以原发性甲亢收入院。查体: 眼球突出, 眼裂增大, 甲状腺弥漫性肿大、质软、可触及震颤, 闻及血管杂音。血压 140/90mmHg, 脉搏 120 次/分, 准备手术治疗。

4 . 该患者应用以下哪种药物进行术前准备 () [单选题] *

- A.阿托品
- B.普奈洛尔
- C.复方碘化钾 ✓
- D 钙剂
- E.甲状腺片

5 . 服药方法为 () [单选题] *

- A.每日 3 次, 从 3 滴开始, 逐日增加 1 滴至 16 滴维持 ✓
- B.每日 2 次, 从 10 滴开始, 逐日增加 1 滴至 20 滴
- C.每日 15 滴开始, 每日 2 次, 逐日减少至 5 滴维持
- D.每日 15 滴开始, 每日 2 次, 逐日减少至 3 滴维持
- E.每日 2 次从 5 滴开始, 逐日增加 1 滴至 15 滴维持

6 . 患者, 刘某, 41 岁, 因交通事故致伤昏迷, 3 小时后入院, 患者处于昏迷状态, 呼之不应, 但按压眶上神经有反应, 左侧瞳孔散大, 对光反射迟钝。入院第 2 天, 血压 150/100mmHg, 脉搏缓慢有力, 呼吸深而慢, 时而躁动、呕吐, 按压口匡上神经无反应, 左侧瞳孔散大, 对光反射消失, 右侧肢体瘫痪, 病理反射阳性。若进行手术治疗, 则手术后护理的是 () [单选题] *

- A.高渗性脱水药 20%甘露醇 250ml 要在 1 小时内快速静脉滴注

- B.冬眠疗法可先用物理降温，再遵医嘱静滴冬眠药物
- C.冬眠疗法降温速度以每小时下降 2。C 为宜
- D.脱水治疗期间不需记录出入液量
- E.防止压疮、呼吸道和泌尿道感染等并发症 ✓

(7-9 题共用题干) 患者，女性，39 岁，因排尿异常入院，诊断为急性泌尿系感染。

7 .下列情况最可能出现于该患者的是 () [单选题] *

A 一天排尿次数 3-5 次

8 .离心尿检每高倍视野白细胞超过 5 个 ✓

C.膀胱容量 300m1

D 每次尿量 400m1

E.24 小时尿量 400m1

8. 患者有肉眼血尿, 下列叙述的是 () [单选题] *

A.初始血尿提示出血部位在膀胱三角

B.1000m1 尿液含 0.5m1 血液

C.全程血尿提示出血部位在膀胱或者以下部位

D.其尿液镜下每高倍视野可见 2 个红细胞

E.终末血尿提示出血在后尿道或者膀胱三角区 ✓

9. 为进一步诊治该患者需要做血管造影明确肾脏情况，下列叙述错误的是 () [单选题]

A.造影后鼓励患者多饮水

B.造影后局部加压包扎，平卧 6 小时 ✓

C.造影后观察足背动脉搏动情况

D.造影前做碘过敏试验

E.有出血倾向的患者不宜做该检查

(10 1题共用题干) 某女性,患者,40岁。因腹痛、寒战高热恶心呕吐及黄疸2天入院,查体:T40。& P200次/分、BP90/50mmHg,表情淡漠,剑突下压痛明显,白细胞 $55.0 \times 10^9/L$ 。诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎,休克。

10. 此患者属于哪一类休克() [单选题] *

- A. 感染性休克 ✓
- B. 过敏性休克
- C. 创伤性休克
- D. 失血性休克
- E. 心源性休克

11. 在休克的同时,应首先采取的治疗措施为() [单选题] *

- A. 吸氧
- B. 降温
- C. 行胆管切开引流术 ✓
- D. 纠正酸碱平衡紊乱
- E. 输血

12. 手术前护理时,观察要点不包括以下那一项() [单选题] *

- A. 生命体征及神志变化
- B. 腹部症状及生命体征
- C. 及时了解实验检查结果
- D. 患者皮肤瘙痒是否减轻 ✓

E.记录 24 小时出入量

(13-15 题共用题干) 患者, 男, 23 岁, 因车祸致头部受伤, 伤后当即昏迷 1 小时, 清醒后诉头痛, 有呕吐, 右上肢肌无力 2 级, 脑脊液检查有红细胞, CT 扫描见左额顶叶低密度灶, 其中有散在点状高密度影。

13. 根据患者目前表现符合 () [单选题] *

- A.脑震荡
- B.弥散性轴索损伤
- C.脑挫裂伤 ✓
- D.脑干损伤
- E.颅内血肿

14. 目前的关键处理措施是 () [单选题] *

- A.静卧
- B.床头抬高 15°-30°
- C.营养支持
- D.应用抗生素
- E.防止脑水肿 ✓

15. 目前患者病情观察的重点在于及时发现 () [单选题] *

- A.呼吸道梗阻
- B.颅内压增高、脑疝 ✓
- C.压疮
- D.水、电解质紊乱
- E.感染

(16-18 题共用题干) 患者, 男, 24 岁, 头部外伤后持续头痛, 呕吐数次, 嗜睡, 急诊入院, CT 检查显示颅内占位, 初步诊断: 颅页内占位伴颅内压增高。

16.下列哪项是颅内压增高的三主征表现之一（） [单选题] *

A.呼吸慢而有力

B.脉搏慢而有力

C.视乳头水肿 ✓

D.脉压增大

E.血压升高

17.当前首要的处理是（） [单选题] *

A.给予镇痛处理，休息1周

B.给予止呕处理，休息1周

C.急诊行开颅减压术

D.密切监测各项生命体征

E.给予脱水利尿治疗，同时进一步检查 ✓

18.患者如果采用脱水治疗，下列描述不的是（） [单选题] *

A.20%甘露醇 250ml,30 分钟内快速静脉滴注

B.1-2 小时后甘露醇可重复使用 ✓

C.同时使用利尿剂效果更好

D.停用脱水剂时，应逐渐减量

E.脱水治疗期间，应准确记录出入量

（19-20 题共用题干）患者，男，30 岁，5 年前健身练哑铃后，反复出现右侧阴囊肿块，夜间平卧时肿块消失。近日因感冒咳嗽多日，今日发现肿块又突然出现，腹痛腹胀、恶心，3 日未排便，查体可见右侧阴囊红肿，可见一梨状肿块，平卧后肿块不消失。

19. 该患者最有可能的诊断是（） [单选题]

A.嵌顿性腹股沟直疝

B.嵌顿性腹股沟斜疝 ✓

C.绞窄性股疝

D.睾丸挫伤

E.睾丸扭转

20 .腹外疝术后，护士应告知患者（） [单选题] *

A.8 小时后可进行床边活动

21 24 小时后可在病区走廊散步

C.一周后可恢复工作

D.3 个月内不宜从事重体力劳动 ✓

E.终身不宜从事体力劳动

（21 2题共用题干）患者，男，28 岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：

体温 38.8。：，脉搏 118 次/分，血压 118/78mmHg, 右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室

检查：白细胞 $14.5 \times 10^9/l$,中性粒细胞比例 0.82

21.该患者阑尾位置最可能位于（） [单选题] *

A.靠近闭孔外肌

B.腰大肌前方 ✓

C.盲肠中位

D.腰大肌后方

E.腰大肌侧面

22.根据患者的临床表现，判断下列最不可能出现的情况为（） [单选题] *

A.阑尾穿孔

B.阑尾化脓感染

C.阑尾坏疽

D.炎性渗出

E.炎症局限于粘膜下层 ✓

23. 针对患者目前情况，下列措施不妥当的是（） [单选题] *

A.手术下切除阑尾

B.腹腔镜下切除阑尾

C.阑尾切除

D.阑尾切除+腹腔引流管置入

E.非手术治疗 ✓

（24-26 题共用题干）患者，女，48 岁，体重 60kg, 在厨房做饭时，不小心将烧水壶打翻，导致双侧前臂和上臂、左侧大腿和小腿被开水烫伤，疼痛剧烈，可见小水泡，基底苍白潮红相间。

24. 护士判断其烧伤深度为（） [单选题] *

A.I 度

B.浅Ⅱ度

C.中度

D.深Ⅱ度 ✓

E.Ⅲ度

25 . 采用中国九分法估算其烧伤面积（） [单选题] *

A.29%

B.30%v

C.35%

D.37%

E.41%

26 .该患者第 1 个 24 小时需要补液的总量约为 () [单选题] *

A.4700m1v

B.5700m1

C.6060m1

D.7080m1

E.8000m1

27 某女士，30 岁，诊断为甲亢。清晨测得脉率 96 次/分，血压 130/70mmHg

(17.3/93KPaX 计算其基础代谢率应属于 () [单选题] *

A.正常

27 正常范围

C.重度甲亢

D.中度甲亢 ✓

E.轻度甲亢

28. 患者，女，35 岁。双手深 II 度烧伤康复期。护士指导其双手平时的放置位置是 () [单选题]

A.握拳位

B.半握拳位 ✓

C.伸直位

D.半伸直位

E.双手互握

29. 护士查房时观察到某急性胰腺炎患者偶有阵发性的肌肉抽搐，最可能的病因是（） [单选题] *

A.低钙反应 ✓

B.疼痛反应

C.营养失调导致

D.精神高度紧张导致

E.使用哌替啶后反应正常

30. 关于代谢性酸中毒，以下哪项（） [单选题] *

A.pH↓,PaCO₂↑,HCO₃⁻-T

B.pH↑,PaCO₂↓,HCO₃⁻-1

C.pH↓,PaCO₂↓,HCO₃⁻-T

D.pH↓,PaCO₂↑,HCO₃⁻-W

E.pH↓,PaCO₂↓,HCO₃⁻-I

31. 患者，男性，28岁，被撞倒后左肘部着地，出现上臂剧烈疼痛而就诊。检查发现伤侧肘部肿胀、压痛明显，并有假关节活动、畸形、骨摩擦音。左上肢比右上肢缩短2cm。若治疗期间患者出现了进行性呼吸困难、体温升高、心率快、血压升高和意识障碍，该患者可能并发了（） [单选题] *

A.休克

B.脂肪栓塞 ✓

C.桡神经损伤

D.脊髓损伤

E.急性骨筋膜室综合征

32. 患者，男，35岁，夕M用性大量血胸5周后仍有伤侧肺受压萎缩，胸部X线片显示大片密度增高阴影，术后曾行胸腔闭式引流治疗。采用下列哪种治疗方法最合适（） [单选题] *

- A. 输血、输液
- B. 胸腔穿刺排除液体
- C. 闭式胸腔引流
- D. 纤维支气管镜检查
- E. 胸膜纤维板剥除术 ✓

33. 患者，男性，40岁。10年前曾患乙型肝炎，肝功能一直不稳定。最近3周来，右上腹胀痛明显，巩膜黄染，未处理。今上午突然剧烈腹痛，出冷汗而急诊来院。此时的护理应重点观察（） [单选题] *

- A. 肝性脑病的先兆表现
- B. 癌结节破裂出血引起的休克 ✓
- C. 腹水的情况
- D. 有无血行转移征象
- E. 肝功能进展如何

34. 患者，女性，42岁。自6米高处跌下1小时，腹痛，腹肌紧张，伴压痛和反跳痛，肠鸣音弱，血压100/60mmHg，脉率132次/分，X线摄片显示：右第9、10肋骨骨折，右膈肌升高。应考虑为（） [单选题] *

- A. 肝破裂 ✓
- B. 脾破裂
- C. 十二指肠破裂
- D. 胰腺破裂
- E. 结肠破裂

35 .患者，女性，26岁。车祸致头部受伤后当即昏迷，20分钟后逐渐清醒，1天后出现烦躁、头痛、呕吐，随后再次昏迷。体检：伤侧瞳孔散大，对光反射消失，对侧肢体不完全性瘫痪、巴宾斯基征（+），应考虑为

（） [单选题] *

A.脑震荡

36 慢性硬膜下血肿

C.原发性脑干损伤

D.硬脑膜外血肿 ✓

E.急性硬脑膜下血肿

36.患者，男性，60岁。行食管癌切除术，术后胃管保留时间，一般至少为（） [单选题] *

A.1-2天

B.3-4天 ✓

C.5-6天

D.7-10天

E.11-14天

37.女,37岁,腹膜炎致麻痹性肠梗阻,提示其肠麻痹的主要指征是（） [单选题] *

A.闻及振水音

B.肠鸣音亢进

C.肠鸣音消失 ✓

D.移动性浊音阳性

E.闻及血管杂音

38.患者，女，45岁。5年来时常便血，量少，或滴出，或附在粪便表面，无痛，经检查，诊断为内痔，其

扩大曲张的血管主要是（） [单选题] *

A.直肠上静脉丛 ✓

B.直肠下静脉丛

C.直肠上下静脉丛

D.直肠上动脉

E.直肠下动脉

39. 男性，19岁。右股骨下端疼痛3个月，夜间尤甚。查体：右股骨下端偏内侧局限性隆起，皮温略高，皮肤浅静脉怒张，明显压痛，膝关节运动受限。X线检查，股骨下端溶骨性骨破坏，可见Codman三角。诊断为

（） [单选题] *

A.软骨肉瘤

B.纤维肉瘤

C.骨肉瘤 ✓

D.骨巨细胞瘤

E.尤文肉瘤

（40 42题共用题干）患者，女，36岁，中学教师，近年来，感觉双下肢站立后沉重酸胀，易疲乏，休息后症状减轻。

40. 最可能的原因是（） [单选题] *

A.下肢静脉曲张 ✓

B.动静脉瘘

C.深静脉血栓形成

D.血栓闭塞性脉管炎

E.动脉硬化闭塞

41. 入院检查后，决定先采用非手术治疗，以下护理措施中错误的是（） [单选题] *

A.穿弹力袜

B.局部血管注射硬化剂

C.避免久站

D.保持大便通畅

E.应久坐休息 ✓

42.若采用非手术治疗后，症状改善不明显，必须行手术治疗，以下护理措施错误的是（） [单选题] *

A.密切观察病情变化

B.术前皮肤准备

C.术后抬高患肢

D.术后绝对卧床 ✓

E.术后弹力绷带包扎

（43-45 题共用题干）患者，男性，18 岁，因外出春游出现咳嗽、咳白粘痰伴喘息 1 天入院，体检：T36.5℃，P90 次/分，R28 次/分，BP120/80mmHg，在肺部可闻及广泛哮鸣音，既往有过敏史。

43. 该患者本次发作最可能的诱因是（） [单选题] *

A.碰 ✓

B.尘螨

C.动物的毛屑

D.病毒感染

E.精神因素

44. 吸入沙丁胺醇等药物后，患者症状无明显缓解，呈端坐呼吸、大汗淋漓，讲话仅可说单字，此时可判断患

者病情为 () [单选题] *

A.混合性哮喘

B.中度哮喘

C.重度哮喘 ✓

D.合并左心衰

E.合并右心衰

45 . 患者女,56 岁,COPD 病史 5 年。因受凉并发肺部感染咳嗽、咳痰入院。血气分析

PaO₂50mmHg,PaCO₂55mmHg,pH7.35。护士此时给予患者吸氧,应给予的氧流量应为 () [单选题] *

A.1-2L/min

B.2-3L/min

C.3-4L/min

D.4-5L/min

E.5-6L/min

(46-48 题共用题干) 患者,男性,71 岁,慢性咳嗽咳痰 18 余年,近 5 年来活动后气急,1 周前感冒后痰多,气急加剧近 2 天来嗜睡。化验白细胞 18.6×10⁹/L,中性粒细胞 0.9,pH7.29,PaCO₂80mmHg,PaO₂48mmHg_β

46 . 该患者最可能的诊断为 () [单选题] *

A.I 型呼吸衰竭

B.Ⅱ 型呼吸衰竭 ✓

C.呼吸窘迫综合征

D.支气管哮喘急性发作

E.急性支气管炎

47. 患者出现头胀、神志恍惚、躁狂谓语等应考虑 () [单选题] *

A.呼吸性酸中毒

B.肺性脑病 ✓

C.窒息先兆

D.休克早期

E.脑疝出现

48. 若经药物治疗无效，患者自主呼吸停止，应立即给予 () [单选题] *

A 气管切开+机械通气

B.清理呼吸道

C.气管插管+机械通气 ✓

D.高浓度吸氧

E.胸外心脏按压

(49 50题共用题干) 患者, 男性, 26 岁。昨晚 9 时突发两眼上翻, 牙关紧闭, 口吐白沫, 双上肢屈曲, 双拳紧握, 双下肢伸直, 持续约 30 秒, 患者仍神志不清, 间隔 20 分钟后, 再次出现此症状, 持续约 10 秒, 有小便失禁, 约 3 小时后, 患者能唤醒, 但有烦躁。为进一步诊治入院。

49. 控制癫痫持续状态的首选药物是 () [单选题] *

A.地西洋 ✓

B.丙戊酸钠

C.氯丙嗪

D.卡马西平

E.苯妥英钠

50. 本病最具特征性的检查是 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286031230155010045>