

2024 年全国临床执业医师定期考核  
知识点试题库（内含答案）

一、选择题

1、以下哪项不是有机磷农药中毒的毒蕈碱样作用

- A. 肌肉强制性痉挛
- B. 心血管活动受抑制
- C. 瞳孔括约肌、睫状肌兴奋
- D. 消化道、呼吸道腺体兴奋
- E. 支气管、胃肠道平滑肌兴奋

正确答案：A

2、关于腹透中心医师和护士与患者的比例说法错误的是：

- A. 患：医：护=20~30：1：1
- B. 每增加 50 例患者需增加专职护士 1 名
- C. 每增加 50 例患者需增加专职医师 1 名
- D. 每增加 80 例患者需增加专职医师 1 名

正确答案：C

3、在 INTERSTROKE 中人群危险因素对卒中风险之比最高的危险因素是以下哪一项？

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 酒精摄入
- D. 体力活动

正确答案：A

4、下列疾病可有血淀粉酶增高，除了

- A. 急性胰腺炎
- B. 胆囊炎
- C. 结肠癌
- D. 十二指肠球部后壁穿透性溃疡
- E. 急性肠梗阻

正确答案：C

需要与急性胰腺炎进行鉴别的疾病包括：消化性溃疡急性穿孔，胆石症和急性胆囊炎，急性肠梗阻，心肌梗死，淀粉酶升高，但不超过正常值的 2 倍。

5、以按压颈动脉窦法治疗室上性心动过速，下列哪项不正确

- A. 老年人宜用此法
- B. 左、右两侧轮流按压
- C. 取胸锁乳突肌前缘平甲状软骨上缘搏动处按压
- D. 每次按压时间不超过 10-15 秒
- E. 听到心律减慢立即停压

正确答案：A

按压颈动脉窦法治疗室上性心动过速时应注意：取胸锁乳突肌前缘平甲状软骨上缘搏动处按压；左、右两侧轮流，不可同时按压；每次按压时间 5~10 秒；听到心律减慢立即停压；老年人不能用此法。

6、下列哪项检查对诊断肾病综合征是必需的

- A. 24 小时尿蛋白 > 3.5g
- B. 血浆白蛋白  $< 30\text{g/l}$
- C. 双下肢凹陷性浮肿
- D. 大量血尿
- E. 血胆固醇及甘油三酯升高

正确答案：A

肾病综合征的诊断标准是：①24 小时尿蛋白 > 3.5g；②血浆白蛋白  $< 30\text{g/l}$ ；③水肿；④高脂血症。其中①和②为必须具备。①为最基本表现，②为继发表现。故本题选 A。

7、严重的腺垂体功能减退症易发生低血糖主要是缺乏

- A. PR1 及 1H
- B. PR1 及 TSH
- C. PR1 及 ACTH
- D. GH 及 TSH
- E. GH 及 ACTH

正确答案：E

腺垂体功能减退症的临床表现包括肾上腺功能减退。由于 ACTH 缺乏，皮质醇分泌减少，对胰岛素敏感可有血糖降低，生长激素(GH)缺乏可加重低血糖发作。故选 E。

8、癌性胸水具有下列哪项特点

- A. 比重小于 1.018
- B. 蛋白含量低于  $3\text{g/dl}$
- C. 细胞总数不超过 100 个 /  $\mu\text{l}$

- D. LDH 含量高于血清
- E. 胸水蛋白/血清蛋白 V0.5

正确答案：D

癌性胸水应符合渗出液特点，包括：外观混浊或为血性，比重  $> 1.018$ 、细胞数  $> 500 \times 10^6 / L$ 、胸液李凡他试验(+)、蛋白含量， $30g/L$ 、符合 light 标准。

9、下列哪项是糖尿病患者最基础的治疗措施

- A. 饮食治疗
- B. 适当体育锻炼
- C. 双胍类降血糖药
- D. 磺脲类降血糖药
- E. 胰岛素

正确答案：C

医学营养治疗是糖尿病患者重要的基础治疗措施，应长期严格执行。对 T1DM 患者，在合适的总热量、食物成分、规则的餐饮安排等措施基础上，配合胰岛素治疗有利于控制高血糖和防止低血糖。对 T2DM 患者，尤其是肥胖或超重者，医学营养治疗有利于减轻体重，改善糖、脂代谢紊乱和高血压以及减少降糖药物剂量。

10、在糖尿病并发症和长期糖尿病患者中更为常见的症状是

- A. 胃肠道症状
- B. 日常活动量下降
- C. 低血糖症状
- D. 多器官功能衰竭

正确答案：A

11、有关 Cushing 综合征（皮质醇增多症）的叙述哪项是错误的

- A. 向心性肥胖，多毛，紫纹
- B. 病程长者可肌肉萎缩，骨质疏松
- C. 血中淋巴细胞及嗜酸粒细胞增多
- D. 葡萄糖耐量异常
- E. 血压增高

正确答案：C

12、胃十二指肠溃疡穿孔最重要的临床表现是

- A. 腹式呼吸减弱
- B. 突发的剧烈腹痛
- C. 恶心、呕吐
- D. 肠鸣音消失
- E. 发热

正确答案：B

上腹痛是消化性溃疡的主要症状。其疼痛性质多为灼痛,亦可为钝痛、胀痛、剧痛或饥饿样不适感;多位于中上腹,可偏右或偏左,一般为轻至中度持续性痛。亦有部分患者以出血、穿孔等并发症为首发症状。因此B为正确答案。

13、关于原发型肺结核,下列哪项描述是错误的

- A. 结核菌初次侵入机体,在肺内形成病变
- B. 病灶好发于胸膜下通气良好的部位
- C. 原发病灶吸收快
- D. 原发综合征包括原发病灶、淋巴管炎和肺门淋巴结炎
- E. 原发型肺结核多见于老年人

正确答案：E

原发型肺结核多见于少年儿童,而不是老年人,其余选项正确。

14、不能早期判断上消化道大出血的是

- A. 呕血量及持续时间
- B. 血红蛋白和红细胞下降
- C. 脉搏频数微弱
- D. 四肢厥冷和心慌
- E. 血压下降、呼吸急促或休克

正确答案：B

15、某甲亢患者应用抗甲状腺药物11个月时,白细胞计数降至 $18 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞30%,宜采用的措施是(单选题(A2))(1分)

- A. 继续原治疗方案,密切观察白细胞变化
- B. 继续原治疗方案,加升白细胞药物
- C. 停抗甲状腺药物,用升白细胞药物
- D. 抗甲状腺药物过量,加甲状腺片
- E. 停抗甲状腺药物,密切观察白细胞变化

正确答案：C

粒细胞减少是应用抗甲状腺药物时一个常见且重要的不良反应,严重减少时可发生粒细胞缺乏症,因此当 $WBC < 3 \times 10^9/L$ 或中性粒细胞 $< 1.5 \times 10^9/L$ 时应停用抗甲状腺药物,严密观察,并试用升白细胞药物,故本题选C。

16、霍乱流行时,预防和控制流行的主要措施是

- A. 治疗病人
- B. 隔离密切接触者
- C. 水和食品的消毒

- D. 保护易感人群
- E. 人群普遍接种疫苗

正确答案：C

17、女性，28岁。无高血压家族史，妊娠38周，门诊检查发现血压增高为180/100mmHg。经检查排除继发性高血压后，诊断为妊高症，该患者不宜降压选用以下哪种降压药

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 普萘洛尔（心得安）
- C. 硝苯地平
- D. 异山梨酯（消心痛）
- E. 地尔硫卓

正确答案：B

18、男性，75岁。因冠心病而服用他汀类调脂药，有糖尿病史，体型偏胖。半年后，复查血脂提示LDL-C 3.5 mmol/L，仍未达标，考虑患者年龄，避免增加药物副作用，加用调脂药，下面最合适的药物是

- A. 烟酸
- B. 普罗布考
- C. 依折麦布
- D. 非诺贝特
- E. 胆酸螯合剂

正确答案：C

19、下列哪项不是 Horner 综合征的特征性表现

- A. 眼睑下垂
- B. 瞳孔缩小
- C. 结膜充血
- D. 同侧额部与胸壁无汗或少汗
- E. 眼球内陷

正确答案：C

Horner 综合征包括：病侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、同侧额部与胸壁无汗。

20、糖尿病合并肺结核与单纯肺结核比较，治疗时间的异同点是

- A. 时间一样
- B. 时间延长一倍
- C. 时间延长两倍
- D. 时间延长一半
- E. 适当延长治疗时间

正确答案：E

糖尿病合并结核的化疗原则与单纯肺结核相同，只是治疗时间适当延长。

21、下列检查中，不能评价患者是否存在皮质醇增多症的试验是

- A. OGTT
- B. 血浆皮质醇节律测定
- C. 血浆 ACTH 测定
- D. 24 小时尿游离皮质醇测定
- E. 小剂量地塞米松抑制试验

正确答案：A

22、对结核性渗出性胸膜炎的治疗，下列哪项是最重要的

- A. 反复穿刺抽胸水
- B. 胸腔内注入氢化可的松
- C. 胸腔闭式引流
- D. 胸腔内注入抗结核药物
- E. 全身使用 2 种以上抗结核药物

正确答案：E

结核性胸膜炎治疗最重要的是规范化抗结核治疗。

23、结核球的直径大小

- A. 直径在 2~4cm 之间，多小于 2cm
- B. 直径在 4~5cm 之间，多小于 4cm
- C. 直径在 3~5cm 之间，多小于 5cm
- D. 直径在 1~2cm 之间，多小于 2cm
- E. 直径在 2~4cm 之间，多小于 3cm

正确答案：E

结核球多由于干酪样病变吸收和周边纤维膜包裹或干酪空洞阻塞性愈合而形成。结核球直径多在 2~4cm，多小于 3cm。

24、女性，18 岁。发热伴鼻出血 5 日。查体全身淋巴结肿大，皮肤散在出血斑，肝肋下 2cm，脾肋下 3cm，血红蛋白 80g/L，白细胞  $12 \times 10^9/L$ ，血小板  $40 \times 10^9/L$ ，骨髓增生活跃，原始细胞占 0.80，巨核细胞减少，糖原染色阳性。过氧化物酶染色阴性，非特异性酯酶阴性。首选治疗方案

- A. HA
- B. DA
- C. VP
- D. CHOP

E. MOPP

正确答案：C

根据题干中所述，提示为 A1, 过氧化物酶(PoX)和非特异性酯酶(NSE)均阴性提示为 A11, 长春新碱和泼尼松组成的 VP 方案是 A11 诱导缓解治疗的基本方案。故选 C。

25、当腹内有游离腹水出现移动性浊音时，腹腔游离腹水量最少应超过

A. 100ml

B. 200ml

C. 500ml

D. 1000ml

E. 2000ml

正确答案：D

26、患者女，48 岁。双手关节反复肿痛伴晨僵 1 年余，近二周疼痛加重伴晨僵，活动后缓解，首先考虑(单选题(A2))(1 分)

A. 骨性关节炎

B. 痛风

C. 银屑病关节炎

D. 类风湿关节炎

E. 风湿性关节炎

正确答案：D

类风湿关节炎的典型表现是对称性小关节肿痛伴晨僵，因此选 D。骨性关节炎多见于膝、髋、脊柱关节，掌指和腕关节较少受累，且活动后关节疼痛加重，故 A 错误。痛风患者男性占 95%，最易受累的是跖趾的跖趾关节，故 B 错误。银屑病关节炎的特征性表现为银屑病和指甲病变，故 C 错误。风湿性关节炎多表现为游走性多发性大关节炎，且多有心脏受累，故 E 错误。

27、心房扑动患者最常出现的房室传导比例为

A. 2:1 或 4:1

B. 3:1

C. 5:1

D. 6:1

E. 7:1

正确答案：A

多数未经治疗的心房扑动，房室传导比例是 2:1 或 4:1，心室率一般约为 150 次/分或 75 次/分。

28、提示系统性红斑狼疮病情活动的是

- A. 抗 SSA 抗体阳性
- B. 补体增高
- C. 抗双链 DNA 抗体阳性
- D. 抗核抗体阳性
- E. 抗 Sm 抗体阳性

正确答案：C

29、关于巨细胞动脉炎的诊断哪项不正确

- A. 年龄大于 50 岁
- B. 颞动脉有压痛，搏动增强
- C. 明显头痛
- D. 血沉增快
- E. 颞动脉病理检查提示血管炎

正确答案：B

巨细胞动脉炎的患者查体示：颞动脉有压痛，搏动应减弱，而不是增强。

30、不属于小细胞性贫血的是

- A. 缺铁性贫血
- B. 海洋性贫血
- C. 慢性感染性贫血
- D. 铁粒幼细胞性贫血
- E. 再生障碍性贫血

正确答案：E

小细胞性贫血的常见病因包括缺铁性贫血、海洋性贫血、慢性病性贫血及铁粒幼细胞性贫血等，故本题选 E。

31、到目前，类风湿关节炎的确切病因是

- A. 感染
- B. 遗传因素
- C. 免疫功能紊乱
- D. 环境因素
- E. 仍不明确

正确答案：E

32、休克患者动态监测中心静脉压值为 25CnIH20, 表示



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288127023027006037>