

中医眼科学试题及答案

1、青盲病机的关键是

- A. 玄府闭塞, 脉络不通
- B. 先天禀赋不足
- C. 邪毒外袭
- D. 七情所伤
- E. 酒色过度, 目力过劳

【答案】 A

2、眼周穴针刺后出针时应按压针孔, 目的是

- A. 施以补法
- B. 加强疗效
- C. 防止出血
- D. 止痛
- E. 临床习惯

【答案】 D

3、下列哪一种眼病不属于外障范畴

- A. 漏睛
- B. 白涩症
- C. 聚星障

D. 瞳神紧小

E. 胬肉攀睛

【答案】 D

4、风牵偏视经针. 药治疗半年余, 仍复视严重, 可行

A. 灸疗

B. 按摩疗法

C. 拔罐疗法

D. 药浴

E. 手术治疗

【答案】 E

5、络损暴盲, 眼底视网膜静脉纤曲扩张, 视网膜火焰状出血. 水肿, 胸胁胀痛, 或情志抑郁, 食少噎气, 或烦躁易怒; 舌有瘀斑, 脉涩。治疗宜选

A. 活血化瘀法

B. 凉血止血法

C. 泻肝降逆法

D. 泻火止血法

E. 息风活络法

【答案】 A

6、《秘传眼科龙木论》“此眼初患之时,皆因乳母多有吃食乖违,将息失度,爱食湿面五辛诸毒丹药,积热在腹,后此令胎中患眼,生后五六岁以来,不言不笑,睹无盼视,父母始觉。”指的是

- A. 目系暴盲
- B. 绿风内障
- C. 惊震内障
- D. 胎患内障
- E. 圆翳内障

【答案】D

7、能引起毒伤健眼的眼病是

- A. 异物入目
- B. 热烧伤
- C. 真睛破损
- D. 辐射性眼损伤
- E. 撞击伤目

【答案】C

8、混睛障的翳障形态特征是:

- A. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阳性
- B. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阴性
- C. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阳性

- D. 黑睛深层呈地图状灰白色混浊, 荧光素染色阴性
- E. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阴性

【答案】 B

9、黑睛疾病中医治疗原则除外以下哪一项

- A. 祛除病邪
- B. 补益肝肾
- C. 消除障翳
- D. 防止传变
- E. 促其早愈

【答案】 B

10、全科医疗的基本特征不包括

- A. 为社区居民提供连续性服务
- B. 提供以患者为中心的服务
- C. 提供以社区为基础的服务
- D. 提供以家庭为单位的服务
- E. 提供以家庭病床为主的服务

【答案】 E

11、络阻暴盲的主要特征是

- A. 视网膜渗出

- B. 视网膜脱离
- C. 黄斑区樱桃红斑
- D. 视网膜出血
- E. 黄斑区水肿

【答案】 C

12、房水排出眼球的主要通道是

- A. 角膜
- B. 虹膜
- C. 睫状体
- D. 晶状体
- E. 前房角

【答案】 E

【解析】

13、黑睛疾病中医治疗原则除外以下哪一项

- A. 祛除病邪
- B. 补益肝肾
- C. 消除障翳
- D. 防止传变
- E. 促其早愈

【答案】B

14、患者,男,28岁,车祸外伤后3个月,视盘色淡近苍白,头痛健忘,舌暗红有瘀点,脉细涩。下列哪一方剂适用

A. 四物五子丸

B. 逍遥散

C. 归脾汤

D. 桃红四物汤

E. 明目地黄汤

【答案】D

15、患者眼前黑影遮挡,视力骤降,血灌瞳神,全身伴急躁易怒,口苦咽干,胸胁胀痛,舌红苔黄,脉弦涩,治宜()

A. 清肝泻火,凉血止血

B. 滋阴降火,止血散瘀

C. 健脾养心,益气摄血

D. 行气活血,祛瘀通络

E. 疏肝解郁,和血明目

【答案】A

16、在五轮辨证中,险弦红赤湿烂当属

A. 肝胆火盛

B. 肝胆湿热

- C. 脾胃湿热
- D. 心火亢盛
- E. 肺脾实热

【答案】 C

17、下列哪种疾病为眼科急重症

- A. 针眼
- B. 胞生痰核
- C. 风赤疮痍
- D. 睑弦赤烂
- E. 眼丹

【答案】 E

18、治疗聚星障阴虚邪留证的主方是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 银翘散
- C. 加减地黄丸
- D. 四顺清凉饮子
- E. 三仁汤

【答案】 C

19、椒疮重症的并发症与后遗症有

A. 倒睫拳毛

B. 黑睛星翳

C. 赤膜下垂

D. 瞳神紧小

E. 眼珠干燥

【答案】 ABCE

20、根据五轮学说,两眦属于

A. 气轮

B. 火轮

C. 血轮

D. 水轮

E. 肉轮

【答案】 C

21、中医眼科名词“黄仁”指现代眼科哪一解剖部位

A. 虹膜

B. 瞳孔

C. 晶状体

D. 玻璃体

E. 黄斑

【答案】A

22、中医眼科从什么朝代开始独立成为一门专科

A. 隋朝

B. 唐朝

C. 宋朝

D. 元朝

E. 明朝

【答案】C

23、患者胞睑漫肿灼热,色紫黯黑,疼痛剧烈,伴面红气粗,舌红绛,苔黄,脉洪数,属下列哪种证型 ()

A. 风毒束险

B. 热毒壅盛

C. 热入营血

D. 正虚邪留

E. 以上都不是

【答案】C

24、患者目无赤痛,迎风流泪,兼面色少华,头晕目眩,舌淡脉细,辨证为

A. 风热壅盛

B. 脾胃虚弱

C. 气血不足

D. 肝肾亏虚

E. 湿热内蕴

【答案】 C

25、劳倦而致眼病的因素包括

A. 劳力过度

B. 劳心过度

C. 房劳过度

D. 劳目过度

E. 以上都是

【答案】 E

26、眉棱骨痛病名见于

A. 《审视瑶函》

B. 《张氏医通》

C. 《证治准绳》

D. 《儒门事亲》

E. 《证治要诀》

【答案】 A

27、胎风内障的病因是

A. 外伤

B. 先天

C. 年老

D. 中毒

E. 辐射

【答案】 B

28、患有络损暴盲, 视网膜反复出血, 其色较淡; 面色萎黄或无华, 肢体倦怠, 少气懒言, 纳差便溏, 或月经量少或淋漓不断; 舌淡胖, 脉弱, 宜用

A. 血府逐瘀汤

B. 归脾汤

C. 桃红四物汤合温胆汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 天麻钩藤饮

【答案】 B

29、近视眼 $>-6.00D$ 以上称为

A. 中度近视

B. 高度近视

C. 真近视

D. 轻度近视

E. 假性近视

【答案】 B

30、风牵偏视相当于西医学的哪种疾病

- A. 共同性内斜视
- B. 共同性外斜视
- C. 上睑下垂
- D. 眼睑痉挛
- E. 麻痹性斜视

【答案】 E

31、通睛, 相当于西医学的哪种疾病

- A. 共同性内斜视
- B. 共同性外斜视
- C. 麻痹性斜视
- D. 动眼神经麻痹
- E. 上睑下垂

【答案】 A

32、视乳头颜色苍白, 边界清楚的病因

- A. 多为肝肾精亏, 肝血不足, 目系失养所致
- B. 黑睛表面损伤, 复感外邪所致
- C. 恣嗜烟酒, 过食肥甘之品而生
- D. 屈光不正, 白睛涩痛所致

E. 风沙阳光长期刺激而成

【答案】A

33、《证治准绳》：“谓被物打触，物大则状大，物小则状小，若尖细之物触伤浅小者，可治可消。若粗厉之物伤大而深，及缺损神膏者，虽愈亦有瘢痕。若触及破膏者，必有膏汁或青黑色或白色如痰者流出，为害尤急”所描述的是下列哪种疾病

A. 异物入目

B. 热烧伤

C. 真睛破损

D. 辐射性眼损伤

E. 撞击伤目

【答案】C

34、与七情过激有关的眼病有

A. 绿风内障

B. 青风内障

C. 圆翳内障

D. 高风内障

E. 漏睛

【答案】AB

35、麻痹性斜视时，斜视角检查为

A. 第二斜视角大于第一斜视角

- B. 第二斜视角小于第一斜视角
- C. 第一斜视角等于第二斜视角
- D. 斜视角不稳定
- E. 视角查不出

【答案】A

36、五轮学说中,黑睛属于()

- A. 肉轮
- B. 血轮
- C. 气轮
- D. 风轮
- E. 水轮

【答案】D

37、散瞳合剂的组成是

- A. 阿托品. 托品酰胺. 肾上腺素
- B. 阿托品. 可卡因. 新福林
- C. 阿托品. 可卡因. 肾上腺素
- D. 后阿托品. 可卡因. 肾上腺素
- E. 阿托品. 托品酰胺. 可卡因

【答案】C

38、辐射性眼损伤的常见病因为

- A. 硫化氢气体等强烈化学性气体接触眼部
- B. 高速飞溅之金石. 玻璃. 瓷器碎屑入目
- C. 高压液体. 气体冲击眼部
- D. 沙土尘埃. 煤灰碳渣. 竹木碎屑. 碎叶毛刺等随风吹入眼内
- E. 电焊. 气焊时, 电弧. 乙炔焰. 融化金属等产生的紫外线照射

【答案】 E

39、角膜组织学上分为

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 8
- E. 10

【答案】 C

【解析】

40、惊震内障的病因是

- A. 外伤
- B. 先天
- C. 年老

D. 中毒

E. 辐射

【答案】 A

41、下列哪种眼病不属于眼外伤范畴

A. 撞伤伤目

B. 真睛破损

C. 异物入目

D. 漏睛

E. 化学性眼损伤

【答案】 D

42、巩膜的最薄弱处是

A. 眼外肌附着处

B. 视神经周围面

C. 角巩膜缘

D. 赤道部

E. 巩膜实质层

【答案】 A

【解析】

43、绿风内障中肝阳上亢证型的代表方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 绿风羚羊饮
- D. 将军定痛丸
- E. 吴茱萸汤

【答案】D

44、《证治准绳·七窍门》“平日素无他病,外不伤轮廓,内不伤瞳神,倏然盲而不见也”指的是()病

- A. 青盲
- B. 视瞻昏渺
- C. 聚星障
- D. 云雾移睛
- E. 暴盲

【答案】E

45、眼球穿通伤最严重的并发症是

- A. 角膜穿破,遗留白斑
- B. 眼内感染致视力突降
- C. 发生交感性眼炎
- D. 产生外伤性白内障
- E. 引起伤眼视网膜脱离

【答案】C

46、中医眼科解剖名词“眼带”是指现代眼科中的

- A. 悬韧带
- B. 晶状体
- C. 视神经
- D. 眼外肌
- E. 睫状体

【答案】D

47、金疳与火疳的鉴别要点中,不正确的是

- A. 金疳位于白睛表层
- B. 火疳位于白睛里层
- C. 金疳为紫红色结节隆起
- D. 火疳容易复发
- E. 以上均不对

【答案】C

48、《太平圣惠方》：“夫眯目者,是飞扬诸物尘埃之类入于眼中,粘睛不出,遂令疼痛难开也。”所描述的“眯目”是下列哪种疾病

- A. 异物入目
- B. 撞击伤目
- C. 真睛破损

D. 化学性眼损伤

E. 热烧伤

【答案】 A

49、没有起止. 经过目内眦的经脉是

A. 足阳明胃经

B. 手少阳三焦经

C. 手太阳小肠经

D. 足太阳膀胱经

E. 以上都对

【答案】 B

50、疣病相当于西医学之

A. 睑腺炎

B. 睑板腺囊肿

C. 泡性结膜炎

D. 巩膜炎

E. 沙眼

【答案】 B

51、患者胞睑漫肿灼热, 色紫黯黑, 疼痛剧烈, 伴面红气粗, 舌红绛, 苔黄, 脉洪数, 属下列哪种证型 ()

A. 风毒束险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296201205215010050>