

N3 护士外科模拟练习题与答案

1、急性肾功能衰竭时，尿液检查结果不正确的是

- A、尿液呈碱性
- B、管型
- C、尿比重低且固定
- D、镜下红细胞
- E、尿蛋白阳性

答案：A

2、清洁伤口指

- A、污染伤口经过清创处理以后
- B、消炎以后的伤口
- C、无菌手术切口
- D、伤后 6~8 小时内的伤口
- E、引流以后的伤口

答案：C

3、胃肠道手术前正确的准备是

- A、术前 8 小时禁食，2 小时禁水
- B、术前 9 小时禁食，2 小时禁水
- C、术前 10 小时禁食，4 小时禁水
- D、术前 11 小时禁水，4 小时禁食
- E、术前 12 小时禁水，4 小时禁食

答案：E

4、腹外疝最常见的是

- A、腹股沟斜疝
- B、腹股沟直疝
- C、股疝
- D、腹壁切口疝
- E、脐疝

答案：A

5、关于代谢性酸中毒的病因，下列哪项是错误的

- A、主要发生于呼吸道梗阻
- B、主要由于体内 HCO_3^- 减少
- C、当循环与组织灌注不足时可以发生
- D、可发生于急性肾功能衰竭
- E、可发生于肠道液体大量丧失时

答案：A

6、乳癌最早出现的症状是

- A、无痛性肿块
- B、乳投内陷
- C、乳舫“酒窝征”
- D、乳舫增大
- E、两侧乳投不对称

答案：A

7、醛固酮的主要作用是

- A、保钾排钠
- B、保钠保钾
- C、排氢保钾
- D、保钠排钾
- E、排氢排钾

答案：D

8、下列关于骶椎麻醉的描述中，正确的是

- A、硬膜外麻醉
- B、又名鞍区阻滞
- C、适用于直肠、刚门会阴布手术
- D、不易发生局部麻醉药物中毒
- E、容易发生马尾综合征

答案：A

9、下列甲状腺癌的临床特点正确的是

- A、以多发为主
- B、肿块生长慢
- C、质硬，表面高低不平
- D、边界清楚
- E、随吞咽上下移动

答案：C

10、低钾血症不会出现下列哪种表现是

- A、心电图改变
- B、腱反射亢进
- C、肌无力
- D、肠鸣音减弱
- E、恶心呕吐

答案：B

11、以下最能提示出血性坏死性胰腺炎检查结果是

- A、低血钙
- B、高血糖
- C、低血磷
- D、白细胞计数明显升高
- E、血清淀粉酶明显增高

答案：A

12、桡神经损伤的典型表现是

- A、垂腕
- B、拇指不能对掌
- C、爪形手
- D、五指不能伸屈
- E、骨间肌麻痹

答案：A

13、化疗最严重的毒性反应

- A、胃肠道反应
- B、脱发
- C、脉管炎
- D、骨髓抑制
- E、肝肾毒性反应

答案：D

14、肾癌血尿特点是

- A、终末血尿
- B、镜下血尿
- C、全程肉眼血尿，终末加重
- D、全血尿伴有血块
- E、无痛性间歇性肉眼全程血尿

答案：E

15、伤口边缘整齐，周围组织损伤轻，容易导致血管、神经损伤的是

- A、刺伤
- B、切割伤
- C、挫伤
- D、火器伤
- E、撕脱伤

答案：B

16、非手术治疗急性胰腺炎，饮食正确的是

- A、禁食，不禁饮
- B、禁饮食
- C、低脂流食
- D、低糖流食
- E、低脂、低糖流食

答案：B

17、对胃十二指肠溃疡急性穿孔并发休克者护理时，错误做法是

- A、保持有效胃肠减压
- B、维持水、电解质和酸碱平衡
- C、使用抗生素
- D、取半卧位
- E、禁食、禁饮

答案：D

18、为降低颅内压和防止颅内压突然增高，常采取的措施下列哪项不正确

- A、镇静、休息
- B、床头抬高 15~30cm 卧位
- C、输液量可不控制
- D、发热者给予降温
- E、应用脱水剂

答案：C

19、关于血清钙的描述，下列不确切的是

- A、Ca²⁺具有维持神经肌肉稳定性的作用
- B、体内 99%的钙以碳酸钙和磷酸钙的形式存在于骨骼中
- C、酸中毒时易发生低钙性抽搐
- D、碱中毒时易发生低钙性抽搐
- E、钙的代谢受甲状旁腺素的调节

答案：C

20、急性胰腺炎不会引起的并发症是

- A、腹膜炎
- B、胰腺脓肿
- C、胰腺癌
- D、胰腺假性囊肿
- E、休克

答案：C

21、三阶梯药物治疗原则，不正确的是

- A、按阶梯给药
- B、静脉给药为主
- C、按时给药
- D、个体化用药
- E、辅助用药

答案：B

22、粘连性肠梗阻最多见于

- A、肠道畸形
- B、腹腔手术后
- C、腹部外伤后
- D、胎粪性腹膜炎
- E、结核性腹膜炎

答案：B

23、肾损伤非手术治疗绝对卧床休息的时间至少为

- A、3天
- B、10天
- C、12天
- D、14天
- E、血尿转清后，继续卧床14天

答案：D

24、下列哪种变化最易使醛固酮分泌增加

- A、细胞内液容量减少
- B、细胞外液容量增加
- C、血容量减少
- D、细胞内液容量增加
- E、细胞外液容量减少

答案：C

25、如何诊断菌血症

- A、出现转移性脓肿
- B、寒战、高热，呈稽留热
- C、皮肤、黏膜出现淤血点
- D、肝、脾肿大
- E、血培养阳性

答案：E

26、关于急性阑尾炎，下列说法哪一项是错误的

- A、右下腹固定压痛点
- B、炎症波及壁层腹膜时可出现腹肌紧张及反跳痛
- C、出现寒战、发热及黄疸可能是胆道梗阻
- D、有阑尾周围脓肿时，右下腹可触及固定肿块
- E、短时间内体温升至 39℃ 以上，可能为阑尾坏疽

答案：C

27、胸部损伤后，出现反常呼吸或纵隔摆动现象，常见于

- A、闭合性气胸
- B、多根肋骨多处骨折
- C、多根肋骨单处骨折
- D、开放性气胸
- E、张力性气胸

答案：B

28、前列腺癌血清中增高的物质是

- A、酸性磷酸酶
- B、碱性磷酸酶
- C、CA153
- D、癌胚抗原
- E、CA199

答案：A

29、肾结核最早出现的临床表现是

- A、腰酸胀
- B、肾功能不全
- C、肾区肿块
- D、膀胱刺激征
- E、发热盗汗

答案：D

30、患者，男性，40岁。因怀疑肝癌入院。患者因焦虑和恐惧，在护士实施护理工作中表现出不合作。下列态度和措施中，你不该采取的是

- A、责备患者的态度和行为
- B、对患者的表现表示理解
- C、引导患者接受病情并询问患者感受
- D、解释护理操作和操作中的感受

E、关注患者的心理反应和行为反应

答案：A

31、患者，男性，7岁。肠蛔虫症，近日发热腹痛，今日突然腹部阵发性绞痛，恶心呕吐，吐出2条蛔虫，腹部明显膨胀，无排气和排便，腹部于左侧腹触及一拳头大肿物，表面质软不平，有轻度韧性，稍可推动，肠鸣音亢进，初步诊断为

A、蛔虫团引起肠梗阻

B、肠扭转

C、肠套叠

D、肠肿瘤

E、嵌顿疝

答案：A

32、极易发生穿孔的阑尾炎是

A、化脓性阑尾炎

B、坏疽性阑尾炎

C、妊娠并发阑尾炎

D、单纯性阑尾炎

E、慢性阑尾炎

答案：B

33、ARDS 晚期表现中不正确的是

A、明显发绀

B、呼吸短促

C、血液 pH 增高

D、休克

E、动脉 PaCO₂ 增高

答案：C

34、食管癌手术后胃管保留时间，一般至少为

A、1~2天

B、3~4天

C、5~6天

D、7~10天

E、11~14天

答案：B

35、能为直肠癌定性诊断的是

A、病理检查

- B、刚门指检
- C、刚门镜检
- D、乙状结肠镜检
- E、X线检查

答案：A

36、关于胃大部切除术后近侧空肠段梗阻，下列哪项不正确

- A、发生于毕 Billroth II 式
- B、呕吐物主要是胆汁，不包含食物
- C、非手术治疗不见好转应再次手术
- D、完全梗阻后，上腹部能触及肿物
- E、呕吐物既有胆汁又有食物

答案：E

37、代谢性酸中毒的最典型表现是

- A、尿液呈酸性
- B、心率加快，血压降低
- C、呼吸深快，呼气有烂苹果味
- D、严重者神志不清，甚至昏迷
- E、面色潮红

答案：C

38、颅内压增高代偿期生命体征的表现是

- A、血压升高、脉缓有力、呼吸深而慢
- B、血压升高、脉细弱、呼吸深而快
- C、血压升高、脉细速、呼吸浅而快
- D、血压下降、脉细弱、呼吸浅而急促
- E、血压、脉搏、呼吸均正常

答案：A

39、肛裂患者护理的要点是

- A、止痛
- B、保持排便通畅
- C、抗感染
- D、坐浴
- E、创面敷用药物

答案：B

40、体液的 pH 正常值是

- A、7.05~7.15

B、7.15~7.25

C、7.35~7.45

D、7.45~7.55

E、7.55~7.65

答案：C

41、对于肠梗阻的全身变化的叙述，下列哪一项是错误的

A、感染和全身中毒症状

B、大量呕吐造成碱中毒

C、呼吸和循环功能障碍

D、中毒性休克

E、水、电解质失调，发生代谢性酸中毒

答案：B

42、下列哪项是构成腰椎管狭窄症的病理因素

A、棘上韧带增生肥厚

B、椎板增厚

C、椎体后缘骨赘形成

D、椎体前缘压缩性骨折

E、椎体前缘骨赘形成

答案：C

43、高渗性脱水血清钠浓度高于

A、130mmol/L

B、142mmol/L

C、155mmol/L

D、135mmol/L

E、145mmol/L

答案：E

44、护理食管癌根治术后患者，应特别注意

A、保持大小便通畅

B、维持体液平衡

C、做好心理护理

D、鼓励早期下床活动

E、严格掌握患者进食时间

答案：E

45、III度烧伤

A、红肿灼痛无水泡

- B、张力较大的水泡，剧痛
- C、水泡张力较小，疼痛，基底红白相间
- D、干燥，焦痂和蜡白
- E、水泡小，基底水肿，感觉迟钝

答案：D

46、患者，男性，48岁。溃疡病史10年，突发心窝部剧痛并波及右下腹，检查右侧腹部有腹膜刺激征。下列最重要的护理措施是

- A、禁食、胃肠减压
- B、取半卧位
- C、输液、输血
- D、观察血压、脉搏
- E、使用抗生素

答案：A

47、下列不属于损伤的护理诊断是

- A、恐惧
- B、体液不足
- C、组织完整性受损
- D、低钾
- E、疼痛

答案：D

48、局麻药全身中毒反应处理的首要措施是

- A、停用局麻药
- B、吸氧
- C、用镇静剂
- D、必要时使用肌松药气管插管
- E、用抗组织胺药

答案：A

49、小肠扭转常见于

- A、婴儿
- B、儿童
- C、青壮年
- D、中年以后
- E、老年

答案：C

50、初始血尿提示病变部位在

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306023150120010044>