

## 三基之外科护理学测试题与答案

- 1、下列哪项违反手术进行中的无菌原则（）
  - A. 洗手护士腰以下，肩以上视为有菌区
  - B. 手术台边以下的器械不能使用
  - C. 器械不能从手术者背后传递
  - D. 手套接触非无菌区后，应用乙醇消毒(正确答案)
  - E. 前臂碰触有菌物，应更换无菌手术衣或加套无菌袖套
- 2、代谢性酸中毒的临床表现为（）
  - A. 呼吸快而浅
  - B. 呼吸慢而浅
  - C. 尿液呈碱性
  - D. 呼吸慢而深
  - E. 呼吸快而深(正确答案)
- 3、休克代偿期的临床表现为（）
  - A. 血压稍低，脉快，脉压缩小
  - B. 血压稍低，脉快，脉压正常
  - C. 血压稍升高，脉搏无变化，脉压缩小
  - D. 收缩压正常或稍高，脉稍快，脉压缩小(正确答案)
  - E. 血压稍升高，脉细数，脉压缩小
- 4、关于腹外疝手术前后的护理，下列哪项是错误的（）
  - A. 术后患侧膝下垫枕头
  - B. 术前应治愈或控制引起腹内压升高的症状
  - C. 严格准备会阴部皮肤
  - D. 腹股沟斜疝术后不需要托起阴囊(正确答案)
  - E. 术后3个月内避免重体力劳动
- 5、甲状腺危象多发生于术后（）

A. 12~36 小时(正确答案)

B. 1~4 小时

C. 4~6 小时

D. 8~12 小时

E. 24~36 小时

6、开放性气胸急救首先是 ( )

A. 抗生素治疗

B. 药物止痛

C. 颈封

D. 手术治疗

E. 闭合伤口(正确答案)

7、肋骨骨折最常见于 ( )

A. 1~3 肋骨

B. 4~7 肋骨(正确答案)

C. 7~9 肋骨

D. 9~10 肋骨

E. 11~12 肋骨

8、膀胱肿瘤术后化疗灌注常用药物为 ( )

A. 等渗盐水

B. 0.02%呋喃西林

C. 塞替派(正确答案)

D. 3%硼酸溶液

E. 庆大霉素

9、肾损伤病人绝对卧床时间为 ( )

A. 2 周

B. 尿液转清后

C. 1 个月

D. 不需卧床休息

E. 尿液转清后继续休息 2 周(正确答案)

10、上尿路结石主要症状是 ( )

A. 肾绞痛呈放射状

B. 尿频、尿痛

C. 疼痛、血尿(正确答案)

D. 尿频、血尿

E. 血尿并发热

11、骨牵引病人为防止针孔感染，护理上应注意 ( )

A. 除去针孔血痂

B. 全身应用抗生素

C. 移动钢针调正位置

D. 定期更换牵引钢针

E. 每日 2 次乙醇滴针孔处(正确答案)

12、骨盆骨折最常见并发症为 ( )

A. 尿道损伤(正确答案)

B. 膀胱破裂

C. 血管损伤

D. 直肠损伤

E. 脾脏破裂

13、下列哪种症状不是骨折特有的表现 ( )

A. 畸形

B. 反常活动

C. 疼痛与压痛

D. 功能障碍

E. 精神障碍(正确答案)

14、男，S 岁，烧伤总面积为 30% (I 度)，则该病人烧伤严重程度为 (D )

A. 轻度(正确答案)

B. 中度

C. 重度 U 特重度

E. 深度

15、防止烧伤休克的主要措施是 ( )

A. 保暖

B. 镇痛、镇静

C. 创面处理

D. 补液治疗(正确答案)

E. 多饮水

16、病人手指并拢一手掌面积为体表总面积的 ( )

A. 0.5%

B. 0.75%

C. 1.0%(正确答案)

D. 1.25%

E. 1.5%

17、男性，全身烧伤 59%总面积，无夏度烧伤，抗休克补液额外，丧失晶体与胶体的比例应是 ( )

A. 2 : 1(正确答案)

B. 3 : 2

C. 1 : 1

D. 3 : 1

E. 4 : 3

18、肾结核最常见的症状是 ( )

A. 肾积水

B. 尿频(正确答案)

C. 肾区疼痛

D. 潮热、盗汗

E. 贫血

19、外科中最常见的两种休克是 ( )

- A. 感染性休克、心源性休克
- B. 低血容量性休克、感染性休克(正确答案)
- C. 低血容量性休克、过敏性休克
- D. 感染性休克、神经源性休克
- E. 低血容量性休克、心源性休克

20、骨折长期卧床病人，为了预防压疮，护理上应采取的措施包括（）

- A. 保持皮肤清洁干燥(正确答案)
- B. 经常翻身(正确答案)
- C. 按摩受压部位(正确答案)
- D. 应用气垫床或受压处用海绵垫(正确答案)
- E. 加强功能锻炼

21、为防止肿瘤病人化学药物治疗的副作用，应做到（）

- A. 某些刺激性强的化学治疗药物不可漏出血管外(正确答案)
- B. 抗肿瘤药漏出血管时，应热敷，帮助消散
- C. 定期查血常规，以了解有无骨髓抑制现象(正确答案)
- D. 若出现胃肠反应，可用巴比妥、冬眠灵、灭吐灵等药物减轻反应(正确答案)
- E. 病人出现脱发现象，应立即停药

22、截瘫病人常见并发症包括（）

- A. 压疮(正确答案)
- B. 坠积性肺炎(正确答案)
- C. 泌尿系感染(正确答案)
- D. 心力衰竭
- E. 褥疮

23、前列腺增生病人的术后护理要点为（）

- A. 观察尿液的颜色，保持引流通畅(正确答案)
- B. 用无菌等渗盐水持续膀胱冲洗，滴速根据引流液颜色深浅而定(正确答案)
- C. 避免腹压增高的因素，保持大便通畅，避免咳嗽(正确答案)

D. 拔除导尿管后，注意有无尿频或尿失禁现象，指导病人进行肛提肌收缩练习  
(正确答案)

E. 术后 1 周内禁肛管排气或灌肠(正确答案)

24、胸膜腔闭式引流不畅的原因是 ( )

A. 引流导管残渣阻塞(正确答案)

B. 引流管侧孔紧贴胸壁(正确答案)

C. 胸壁置管伤口太小(正确答案)

D. 引流管内压力

E. 引流管扭曲(正确答案)

25、烧伤休克期补液调节依据的指标是 ( )

A. 尿量(正确答案)

B. 心率(正确答案)

C. 血压(正确答案)

D. 末梢循环(正确答案)

E. 中心静脉压(正确答案)

26、代谢性酸中毒临床表现为呼吸慢而浅，同时伴有低钾血症。

对

错(正确答案)

27、休克代偿阶段的临床表现有精神兴奋，烦躁不安，面色苍白，皮肤湿冷，脉搏细数。收缩压正常脉压变小，尿量减少。

对(正确答案)

错

28、术前晚为保证病人有充分的睡眠，一般睡前给予鲁米那 0.1 g。

对(正确答案)

错

29、开放性气胸急救处理的原则是使开放性气胸变为闭合性气胸。

对(正确答案)

错

30、肾衰竭分急性肾衰竭和慢性肾衰竭。

对(正确答案)

错

31、急性尿潴留产生的原因为机械性梗阻。

对

错(正确答案)

32、严重粉碎性骨折，破坏骨外膜血液供应，伴有骨缺损及周围软组织损伤，骨折愈合困难。

对(正确答案)

错

33、男，22岁。开水烫伤双足，局部肿胀明显，有大小不等水疱，创面红润，潮湿，诉创面剧痛，诊断为开水烫伤7%（浅2度）。

对(正确答案)

错

34、最易发生肋骨骨折的部位是第4~7肋。

对

错(正确答案)

35、柯雷骨折多发生于儿童。

对(正确答案)

错

36、休克病人的神志意识变化可反映（）

A. 容量的变化

B. 周围血管阻力的变化

C. 心排血量的变化

D. 脑部血液灌流情况

E. 组织缺氧程度(正确答案)

37、败血症的含义是（）

A. 由细菌毒素进入血液而引起症状者

- B. 仅化验发现血液已有细菌而无症状者
- C. 血内既有细菌也有细菌毒素并产生症状者(正确答案)
- D. 化脓性细菌栓子进入血液并随血流播散而不断产生症状者
- E. 化脓性感染伴发热者

38、破伤风最早发生强直性痉挛的肌群是 ( )

- A. 咽肌
- B. 面肌
- C. 咀嚼肌(正确答案)
- D. 颈背肌
- E 腹肌

39、急性乳腺炎多发生于 ( )

- A. 产后哺乳期的经产妇
- B. 产后哺乳期的初产妇(正确答案)
- C. 任何哺乳期的妇女
- D. 青年妇女
- E. 乳房较大的产妇

40、幽门梗阻病人术前胃肠道准备内容为 ( )

- A. 禁食输液
- B. 术前 3 日每晚洗胃(正确答案)
- C. 清洁灌肠
- D. 口服肠道制菌药
- E. 应用维生

41、下列哪种情况不需预防应用抗生素 ( )

- A. 结肠手术
- B. 胃癌根治术
- C. 髂内动脉瘤手术
- D. 慢性阑尾炎阑尾切除术(正确答案)
- E. 胰十二指肠切除术



42、关于胸膜腔闭式引流装置，下列哪项是正确的（）

A. 水封瓶长玻管在水下 3~4 cm，水封瓶低引流口 60 cm(正确答案)

B. 水封瓶长玻管在水下 3~4 cm，水封瓶低引流口 40 cm

C. 水封瓶长玻管在水下 4~6 cm，水封瓶低引流口 30 cm

D. 水封瓶长玻管在水下 4~6 cm，水封瓶低引流口 60 cm

E. 水封瓶长玻管在水下 2~3 cm，水封瓶低引流口 50cm

43、膀胱肿瘤行肠代膀胱术后，膀胱冲洗最重要的是（）

A. 严防引流管被肠黏液阻塞(正确答案)

B. 膀胱冲洗速度要快

C. 膀胱冲洗速度要慢

D. 冲洗中观察膀胱出血

E. 冲洗管位置要固定

44、下列哪种疾病最易引起无痛性血尿（）

A 肾结核

B. 肾结石

C. 肾癌(正确答案)

D. 肾母细胞瘤

E. 肾脓肿

45、体外冲击波碎石最适宜于多大的结石（）

A. >2.5 cm

B. <2.5 cm(正确答案)

C. ≤2.5 cm

D. >3 cm

E. ≤3 cm

46、处理骨折病人时，应首先掌握的原则是（）

A. 抢救生命

B. 妥善处理伤口，并简单有效固定(正确答案)

C. 迅速安全转移伤员

D. 输液并输血

E. 立即将骨折端嵌入进行复位

47、最严重的石膏综合征是 ( )

A. 呼吸困难

B. 剧烈疼痛

C. 急性胃扩张(正确答案)

D. 寒战

E. 末梢血运差

48、脊柱骨折最严重的并发症为 (D )

A. 脂肪栓塞

B. 段骨筋膜室综合征

C. 压疮

D. 脊髓损伤(正确答案)

E. 周围神经损伤

49、老年人烧伤易发生休克和急性肾衰竭，输液时应注意维持每小时尿量在 ( )

A. 20~30 mL(正确答案)

B. 10 ~20 mL

C. 30 ~40 mL

D. 40 ~50 mL

E. 50 mL

50、大面积烧伤现场急救时，下列哪种情况需要气管切开后方可转院 ( )

A. 呼吸道烧伤

B. 严重休克

C. 头部烧伤

D. 上呼吸道梗阻(正确答案)

E. 心搏骤停

51、适宜包扎疗法的烧伤创面是 ( )

- A. 面颈部浅度烧伤
- B. 会阴部烧伤
- C. 四肢浅 2 度及深 2 度烧伤(正确答案)
- D. 四肢高压电接触伤
- E. 3 度烧伤

52、烧伤休克的主要原因是 ( )

- A. 大量红细胞丧失
- B. 大量水分蒸发
- C. 疼痛
- D. 大量体液从血管内渗出(正确答案)
- E. 创面感染

53、下列哪个部位严重损伤，易发生挤压综合征 ( )

- A. 胸部
- B. 手和前臂
- C. 肾区
- D. 脊柱
- E. 臀部和 大腿(正确答案)

54、中老年男性出现无痛血尿，应首先考虑 ( )

- A. 前列腺增生
- B. 前列腺炎
- C. 膀胱肿瘤(正确答案)
- D. 膀胱炎
- E. 肾结石

55、防治烧伤休克的主要措施是 ( )

- A. 保暖
- B. 镇痛镇静
- C. 创面处理
- D. 补液治疗(正确答案)

E. 多饮水

56、手术进行中的无菌原则有（）

- A. 手术台边缘以下视为有菌区(正确答案)
- B. 切开肠腔以前应用盐水垫保护周围组织(正确答案)
- C. 无菌区布单被浸湿后应加盖无菌巾(正确答案)
- D. 缝皮肤前需用碘酊、乙醇消毒
- E. 手套破了用碘酊、乙醇消毒

57、前列腺增生病人的术后护理主要有哪些（）

- A. 妥善牵引固定导尿管，保持引流管的通畅(正确答案)
- B. 有血尿则应加快膀胱冲洗液的速度(正确答案)
- C. 术后1周内禁用肛管排气或灌肠(正确答案)
- D. 预防压疮及保持大便通畅(正确答案)
- E. 情况允许时尽早下床活动

58、预防切口感染应采取哪些措施（）

- A. 严格无菌操作(正确答案)
- B. 严密止血(正确答案)
- C. 均应使用有效的抗生素
- D. 做好术前准备，纠正贫血和低蛋白血症(正确答案)
- E. 必要时，正确地放置引流物(正确答案)

59、下列哪些属于烧伤的治疗原则（）

- A. 保护烧伤区，防止和清除外源性污染(正确答案)
- B. 预防和治疗低血容量性休克(正确答案)
- C. 防治局部及全身性感染(正确答案)
- D. 促进创面愈合，减少瘢痕形成及功能障碍(正确答案)
- E. 防治重要器官的并发症(正确答案)

60、原发性醛固醇增多症的主要临床表现有（）

- A. 高血压(正确答案)
- B. 烦渴多尿(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306242215201010043>