

医学三基测试试题及答案

1、以下哪种空气消毒方法能在有人的房间内使用()

- A、臭氧
- B、紫外线灯
- C、循环风紫外线消毒器
- D、喷雾消毒
- E、化学消毒

答案：C

2、急性主动脉夹层最凶险的并发症是()

- A、夹层破裂
- B、压迫肾脏
- C、夹层累及分支动脉开口影响血供
- D、假腔血栓形成
- E、主动脉急性水肿

答案：A

3、手术野皮肤消毒范围应在手术野及其外扩展:()

- A、 10cm
- B、 15cm
- C、 20cm
- D、 25cm
- E、 30cm

答案：B

4、凡实习、进修人员发生的护理缺陷或安排护理员、卫生员、陪人进行其职责范围以外的工作而发生的缺陷,均由()及安排者承担责任

- A、实习生
- B、进修人员
- C、 陪人
- D、带教者
- E、卫生员

答案：D

5、病室的湿度过低病人会出现()

- A、口渴咽痛.
- B、烦躁不安.
- C、肌肉紧张
- D、头晕头痛.

E、胸闷咳嗽

答案：A

6、给患者电除颤的步骤是()

A、 开机-充电-选择能量-放电

B、 开机-选择能量-放电-充电

C、 开机-选择能量-充电-放电

D、 开机-放电-选择能量-充电

E、 充电-开机-选择能量-放电

答案：C

7、病人手术前护理措施正确的是()

A、 手术前 2 周停止吸烟

B、 手术前 3~5 日使用抗生素

C、 监测病人凝血功能

D、 术前给予肩部垫枕、头后仰的体位训练

E、 术前不需禁食禁饮

答案：A

8、五常法包括()

A、 常整理、常整顿、常清洁、常规范、常自律

B、 常整理、常整顿、常清理、常规范、常自律

C、 常整理、常清理、常清洁、常规范、常自律

D、 常整理、常整顿、常清洁、常清理、常自律

E、 常清理、常整顿、常清洁、常规范、常自律

答案：A

9、单护士,在为 HBsAg 阳性病人拔针时,病人突然躁动被针扎伤,单护士的 HBsAg 阴性且未注射过乙肝疫苗,单护士除了按规范处理伤口外,还应注射()

A、 乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗

B、 无须注射疫苗

C、 注射胎盘球蛋白

D、 乙肝免疫球蛋白

E、 乙肝疫苗

答案：A

10、张女士,55 岁,胰十二指肠术后,经空肠造瘘管行肠内营养 3 天,病人出现发热、腹痛,腹部压痛、反跳痛、肌紧张。有助于判断为饲管移位造成急性腹膜炎的征象是()

A、 开始发热的时间和严重程度

- B、腹痛的部位、范围和性状
- C、腹腔引流管引流出营养液类似液体
- D、胃肠减压管引流液的量和性状
- E、有无休克等全身反应

答案：C

11、各班应按时交接班, 护理交班者应仔细检查回顾本班工作, 交接后因交接不清而发生的问题有()负责

- A、交班者
- B、责任组长
- C、护士长
- D、接班者

答案：D

12、护士长一般于不良事件发生()日内, 组织全科人员进行分析讨论, 提出处理意见和预防措施?

- A、1
- B、3
- C、5
- D、7

答案：B

13、若病人在治疗过程中出现呼吸困难、发绀, PaO₂ 持续降低, 应采取的措施是()

- A、加速补液速度
- B、提高吸氧浓度
- C、加大糖皮质激素剂量
- D、气管插管行机械通气
- E、应用血管活性药物

答案：D

14、以下哪一项不是接到急诊患者将要入院的通知后, 首要应完成的工作

- A、通知医生
- B、安置患者
- C、配合抢救
- D、健康教育
- E、准备急救器材及药物

答案：D

15、喂母乳后应竖起抱婴儿, 轻轻拍其背部, 目的是()

- A、增强食欲
- B、预防感染
- C、防止溢奶
- D、安慰患儿
- E、智力开发

答案：C

16、病人,女,25岁。午后低热伴盗汗 2 个月,胸片示右上肺不均匀密度病变,痰菌(一),结核菌素试验阳性,拟诊肺结核。其用药原则是:()

- A、早期、规律、短程、联合、足量
- B、早期、规律、短程、联合、适量
- C、早期、规律、全程、联合、适量
- D、早期、规律、按需、联合、足量
- E、早期、规律、全程、联合、足量

答案：C

17、目前该患儿的首选治疗为()

- A、抗生素
- B、禁止母乳
- C、大剂量维生素 C
- D、维生素 E
- E、光照疗法

答案：E

18、周女士,28岁,既往体健,第1孕妊娠36周自觉头痛3天,检查:血压160/110mmhg,产科腹部触诊情况正常,双下肢水肿(+),尿蛋白>0.5g/24h 此孕妇患有()

- A、轻度妊高征
- B、中度妊高征
- C、先兆子痫
- D、产前子痫
- E、妊高合并高血压

答案：C

19、如遵医嘱进行输血,输血后处置不对的是()

- A、完成输血操作后再次核对医嘱
- B、再次核对患者床号、姓名
- C、确认无误后签名
- D、将交叉配血报告单粘贴在病历中

E、将血袋置于医用垃圾桶内

答案：E

20、通过积极治疗,患者病情稳定,但其右侧上、下肢瘫痪,护士在制定护理计划时不正确的是()

A、为防止再次发生脑出血,不可更换体位

B、患侧手臂维持外展位

C、可用软枕等方法将患肢各关节放置于功能位

D、每天帮助患者或指导家属帮助患者进行瘫痪肢体各关节的被动运动

E、患肢膝下放置小软枕,并将毛巾卷放在髋关节外侧

答案：A

21、应立即采取的护理措施是()

A、嘱病人半卧位

B、嘱病人深呼吸

C、给病人高浓度氧气吸入

D、给病人测体温

E、测凝血时间

答案：C

22、控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是()

A、环境消毒

B、合理使用抗菌素

C、洗手

D、隔离传染病人

E、戴口罩

答案：C

23、应选择治疗方法是()

A、调整血压

B、溶栓治疗

C、应用止血剂

D、手术治疗

E、脑保护剂

答案：A

24、有机磷农药中毒病人呼出气体的气味为

A、恶臭味

B、肝臭味

C、刺激性大蒜味

D、烂苹果味

E、正常气味

答案：C

25、患者, 男性, 52 岁, 肝移植术后入 ICU, 经锁骨下静脉穿刺置管监测 CVP, 现患者出现原因不明的高热, 怀疑导管相关性血流感染, 准备拔除该导管, 在留取该导管端进行血培养时, 应用无菌剪剪取导管尖端()厘米

A、1

B、2

C、3

D、4

E、5

答案：E

26、发生青霉素过敏反应, 病人最早出现的症状是()

A、意识丧失

B、血压下降

C、面色苍白

D、喉头水肿、气促

E、幻觉、谵妄

答案：D

27、 颅内压增高患者头痛的特点应除外()

A、持续性

B、阵发性加剧

C、低头时加重

D、清晨较轻

E、咳嗽或喷嚏时加重

答案：D

28、禁忌使用鼻饲法的病人是()

A、口腔手术后

B、破伤风患者

C、昏迷患者

D、食管静脉曲张出血者

E、吞咽困难患者

答案：D

29、非同步直流电复律适用于

A、心房扑动

- B、心房颤动
- C、室性期前收缩
- D、心室纤颤
- E、阵发性室性心动过速

答案：D

30、口腔护理时开口器应从()放入。

- A、门齿处
- B、舌下
- C、尖牙处
- D、臼齿处
- E、衡切牙放入

答案：D

31、查体发现患者腕部及踝部出现皮下结节,提示()

- A、病情活动
- B、病情减轻
- C、已累及内脏
- D、降低药物的毒性
- E、减少对肝脏的损害

答案：A

32、口腔护理时开口器应从

- A、门齿放入
- B、舌下放入
- C、尖牙处放入
- D、侧切牙处放入
- E、臼齿处放入

答案：E

33、不应取半坐卧位的患者是

- A、腹部手术后患者
- B、心肺疾病患者
- C、腹腔有炎症患者
- D、休克患者
- E、面部手术后患者

答案：D

34、李先生,27岁,左腰痛,疑有上尿路结石,拟摄尿路平片。检查前准备是

()

- A、尿常规
- B、血常规
- C、肠道准备
- D、碘过敏试验
- E、心电图检查

答案：C

35、下列哪种情况下需进行补液试验()

- A、CVP 高, 血压低
- B、CVP 高, 血压正常
- C、CVP 低, 血压低
- D、CVP 低, 血压正常
- E、CVP 正常, 血压低

答案：E

36、针对该患者的麻醉方式, 目前还应预防的并发症是()

- A、呼吸抑制
- B、恶心呕吐
- C、血压下降
- D、血压上升
- E、尿潴留

答案：E

37、气管内吸痰一次吸取时间不应超过 15s, 其主要原因是()

- A、引起病人缺氧和发绀
- B、吸痰器工作时间过长易损坏
- C、吸痰管吸痰时间过长易阻塞
- D、引起病人刺激性呛咳造成不适
- E、吸痰用物暴露过久易造成细菌污染

答案：A

38、科室领回的血液遇特殊情况暂时不能输注时, 在()内送回到输血科寄存。

- A、15 分钟
- B、30 分钟
- C、45 分钟
- D、60 分钟
- E、80 分钟

答案：A

39、患者男性, 70 岁, 诊断为 COPD, 血气分析结果: 动脉血氧分压: 1.6kPA, 二氧化碳分压 12.4kPA。该患者的吸氧要求是

- A、高浓度, 高流量, 持续给氧
- B、低浓度, 低流量, 持续给氧
- C、高浓度, 高流量, 间断给氧
- D、低浓度, 低流量, 间断给氧
- E、低浓度与高流量交替持续给氧

答案: B

40、病人, 女性, 误食灭鼠药(磷化锌)中毒, 被送入急诊室, 此时为病人洗胃最好选用()

- A、温开水
- B、生理盐水
- C、2%碳酸氢钠
- D、1:15000-1:20000 高锰酸钾液
- E、4%碳酸氢钠

答案: D

41、患儿张某, 左上肢烫伤, II 度烫伤面积达 10%, 入院后经评估需使用保护具, 下列哪项措施不正确()

- A、使用前需取得病人及家属的理解和同意
- B、属于保护性制动措施, 只能短期使用
- C、将病人右上肢外展固定于身体右侧
- D、约束带下应置衬垫, 且松紧适宜
- E、经常观察约束部位的皮肤颜色和温度

答案: E

42、关于绞窄性疝, 下列哪项是错误的()

- A、疝囊内渗液转为血性
- B、被卡住的肠管呈深红色
- C、伴有急性机械性肠梗阻
- D、引起疝外被盖组织蜂窝织炎
- E、自行穿破引起粪瘘

答案: B

43、王先生, 42 岁, 因左小腿红肿并有分泌脓性分泌物, 诊断为慢性骨髓炎, 予以手术治疗, 申请 400 毫升红细胞备用(共用题干 1-2) 以下哪项处理不正确

- A、血液领回病房后须尽快输注, 不得退回
- B、遇特殊情况不能输注, 可在科室冰箱内存储血液

- C、输血前再次由 2 人核对, 确保输血正确无误
- D、血液必须由医护人员领取
- E、发血者和领血者共同核对

答案: B

44、患者, 女性, 46 岁。诊断为“消化性溃疡”, 时有上腹疼痛、反酸。现因饮食不当并发大出血, 此时不会出现()

- A、呕吐
- B、黑便
- C、昏厥
- D、休克
- E、上腹痛加重

答案: E

45、李某, 男, 40 岁, 农民。2 周前出现腹泻, 7-10 次/天, 为果酱样大便, 伴右下腹部压痛, 无发热, 无里急后重, 粪便常规发现夏科-莱登结晶。该病人的诊断应是()

- A、急性菌痢普通型
- B、霍乱
- C、病毒性肠炎
- D、阿米巴痢疾普通型
- E、伤寒

答案: D

46、急性颅内压增高的主要临床表现是: ()

- A、肢体偏瘫
- B、头痛、呕吐
- C、意识障碍
- D、少尿或无尿
- E、视网膜出血

答案: A

47、一患者吸氧的流量为 4 L/min, 其吸氧的浓度是()

- A、40 %
- B、37 %
- C、33%
- D、27 %
- E、25 %

答案: B

48、患者男,53岁。支气管扩张。午睡后起床时突然咯血约150ml,随即出现胸闷、气促、张口瞪目、大汗淋漓、牙关紧闭。下列护理措施正确的是

- A、不可将头偏向一侧
- B、迅速清除口、鼻腔血凝块
- C、患者取头高足低俯卧位
- D、鼓励其将血咽下,减少失血
- E、无效时给予面罩给氧解除呼吸道阻塞

答案: B

49、成人缺铁性贫血最常见的病因是()

- A、慢性失血
- B、铁摄入不足
- C、铁吸收不良
- D、铁利用障碍
- E、慢性溶血

答案: A

50、患儿,女,6岁,因急性阑尾炎入院,在硬膜外麻醉下行阑尾切除术,术后滴注青霉素、甲硝唑及 β -七叶皂苷钠15mg/天(正常剂量为5mg/天)。术后第三天患儿开始精神不振,眼睑轻度肿胀。用药第4天,患儿出现烦躁,尿量仅80ml/天,尿蛋白++、管型++,血肌酐 $>774.32\mu\text{mol/L}$,血尿素氮 $\geq 15\text{mmol/L}$, $\text{CO}_2\text{-CP } 6.94\text{mmol/L}$ 。该患儿可能发生了()

- A、急性肾小球肾炎
- B、急性肾衰竭
- C、心力衰竭
- D、休克
- E、溶血尿毒综合征

答案: B

51、护士为其做口腔护理时应选择的漱口液是()

- A、生理盐水
- B、2%过氧化氢溶液
- C、4%碳酸氢钠溶液
- D、0.1%醋酸溶液
- E、复方硼酸溶液

答案: C

52、脑室引流管的护理不正确的是()

- A、严格执行无菌操作,防止颅内感染

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316123150032010043>