

## 2024 年福州市中医院人员招聘模拟试题及答案解析

毕业院校：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

### 一、选择题

1. 肿瘤因其良恶性、大小及发送部位不同，对机体的影响也有所不同，良性肿瘤对机体的影响不包括()。

- A、局部压迫和阻塞
- B、造成继发性病变
- C、激素增多症状
- D、恶病质

答案：D

解析：不管是良性还是恶性肿瘤，如果体积比较大，都会产生局部压迫和阻塞症状，比如胰腺囊肿和胰腺癌;都有可能产生继发性改变，胰腺囊肿和胰腺癌;都有可能产生继发性改变，胰腺囊肿和胰腺癌都会产生黄疸。另外良、恶性肿瘤都可能引起激素水平的升高。比如肝癌会引起雌激素升高，垂体瘤引起生长激素增高。但是良恶性肿瘤区别在于良性肿瘤一般不会引起恶病质。故选D。

2. 医师经执业注册后()。

- A、只准从事医疗业务
- B、只准从事预防业务

- C、可以从事相应的医疗、预防、保健业务
- D、可以重新申请医师执业注册

答案：C

3. 下列关于甲亢术前的药物准备，正确的是()。

- A、普萘洛尔不能与碘剂合用
- B、硫脲类药物和碘剂不能合并应用
- C、服用硫脲类药物控制甲亢症状后再进行手术
- D、使用碘剂2~3周后，甲亢症状基本控制便可进行手术

答案：D

解析：甲亢术前的药物准备是用于降低基础代谢的重要环节。一种方法是服用硫脲类药物，症状基本控制后改服1~2周的碘剂，再进行手术。另一种方法是开始即用碘剂，2~3周后甲亢症状基本控制，便可进行手术。对碘剂或硫脲类药物不能耐受或无效者，可单用普萘洛尔或与碘剂合用作术前准备，术后应继续服用普萘洛尔4~7日，而不需服用更长时间。故选D。

4. 预防百日咳常用()。

- A、抗毒素
- B、转移因子
- C、类毒素

D、死疫苗

答案：D

解析：“白百破”三联疫苗含百日咳死疫苗。

5. 控制消化道平滑肌收缩节律的基础是()。

A、慢波

B、动作电位

C、壁内神经丛活动

D、迷走神经兴奋

答案：A

解析：消化道平滑肌细胞在静息电位的基础上，自发地产生周期性的轻度去极化和复极化，由于其频率较慢，故称为慢波；因慢波频率对平滑肌的收缩节律起决定性作用，故又称基本电节律。故选A。

6. Bobath常用的促进方法是()。

A、联合反射

B、协同运动

C、紧张性迷路反射

#### D、反射性抑制模式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/317024106035006106>