

妇科外科护理学试题+答案

1、内痔的早期症状是

- A、无痛性便血
- B、肛门部异物感
- C、肛周剧痛
- D、大便干结
- E、肛门瘙痒

答案：A

2、会阴切开缝合术后护理，哪项不妥

- A、伤口正常5天拆线
- B、伤口化脓延期拆线
- C、有红肿可用95%乙醇湿敷
- D、每日用新洁尔灭棉球擦洗外阴2次
- E、常规做好会阴护理

答案：B

3、牛某诉说在单位妇科普查时确诊“子宫颈Ⅱ度糜烂”，护士应告知她疗效较好、疗程最短的治疗方法是

- A、手术治疗
- B、局部用硝酸银
- C、物理疗法
- D、宫颈上药
- E、阴道冲洗

答案：C

4、男性，50岁，直肠癌病人，发现血尿，经检查诊断为肿瘤转移，该种转移属于

- A、血行转移
- B、直接浸润
- C、淋巴道转移
- D、多种渠道转移
- E、种植性转移

答案：B

5、临床上最常见的酸碱失衡为

- A、代谢性碱中毒
- B、呼吸性酸中毒
- C、呼吸性碱中毒

D、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

E、代谢性酸中毒

答案：E

6、估计失血量 800ml 以下，临床表现为

A、脉率 120 次 / 分以上，血压 70mmHg 以下

B、脉率 100 — 120 次 / 分，血压 70-90mmHg

C、脉搏速而细弱或摸不清，血压 50mmHg 以下或测不到

D、脉率 100 次 / 分以下，血压较高

E、脉率 80 次 / 分以下，血压正常

答案：D

7、葡萄胎病人术后避孕的最佳方法是

A、埋入法避孕

B、工具避孕：男用阴茎套

C、宫内节育器避孕

D、口服避孕药避孕

E、针剂避孕药避孕

答案：B

8、颅内压增高的“三主征”是

A、头痛、呕吐、失明

B、头痛、呕吐、视乳头水肿

C、恶心、呕吐、视乳头水肿

D、头痛、咳嗽、视乳头水肿

E、血压升高、呕吐、视乳头水肿

答案：B

9、男性，23 岁，双下肢挤压伤，神志尚清楚，表情淡漠，很口渴，面色苍白，皮肤湿冷，脉搏 112 次/min，血压 90/70mmHg。毛细管充盈迟缓。血 pH 值为 7.32。其循环系统的病理生理改变是

A、血容量相对过多

B、容量血管过度收缩

C、血容量严重不足

D、血容量不足

E、心功能不全

答案：D

10、患者女性，44 岁。患腰椎间盘突出症 5 年，经卧硬板床和骨盆牵引等保守治疗无效。现症状逐渐加重，行走 100-200 米即出现下肢疼痛，须休息或

下蹲数分钟才能缓解，入院准备接受手术治疗。此锻炼方式最主要的目的是为了预防

- A、血肿形成
- B、肌肉萎缩
- C、骨质疏松
- D、伤口感染
- E、神经根粘连

答案：E

11、胆囊切除术适用于

- A、胆囊结石经常发作
- B、胆总管结石伴有休克
- C、急性单纯性胆囊炎
- D、胆总管扩张不明显，但并发慢性胰腺炎
- E、肝内结石局限于左叶

答案：A

12、下列哪种血尿应考虑为上尿路结石

- A、终末血尿
- B、初期血尿
- C、无痛性血尿
- D、活动后血尿
- E、血尿伴见血块

答案：D

13、侵蚀性葡萄胎及绒癌最好的治疗方法是

- A、化疗为主，手术为辅
- B、单纯放疗
- C、免疫治疗
- D、单纯化疗
- E、手术加放疗

答案：A

14、胎方位为

- A、胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- B、最先进入骨盆入口的胎儿部分
- C、胎头在孕妇宫腔内的方向
- D、胎儿身体纵轴与母体身体纵轴平行
- E、胎儿身体纵轴与母体身体纵轴垂直

答案：A

15、胃十二指肠溃疡穿孔术前护理不正确的是

- A、禁饮
- B、胃肠减压
- C、应用止痛药
- D、严密观察生命体征和腹部情况
- E、禁食

答案：C

16、初产妇王某，妊娠 39 周住院待产。检查：规律宫缩，枕左前位，胎心 146 次/min，宫口开大 3cm。在产程护理措施中，错误的是

- A、鼓励 2~4h 排尿 1 次
- B、指导合理进食
- C、休息时取左侧卧位
- D、每隔 1~2h 听 1 次胎心
- E、宫缩时属正确用腹压

答案：E

17、关于子宫脱垂的病因，以下说法错误的是

- A、不可能发生于未产妇
- B、老年妇女盆底组织萎缩可发生子宫脱垂
- C、产妇分娩损伤未能及时修补可致子宫脱垂
- D、与长期咳嗽、便秘有关
- E、产后过早从事重体力劳动可引起子宫脱垂

答案：A

18、肾结核常见的症状

- A、潮热、盗汗
- B、尿频
- C、肾区疼痛
- D、肾积水
- E、贫血

答案：B

19、某男，70 岁，较长时间大便干燥，近 2 周来，排便时疼痛伴出血，经检查，肛管皮肤全层裂开，形成溃疡，诊断为肛裂。采用坐浴等非手术治疗。

上述病人的有关处理哪项不妥

- A、避免肛门指检
- B、外用消炎软膏

- C、服缓泻剂
- D、少吃水果
- E、避免辛辣食物

答案：D

20、子宫内膜增殖期变化发生在月经周期的第

- A、5~14 天
- B、10~12 天
- C、25~28 天
- D、1~4 天
- E、15~24 天

答案：A

21、患者女性，60 岁。体质较差，普查发现并确诊为外阴鳞状细胞癌 0 期，对患者进行治疗方案的解释，最恰当的是

- A、外阴癌对放疗敏感，应选择放疗
- B、为提高疗效，行单纯性外阴切除术+双侧腹股沟浅淋巴结清扫术
- C、考虑全身状况，行单纯性外阴切除术
- D、病变严重，行外阴切除术+患侧淋巴结清扫术
- E、为早期癌变，行局部药物治疗

答案：C

22、戚女士，23 岁，引产一女性胎儿，身长 35cm，体重 1025g，各脏器已发育完全，该妇女为妊娠

- A、22 周末
- B、20 周末
- C、24 周末
- D、26 周末
- E、28 周末

答案：E

23、若患者上臂石膏内的局部皮肤疼痛，有腐臭气味，主动和被动伸指功能正常，应考虑石膏内可能出现了

- A、肢体肿胀
- B、压疮
- C、血栓性静脉炎
- D、皮肤湿疹
- E、肢体血运障碍

答案：B

24、某经产妇，既往无心脏病。急产分娩出一男婴，分娩后 5 分钟，产妇突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、寒战、发绀、气急，首先考虑发生了

- A、急性左心衰
- B、羊水栓塞
- C、癫痫
- D、妊娠期高血压疾病
- E、急性肾衰竭

答案：B

25、初产妇第二产程约需

- A、11-12 小时
- B、6-8 小时
- C、1-2 小时
- D、1 小时
- E、5-15 分钟

答案：C

26、产褥期生理变化中哪项不正确

- A、常发生排尿不畅或尿潴留
- B、尿量减少
- C、肠蠕动减弱，易发生便秘
- D、出汗较多
- E、白细胞可暂时增高

答案：B

27、某孕妇妊娠 38 周，为判断其胎盘功能，应

- A、测定羊水中卵磷脂 / 鞘磷脂比值
- B、测定血或尿中雌三醇值
- C、测定血中 hCG 值
- D、测定羊水中肌酐值
- E、测定羊水中脂肪细胞值

答案：B

28、患者女性，35 岁。因子宫肌瘤拟在硬膜外阻滞麻醉下行全子宫切除术在术后护理中，错误的是

- A、留置导尿 1-2 天
- B、监测生命体征直到正常
- C、术后 1-2 天进流食
- D、去枕平卧 4 小时

E、术后第 2 天取半卧位

答案：D

29、下述哪项是早期宫颈癌的症状

A、接触性阴道出血

B、恶病质

C、阴道大量排液

D、反复阴道出血

E、大腿部疼痛

答案：A

30、女性，18 岁，突然剧烈头痛、伴呕吐，查体：颈项强直，克氏征（+），布氏征（+），体温 37.0℃，既往身体健康。CT 示双侧裂池及纵裂池内等密度影。若需由静脉补充水分，每日补液量不宜超过

A、2000ml

B、1000ml

C、1500ml

D、2500ml

E、3000ml

答案：A

31、关于子宫肌瘤，正确说法是

A、多发生于绝经期妇女

B、黏膜下肌瘤多见

C、黏膜下肌瘤易发生月经过多

D、肌壁间肌瘤少见

E、是妇科最常见的恶性肿瘤

答案：C

32、原发性肝癌最容易转移的部位是

A、腹腔内种植

B、左锁骨上淋巴结

C、骨

D、肝内

E、肺

答案：D

33、下列哪项不是胎盘的功能

A、气体交换

B、排泄废物

- C、沟通母子感情
- D、防御功能
- E、供给营养

答案：C

34、关于胎儿循环系统特点，正确的是

- A、有脐静脉 2 条，脐动脉 1 条
- B、卵圆孔位于左、右心室之间
- C、进入胎儿右心房的下腔静脉血是混合血
- D、卵圆孔开口处位于上腔静脉入口
- E、胎儿体内存在纯动脉血

答案：C

35、腹部手术后 3-4 日最常见的并发症有

- A、下肢深静脉血栓形成
- B、肺不张
- C、切口感染
- D、急性胃扩张
- E、切口裂开

答案：C

36、前尿道损伤尿液的特点

- A、终末血尿
- B、尿道滴血
- C、全程血尿
- D、无痛性间歇性肉眼全程血尿
- E、先疼痛后血尿

答案：B

37、控制子痫的首选药物是

- A、硫酸镁
- B、双氢克尿塞
- C、肼屈嗪
- D、20%甘露醇
- E、冬眠 1 号

答案：A

38、妊高征患者发生抽搐时，首要的护理措施是

- A、使病人取头低侧卧位，保持呼吸道通畅
- B、置病人于安静、暗光的单人病房

- C、用舌钳固定舌头，防止舌咬伤及舌后坠，保持呼吸道通畅
- D、加床挡，防止受伤
- E、观察病情，详细记录

答案：C

39、患者女性，50岁。不规则阴道流血半年，全身体检和妇检子宫、附件均无异常。不支持诊断的是

- A、宫颈部液羊齿状结晶
- B、月经周期紊乱，经期长短不一
- C、经量时多时少甚至大出血休克
- D、基础体温呈单相型
- E、增生期与分泌期子宫内膜共存

答案：E

40、精子获能的主要部位是

- A、阴道后穹隆
- B、阴道
- C、子宫颈
- D、卵巢
- E、子宫和输卵管

答案：E

41、外阴阴道假丝酵母菌病典型的阴道分泌物特点为

- A、米汤样白带
- B、匀质稀薄白带
- C、血性白带
- D、黄白色泡沫状白带
- E、凝乳或豆渣样白带

答案：E

42、受术者发生人工流产综合反应的症状时，首选的护理措施为

- A、肌肉注射 0.5mg 阿托品
- B、帮助病人改变体位
- C、注意保温
- D、配合医生尽快结束手术
- E、安慰受术者

答案：A

43、护士在为患者做会阴湿热敷时，正确的是

- A、热敷后再行会阴擦洗

- B、湿热敷的温度为 48-52℃
- C、热敷面积与病损面积大致等同
- D、热敷时间为 60 分钟
- E、每日热敷 2-3 次

答案：E

44、患者女性，28 岁。发育正常，婚后夫妇同居，3 年未孕。诊断为原发性不孕。若患者通过系列检查，结果内膜活检见到分泌期子宫内膜，输卵管通畅，基础体温双相，男方精液常规检查正常，则下一步建议患者择期做

- A、阴道镜检查
- B、宫腔镜检查
- C、腹腔镜检查
- D、B 超检查
- E、宫腔镜和腹腔镜联合检查

答案：E

45、胆总管口括约肌切开成形术适用于

- A、胆囊结石经常发作
- B、胆总管结石伴有休克
- C、肝内结石局限于左叶
- D、急性单纯性胆囊炎
- E、胆总管扩张不明显，但并发慢性胰腺炎

答案：E

46、初产妇 26 岁，妊娠 40 周，宫口开全，胎头拨露已 1.5 小时无进展，胎心率为 150 次 / 分，宫缩持续 50 秒，间歇 2-3 分钟，产妇一直运用腹压该孕妇首优的护理诊断是

- A、胎儿宫内缺氧
- B、水、电解质紊乱
- C、宫缩乏力
- D、知识缺乏
- E、焦虑

答案：C

47、患者手指并拢一手掌面积为体表总面积的

- A、0.5%
- B、1.5%
- C、0.75%
- D、1.25%

E、1.0%

答案：E

48、颅前窝骨折可合并损伤的神经是

A、嗅神经

B、听神经

C、面神经

D、滑车神经

E、展神经

答案：A

49、患者女性，15岁，骑自行车时不慎跌倒，自觉外阴部胀痛难忍，最可能发生

A、处女膜破裂

B、会阴体损伤

C、巴氏腺出血

D、小阴唇裂伤

E、大阴唇血肿

答案：E

50、应用破伤风抗毒素的目的是

A、抑制破伤风杆菌生长

B、中和血液中游离毒素

C、杀死破伤风杆菌

D、清除毒素来源

E、中和与神经结合的毒素

答案：B

51、胎盘娩出后，子宫底每天下降

A、5~6cm

B、1~2cm

C、3~4cm

D、2~3cm

E、4~5cm

答案：B

52、前列腺增生排尿困难的程度主要决定于

A、患者年龄

B、增生的部位

C、前列腺的大小

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317110006025006040>